



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.01.2025
Αριθμ. πρωτ: 11995

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: TotalEnergies Fluids S.A.S, Γαλλίας
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
- Agribiz
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14548 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) OVISPRAY [δ.ο. paraffin oil (CAS 64742-46-7) 96,9 % β/β] ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, των εργοστασίων συσκευασίας και τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο, τις συνθήκες αποθήκευσης, χρονικής σταθερότητας του σκευάσματος καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37,4 και 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).

5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την από 09.11.2021 αξιολόγηση της Γαλλίας (label extension) για το φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς OVISPRAY (αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: 9400496).
7. Την αριθμ. 13997/333047/20.12.2019 αίτηση και τα αριθμ. 5375/14078/10.05.2023 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 14548 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) OVISPRAY [δ.ο. paraffin oil (CAS 64742-46-7) 96,9 % β/β], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 1370/15518/08.02.2016 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, των εργοστασίων συσκευασίας και τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο, τις συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Η άδεια διάθεσης στην αγορά διαμορφώνεται ως εξής:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14548

08.02.2016

31.03.2028

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

OVISPRAY

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστικές ουσίες

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Paraffin oil (CAS 64742-46-7)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

100 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Υδρογονάνθρακες

Παρασκευαστής:

TotalEnergies Fluids S.A.S.

2 place Jean Millier - La Défense 6, 92400, Courbevoie, Γαλλία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Refinery OUDALLE - TOTAL Fluides

Z.I. du Havre, Route du canal de Tancarville 7, 6430 St Romain-de-Colbosc, Γαλλία

2. Petrochemical Industrial Distillation

BU Odfjell Terminals Rotterdam B.V., Oude Maasweg 6, Port 4040, 3197 KJ BOTLEK Rotterdam, Ολλανδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 7086/72690/28.06.2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

TotalEnergies Fluids S.A.S.
 2 place Jean Millier – La Défense 6, 92400, Courbevoie, Γαλλία
 Τηλ.: 00 33 01 41 35 75 85
 E-mail: serge.quillet@total.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
 Μιχαλακοπούλου 157, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα
 Τηλ.: 210 74 71 000
 E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

TotalEnergies Marketing Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 74-76 Βορείου Ηπείρου & Κονίτσης, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 213 0172100
E-mail: rm.enco-greece@totalenergies.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής του
σκευάσματος:

TotalEnergies Fluids S.A.S.
 2 place Jean Millier – La Défense 6, 92400, Courbevoie, Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής
του σκευάσματος:**Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:**

1. Mineralölwerk Osnabrück GmbH
Geschäftsführer Neulandstrasse. 34-38, 49084 Osnabrück, Γερμανία
2. PETROLE ET SYNTHÈSE (TOTAL Lubrifiants plant)
Rue de Balleroy Norrey en Bessin 14740 Saint-Manvieu-Norrey, Γαλλία
3. MULTISOL International Services
1 Chemin de la mi voie 76300 Sotteville-Les-Rouen, Γαλλία
4. TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ctra. M-404 Navacarnero a Chinchón Km, 37, 800 Polígono industrial "Valmor" 28340 Valdemoro (Madrid), Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας
του σκευάσματος:**Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:**

1. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε.
Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής.
2. BASF Ελλάς **Μονοπρόσωπη** Α.Β.Ε.Ε.
Σίνδος Θεσσαλονίκη
3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Ε.Β.Ε.,
Μάνδρα Αττικής
4. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.,
Νέα Σάντα Κυλκίς Τ.Κ. 61100
5. AGROTECHNICA - ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΚΕΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., 570 22 Θεσσαλονίκη (ΤΘ 1112)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: paraffin oil (CAS 64742-46-7) 96.9% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 3,1 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το αριθμ. 7086/72690/28.06.2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το σκεύασμα. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 κ.εκ. έως 1 λίτρο	HDPE
2	Δοχείο	4 έως 200 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος **και των δυο επιφανειών.**

Τρόπος Παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετρανύχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και αυγών).

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidotus perniciosus</i> (QUADPE) Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> (PARLOL) Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis pentagona</i> (PSEAPE) Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> (LEPSUL) Σταχτιά ψώρα <i>Epidiaspis leperii</i> (EPIDBE) Φυλλοδέτεες <i>Archips rosanus</i> (CACORO), <i>A. podanus</i> (CACOPO) Τετράνυχτοι <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL), <i>Bryobia rubrioculus</i> (BRYORU) Ψύλλα <i>Psylla sp.</i> (PSYLSP) Αφίδες <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA), <i>Aphis pomi</i> (APHIPO), <i>Dysaphis pyri</i> (DYSAPY), <i>D. plantaginea</i> (DYSAPL)	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου	2/60 (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά (PRNAR) Ροδακινιά (PRNPS) Κερασιά (PRNAV) Δαμασκηινιά (PRNDO)	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidotus perniciosus</i> (QUADPE) Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis pentagona</i> (PSEAPE)	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου	2/60 (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

	Σφαιρολεκάνιο <i>Sphaerolecanium prunastri</i> (LECAPN) Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> (PARLOL) Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> (LEPSUL) Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis sp.</i> (APHISP) Φυλλοδέτεες <i>Archips rosanus</i> (CACORO), <i>A. podanus</i> (CACOPO) Τετράνυχτοι <i>Tetranychus sp.</i> (TETRSP), <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL), <i>Bryobia rubrioculus</i> (BRYORU) <i>Aculus sp.</i> (CULSP)					
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρεϊπ φρούτ (CIDPA) Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE) Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Φράπα CIDGR	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i> (PSECCI) Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL) Άσπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i> (ASPDNE) Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria zizyphi</i> (PARLZI) Άλλα κοκκοειδή <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (CHRYDI), <i>Pericerya purchasi</i> (ICERPU), <i>Ceroplastes rusci</i> (CERPRU), <i>C. sinensis</i> (CERPSI), <i>Mytilococcus beckii</i> (LEPSBE), <i>Coccus hesperidum</i> (COCCHΕ),	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου	2/60 (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή) Για <u><i>Aleurothrixus floccosus</i></u> μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα

	Τετράνυχτοι <i>Panonychus citri</i> (METTCL), <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), <i>Eriophyes sheldoni</i> (ACEISH), <i>Aculus pelekassi</i> (ACULPE) Αλευρώδεις <i>Dialeurodes citri</i> (DIALCI), <i>Aleurothrixus floccosus</i> (ALTHFL) Αφίδες <i>D. plantaginea</i> (DYSAPL)					
ΑΜΠΕΛΙ VITVI	Χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL) Κοκκοειδή <i>Parthelonecanium</i> <i>corni</i> (LECACO), <i>Melanaspis vitis</i> (MELAVI)	1080	1800	60	Χειμερινά στάδια της καλλιέργειας BBCH 00-11	1
Φράουλα (Θ) ⁽²⁾ (FRAAN)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (CHTSFR) <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> (MACSEU)	1500	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	2/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (2 εφαρμογές σε 6 γενεές)
Κρεμμύδι (Θ) ⁽²⁾ (ALLCE) Σκόρδο (Θ) ⁽²⁾ (ALLSA) Ασκαλώνιο/Φρέσκο κρεμμυδάκι (Θ) ⁽²⁾ (ALLAS) Σχοινόπρασο (Θ) ⁽²⁾ (ALLSC)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>variorariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)
Τομάτα (Θ) ⁽²⁾ (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) ⁽²⁾ (SOLME) Πιπεριά (Θ) ⁽²⁾ (CPSAN)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	1500	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	2/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (2 εφαρμογές σε 6 γενεές)
Τομάτα (Θ) ⁽²⁾ (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) ⁽²⁾ (SOLME)	<i>Tuta absoluta</i> (GNORAB)	1500	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)

Τομάτα (Θ) ⁽²⁾ (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) ⁽²⁾ (SOLME)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)
Αγγούρι (Θ) ⁽²⁾ (CUMSA) Αγγουράκι για τουρσί (Θ) ⁽²⁾ (CUMSA) Κολοκύθι (Θ) ⁽²⁾ (CUUPG) Πεπόνι (Θ) ⁽²⁾ (CUMME) Καρπούζι (Θ) ⁽²⁾ (CITLA) Κολοκύθα (Θ) ⁽²⁾ (CUUPE)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	1500	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (3 εφαρμογές σε 4 γενεές)
Αγγούρι (Θ) ⁽²⁾ (CUMSA) Αγγουράκι για τουρσί (Θ) ⁽²⁾ (CUMSA) Κολοκύθι (Θ) ⁽²⁾ (CUUPG)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)
Πεπόνι (Θ) ⁽²⁾ (CUMME) Καρπούζι (Θ) ⁽²⁾ (CITLA) Κολοκύθα (Θ) ⁽²⁾ (CUUPE)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)
Καλαμπόκι (Θ) ⁽²⁾ (ZEAMX) Γλυκό καλαμπόκι (Θ) ⁽²⁾ (ZEAMS)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)
Γλυκό καλαμπόκι (Θ) ⁽²⁾ (ZEAMS)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	1500	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	3/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (3 εφαρμογές σε 4 γενεές)
Κουνουπίδι (Θ) ⁽²⁾ (BRSOB) Μπρόκολο (Θ) ⁽²⁾ (BRBOK)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)

Μπιζέλια (αρακάς) φρέσκα (Θ) ⁽²⁾ (PIBSX) Φασόλια (με τον λοβό) (Θ) ⁽²⁾ (PHSVX)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	6/7 ανά γενεά αφίδων με μέγιστο 12 εφαρμογές (6 εφαρμογές σε 2 γενεές)
Καλλωπιστικά φυτά* (Θ) ⁽²⁾ (NNNZZ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	1500	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	12/7
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA)	1000	-	60-100 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση της προσβολής	12/7

Παρατηρήσεις:

1. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
2. **Να εφαρμόζεται μόνο σε υδροπονικές καλλιέργειες θερμοκηπίου κλειστού τύπου.**

* «Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες των καλλωπιστικών φυτών.»

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%.
- Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθeneιών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.
- Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
- Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία *paraffin oil*, η οποία δεν έχει εξειδικευμένο τρόπο δράσης κατά IRAC. Δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

Μην εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή πριν οι εναποθέσεις του ψεκαστικού υγρού έχουν στεγνώσει τελείως.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό για τις συνθήκες της Ελλάδος όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις.

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/
Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS08

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- 10** Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ **προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.**

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά την εφαρμογή στην καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPE2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην απορρίπτετε απευθείας στα επιφανειακά ύδατα το διάλυμα απορροής από υδροπονικές καλλιέργειες.

SPE3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα:

- 15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές στις δενδρώδεις καλλιέργειες πλην των εσπεριδοειδών.

SPE3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε πρώιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

- 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 20% σε όψιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

- 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε πρώιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων,

- 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % σε όψιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων.

SPE8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ Η ΕΜΕΝΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑΤΡΟ Η ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντος ή ατμών, φλόγας ή ψεκαστικού υγρού απομακρύνετε άμεσα το παθόντα από την περιοχή έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Υπάρχει κίνδυνος προϊόν να εισέλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση εμετού μετά από κατάποση. Σε αυτή τη περίπτωση ο παθών θα πρέπει να εισαχθεί αμέσως σε νοσοκομείο.

Προστασία για τους παρέχοντας πρώτες βοήθειες: Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο αποθηκευτικό χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στην **έκθεση αξιολόγησης** του προϊόντος αναφοράς καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- Persistent foam, emulsifiability and emulsion stability studies carried out at the maximum claimed use concentration (15% v/v).

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 1370/15518/08.02.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ