



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.01.2025  
Αριθ. Πρωτ.: 26913

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287188

Προς: SEIPASA S.A., Ισπανίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»,  
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61168 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SEIVONT (δ.ο. *Bacillus subtilis* strain IAB/BS03 0,81%) ως προς τη δόση του σκευάσματος»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 6464/165766/03.07.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61168 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SEIVONT (δ.ο. *Bacillus subtilis* strain IAB/BS03 0,81%).
- Την αριθμ. 642/02.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **61168** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SEIVONT (δ.ο. *Bacillus subtilis* strain IAB/BS03 0,81%), που χορηγήθηκε με την αριθμ.

6464/165766/03.07.2024 απόφασή μας, ως προς τη δόση του σκευάσματος.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

| 5                                                                                                                                                                                                                                                          | Φάσμα δράσης                                                          |                    |                             |                             |                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                                                                            | Στόχος                                                                | Δόσεις σκευάσματος |                             |                             | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                        | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | κ.εκ./ στρ.        | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ. |                                                                                    |                                                                              |
| Αμπέλι<br>(οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)<br>(VITVI)                                                                                                                                                                                                        | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>(BOTRCI)                       | 100-300            | -                           | 20-100                      | Από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή<br>BBCH 68-89                            | 5/5-7                                                                        |
| Τομάτα (Υ+Θ)<br>(LYPES)<br>Μελιτζάνα (Υ+Θ)<br>(SOLME)                                                                                                                                                                                                      | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>(BOTRCI)                       | 100-300            | -                           | 50-100                      | Από την έναρξη της άνθησης ως την πλήρη ωρίμαση των καρπών<br>BBCH 61-89           | 5/5-7                                                                        |
| Πιπεριά (Υ+Θ)<br>(CPSAN)                                                                                                                                                                                                                                   | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>(BOTRCI)                       | 100-300            | -                           | 70-100                      | Από την έναρξη της άνθησης ως την πλήρη ωρίμαση των καρπών<br>BBCH 61-89           | 5/5-7                                                                        |
| Βότανα και βρώσιμα άνηθ:<br>Φραγκομαϊντανός<br>ANRCE<br>Φύλλα σέλινου<br>APUGS<br>Μαϊντανός<br>PARCR<br>Φασκόμηλο<br>SALOF<br>Δενδρολίβανο<br>RMSOF<br>Θυμάρι<br>THYSS<br>Βασιλικός<br>OCIBA<br>Δάφνη/ Δαφνόφυλλα<br>LURNO<br>Δρακόντιο/Εστραγκόν<br>ARTDR | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>(BOTRCI)<br>(Υ+Θ) <sup>3</sup> | 100-300            | -                           | 40 – 100                    | Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως το τέλος της άνθησης<br>BBCH 12-67 | 5/5-7                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Περονόσπορος<br><i>Bremia</i> sp.<br>(BREMSP)<br>(Υ) <sup>4</sup>     |                    |                             |                             |                                                                                    |                                                                              |

|                                                                                                           |                                                 |         |   |            |                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Σέλινο (Υ+Θ)<br>APUGD                                                                                     | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>(BOTRCI) | 100-300 | - | 20-100 (Υ) | Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49                                                           | 5/5-7 |
|                                                                                                           |                                                 |         |   | 40-100 (Θ) |                                                                                                                                   |       |
| Καλλιέργειες νεαρών φύλλων<br>(συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ+Θ)                                   | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>(BOTRCI) | 100-300 | - | 80-100 (Υ) | Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 12-49                                                           | 5/5-7 |
|                                                                                                           |                                                 |         |   | 40-100 (Θ) |                                                                                                                                   |       |
| Ανθοκράμβες (Υ):<br>Μπρόκολο<br>BRSOK<br>Κουνουπίδι<br>BRSOB<br>Κεφαλωτές κράμβες (Υ):<br>Λάχανα<br>BRSOL | Βοτρύτης<br><i>Botrytis cinerea</i><br>(BOTRCI) | 100-300 | - | 80-100     | Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο 70% του μεγέθους BBCH 14-47                              | 5/5-7 |
| Λαχανάκια (Υ)<br>Βρυξελλών<br>BRSOF                                                                       |                                                 |         |   |            | Από την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου έως ότου το 70% των βλαστημένων οφθαλμών (Λαχανάκια) να έχουν κλείσει καλά BBCH 14-47 |       |
| Αγκινάρα (Υ)<br>CYUSC                                                                                     | Περονόσπορος<br><i>Bremia</i> sp.<br>(BREMSP)   | 100-300 | - | 40-100     | Από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως τον πλήρη σχηματισμό ανθοταξίας BBCH 11-59                                        | 5/5-7 |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |         |   |        |                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Μαρούλι (Υ)<br>LACSA<br>και σαλατικά (Υ):<br>Λυκοτρίβολο<br>VLLLO<br>Σκαρόλες (πικρίδα)/<br>πλατύφυλλα αντίδια<br>CICEL<br>Κάρδαμο και άλλα<br>βλαστώρια και φύτερες<br>LEPSA<br>Ρόκα<br>ERUVE | Περονόσπορος<br><i>Bremia</i> sp.<br>(BREMSP)                                    | 100-300 | - | 40-100 | Από την<br>εμφάνιση του<br>2ου πραγματικού<br>φύλλου έως τη<br>συγκομιδή<br>BBCH 12-49                     | 5/5-7 |
| Κολοκυνθοειδή με<br>βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ):<br>Αγγούρι<br>CUMSA<br>Κολοκύθι<br>CUUPG                                                                                                              | Ωΐδιο<br><i>Erysiphe</i> sp.<br>(ERYSSP),<br><i>Sphaerotheca</i><br>sp. (SPHRSP) | 100-300 | - | 50-100 | Από την<br>εμφάνιση του<br>2ου πραγματικού<br>φύλλου έως την<br>πλήρη ωρίμανση<br>των καρπών<br>BBCH 12-89 | 5/5-7 |
| Κολοκυνθοειδή με μη<br>βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ):<br>Καρπούζι<br>CITLA<br>Πεπόνι<br>CUMME<br>Κολοκύθα<br>CUUPE                                                                                       | Ωΐδιο<br><i>Erysiphe</i> sp.<br>(ERYSSP),<br><i>Sphaerotheca</i><br>sp. (SPHRSP) | 100-300 | - | 40-100 | Από την<br>εμφάνιση του<br>2ου πραγματικού<br>φύλλου έως την<br>πλήρη ωρίμανση<br>των καρπών<br>BBCH 12-89 | 5/5-7 |
| Καπνός<br>NIOTA                                                                                                                                                                                | Ωΐδιο<br><i>Erysiphe</i> sp.<br>(ERYSSP),<br><i>Sphaerotheca</i><br>sp. (SPHRSP) | 100-300 | - | 40-100 | Από την<br>ανάπτυξη του<br>2ου πραγματικού<br>φύλλου έως την<br>έναρξη της<br>άνθησης<br>BBCH 12-59        | 5/5-7 |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ:<br>Μηλιά<br>MABSD<br>Αχλαδιά<br>PYUCO<br>Κυδωνιά<br>CYDOB<br>Μουσμουλιά<br>MSPGE<br>Ιαπωνική Μουσμουλιά<br>EIOJA                                                                     | Φουζικλάδιο<br><i>Venturia</i> sp.<br>(VENTSP)                                   | 100-300 | - | 30-100 | Από το στάδιο<br>της ρόδινης<br>κορυφής έως την<br>πλήρη ωρίμανση<br>των καρπών<br>BBCH 57-89              | 7/5-7 |

|                    |                                                |         |   |        |                                                                                            |       |
|--------------------|------------------------------------------------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Αμυγδαλιά<br>PRNDU | Φουζικλάδιο<br><i>Venturia sp.</i><br>(VENTSP) | 100-300 | - | 30-100 | Από την<br>εμφάνιση<br>ταξιανθιών έως<br>την πλήρη<br>ωρίμανση των<br>καρπών<br>BBCH 51-89 | 7/5-7 |
|--------------------|------------------------------------------------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## Παρατηρήσεις:

1. Ξεκινήστε τις εφαρμογές προληπτικά όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
2. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα με το παθογόνο.
3. Εφαρμόζεται σε υπαίθρου και θερμοκηπίου Βότانا και βρώσιμα άνθη.
4. Εφαρμόζεται σε υπαίθρου Βότانا και βρώσιμα άνθη.
5. **Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6464/165766/03.07.2024 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ