



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.05.2025
Αριθμ. πρωτ: 14263

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Trifolio-M GmbH, Γερμανίας
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
- Agribiz
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14805 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AZACTIVA (δ.ο. azadirachtin A 1% β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα εικονογράμματα κινδύνου/προειδοποιητικές λέξεις, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του σκευάσματος καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 14776 άδεια του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) NeemAzal T/S (Azadirachtin A 1% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 3171/90397/04.06.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 13348/17.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 14805 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AZACTIVA (δ.ο. azadirachtin A 1% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7310/212931/27.07.2022 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα εικονογράμματα κινδύνου/προειδοποιητικές λέξεις, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του σκευάσματος καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5, 6, 9, 10, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
Τομάτα (Υ) (LYPES) Πιπεριά (Υ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips tabaci</i> (THRITB) <i>Thrips sp.</i> (THRISP) Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG)	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Τομάτα (Θ) (LYPES) Πιπεριά (Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips tabaci</i> (THRITB) <i>Thrips sp.</i> (THRISP) Φυλλοκνίστες <i>Tuta absoluta</i> (GNORAB) <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP)	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Μελιτζάνα (Υ+Θ) (SOLME)	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10

Αγγούρι (Θ) (CUMSA) Κολοκυθάκι (Θ) (CUUPG)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVE) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips tabaci</i> (THRITB) <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μέχρι το 50% των καρπών να έχουν ωριμάσει (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips sp.</i> (THRISP)	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Μηλιά (MABSD)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO) <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL) <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA)	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Καλλωπιστικά (Υ) (NNNZZ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVE) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips tabaci</i> (THRITB) <i>Thrips sp.</i> (THRISP) Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG)	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10

Καλλωπιστικά (Θ) (NNNZZ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVE) <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> (FRANOC) <i>Thrips tabaci</i> (THRITB) <i>Thrips sp.</i> (THRISP) Φυλλοκνίστες <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP) <i>Phytomyza sp.</i>	200-300	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής (μέχρι BBCH 85)	3/7-10
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες) (VITVI)	Τζιτζικάκια <i>Empoasca vitis</i> (EMPOFL) <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI)	200-300	150-300	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 11-59)	3/7-10
	Κοκκοειδή <i>Pulvinaria vitis</i> (PULVVI)	200-300	150-300	30-100		2/7-10
Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Αφίδες <i>Aphis sp.</i> (1APHIG)	200-300	150-300	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 1 ^{ου} θυγατρικού φυτού και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι τη συγκομιδή του 2 ^{ου} χεριού (οι περισσότεροι καρποί έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας) (BBCH 11-42 & 70-89)	2/7-10
Πεπόνι (Υ) (CUMME) Κολοκύθα (Υ) (CUUPE) Καρπούζι (Υ) (CITLA)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	200-300	150-300	30-100	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι την έναρξη της άνθησης και από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμαση του καρπού (BBCH 40-59 & 70-89)	2-7/10

Παρατηρήσεις:

1. Να εφαρμόζετε κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας.
2. Να ψεκάζετε απουσία ανέμου.
3. Η δόση μεταξύ 200 – 300 κ.εκ. ανά στρέμμα εξαρτάται από το επίπεδο της προσβολής.
4. Πριν τη χρήση του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.
5. **Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Το προϊόν δεν είναι συμβατό με προϊόντα πολύ όξινης (π.χ. όξινες αργίλους) ή πολύ αλκαλικής αντίδρασης (π.χ. πολυθειούχο ασβέστιο, βορδιγάλειος πολτός κ.λπ.)
- **Να μην προορίζονται για μεταποίηση τα προϊόντα των καλλιεργειών επιτραπέζιου αμπελιού και φράουλας που έχουν δεχτεί εφαρμογή με το σκεύασμα.**

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Azadirachtin A, που ανήκει στην ομάδα (UN- compounds of unknown or uncertain MoA) κατά IRAC.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:



GHS09

-

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

EUH208: Περιέχει Azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη και φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή».

«Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό».

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SRe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης για πρώιμες εφαρμογές ή 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης για όψιμες εφαρμογές σε καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων.

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε καλλιέργειες καλλωπιστικών, αμπελιού, φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπουζιού.

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθιού.

Σπε3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 80% σε καλλιέργειες μηλοειδών και πυρηνοκάρπων.
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 30% σε καλλιέργειες καλλωπιστικών.
- **10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95% στην καλλιέργεια του αμπελιού.**
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% στις καλλιέργειες φράουλας, πεπονιού, κολοκύθας και καρπουζιού.

13 Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Μηλιά (0130010), Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια) (0151010), Πεπόνι (Υ) (0233010), Κολοκύθα (Υ) (0233020), Καρπούζι (Υ) (0233030), Φράουλα (Υ) (0152000)	3

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 7310/212931/27.07.2022 μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ