



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.02.2025
Αριθμ. πρωτ: 47715

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Λ. Συγγρού 348, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα
Πληροφορίες:	Ν. Αβραμίδης	E-mail:	kornilia.mitsopoulou@fmc.com
Τηλέφωνο:	210 92 87 224		
E-mail:	navramidis@minagric.gr		

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14829 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VERIMARK 20 SC (δ.ο. cyantraniliprole 20 % β/ο), ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, την εγγυημένη σύνθεση, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις προειδοποιητικές λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο, την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
5. Το αριθμ. 2860/82838/08.05.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διαδικασία για την τροποποίηση εγγυημένης σύνθεσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τις βοηθητικές ουσίες (μη σημαντικές αλλαγές)».
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».

7. Τις από Δεκέμβριο 2023 και Ιούλιο 2024 αξιολογήσεις της Μάλτας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς Verimark® 2.0 [αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: 2023-06-30 P01 (SZ)].
8. Την αριθμ. 7998/227696/18.07.2023 αίτηση και τα αριθμ. 1379/34486/05.02.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
9. Την αριθμ. 7320/204701/28.06.2023 αίτηση και τα αριθμ. 1848/44816/14.02.2024, 3183/80400/19.03.2024 και 8985/244114/ 12.08.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 14829 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VERIMARK 20 SC (δ.ο. cyantraniliprole 20 % β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 4933/127138/09.05.2023 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, την εγγυημένη σύνθεση, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις προειδοποιητικές λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες – αντίδοτο, την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάσταση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

Η **άδεια διάθεσης** στην αγορά διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14829

09.05.2023

14.09.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

VERIMARK 20 SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Cyantraniliprole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

94 % (β/β) min

Χημική ομάδα

Ομάδα ανθρανιλικών διαμιδίων

Παρασκευαστής

FMC international Switzerland Sarl
Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. FMC Corporation
Mobile Manufacturing Center, 12650 US Highway 43 North,
Axis, Alabama 36505, ΗΠΑ
2. WeylChem US
2114 Larry Jeffers Road, Elgin, SC 29045, ΗΠΑ
3. FMC (Shanghai) Agricultural Sciences Co., Ltd.
No 39, Shungong Road, Shanghai Chemical Industry Park,
Shanghai 201507, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cyantraniliprole, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 8084/218215/06.08.2020 αίτηση και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7998/227696/18.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 211 198 3903
E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 211 198 3903
E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: 211 198 3903
E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC international Switzerland Sarl
Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier, Ελβετία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. DuPont de Nemours (France) S.A.I.
Agricultural Products 82, rue de Wittelsheim, BP9 F-68701
Cernay CEDEX, Γαλλία
2. Corteva Agriscience LLC.
Valdosta Manufacturing Center
2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia 31601, ΗΠΑ
3. FMC Agro Singapore Pte Ltd.
Singapore Formulation Unit
31 Tuas View Circuit, Singapore, 637470, Σιγκαπούρη
4. FMC Corporation
100 Niagara Street, Middleport, New York 14105, ΗΠΑ
5. Helena Industries, LLC
434 Fenn Road, Cordele, Georgia 31015, ΗΠΑ
6. Cheminova Deutschland GmbH & Co KG
Stader Elbstraße 28, 21683 Stade, Γερμανία

7. Kwizda Agro GmbH
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, A-2100 Leobendorf, Αυστρία
8. Phyteurop
Rue P. My - BP 27, ZI de Champagne, 49 260 Montreuil
Bellay, Γαλλία
9. CHEMARK ZFT
Gyartelep Perematron Berhida H-8182, Ουγγαρία
10. STI Solfotecnica Italiana SPA
Via Evangelista Torricelli 2 Cotignola RA, Ιταλία
11. Althaller Italia s.r.l.
Strada Com le per Campagna 5,
20078 San Colombano al Lambro MI, Ιταλία
12. MAGMA Γεωργικές Εισροές Α.Ε.
θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. DuPont de Nemours (France) S.A.I.
Agricultural Products, 82, rue de Wittelsheim, BP9 F-68701
Cernay CEDEX, Γαλλία
2. Corteva Agriscience LLC.
Valdosta Manufacturing Center,
2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia 31601, ΗΠΑ
3. FMC Agro Singapore Pte Ltd.
Singapore Formulation Unit
31 Tuas View Circuit, Singapore, 637470, Σιγκαπούρη
4. FMC Corporation
100 Niagara Street, Middleport, New York 14105, ΗΠΑ
5. Helena Industries, LLC
434 Fenn Road, Cordele, Georgia 31015, ΗΠΑ
6. Cheminova Deutschland GmbH & Co KG
Stader Elbstraße 28, 21683 Stade, Γερμανία
7. Kwizda Agro GmbH
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, A-2100 Leobendorf, Αυστρία
8. Phyteurop
Rue P. My - BP 27, ZI de Champagne, 49 260 Montreuil
Bellay, Γαλλία
9. CHEMARK ZFT
Gyartelep Perematron Berhida H-8182, Ουγγαρία
10. STI Solfotecnica Italiana SPA
Via Evangelista Torricelli 2 Cotignola RA, Ιταλία
11. Althaller Italia s.r.l.
Strada Com le per Campagna 5,
20078 San Colombano al Lambro MI, Ιταλία
12. MAGMA Γεωργικές Εισροές Α.Ε.
θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: cyantraniliprole 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: **80,41 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 8084/218215/06.08.2020 αίτηση και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 7998/227696/18.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50 κ.εκ. έως 5 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμογή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος ή μέσω των διαβρεκτών ποτίσματος ή μέσω **εμβάπτισης φυταρίων. Το pH του διαλύματος σε όλες τις εφαρμογές να ρυθμίζεται στο pH 5-6.** Πραγματοποιήστε την εφαρμογή 2-3 μέρες πριν τη μεταφύτευση και αποφύγετε το πότισμα με υπερβολικό νερό.

Τρόπος Παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Πλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα ψεκασμού μετά την εφαρμογή. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, με καθαρό νερό. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το προϊόν είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανάλογα με τον εχθρό μπορεί να έχει ακμαιοκτόνο, προνυμφοκτόνο και ωοκτόνο δράση. Απορροφάται από ριζικό σύστημα και έχει διασυστηματική ανοδική κίνηση. Εμφανίζει ταχεία αντιτροφική δράση (παύση της διατροφής).

Όταν εφαρμόζεται στις ρίζες πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη σπορά ή τη μεταφύτευση, το προϊόν εμποδίζει την τροφοδότηση των παρασίτων της πρώιμης περιόδου, μειώνοντας τόσο τις άμεσες ζημιές όσο και τη μετάδοση ορισμένων ασθενειών που μεταδίδονται από τα έντομα.

Περιέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Τομάτα (Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME) Πυτεριά (Θ) (CPSAN)	Λεπιδόπτερα: Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Τούτα <i>Tuta absoluta</i> (GNORAB), Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI) Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> (PLUSCH) Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) Φυλλορύκτες: Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP)	37,5-50	-	-	Μέσω στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89)	4/7
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι (Θ) (CUMSA) Αγγουράκι (Θ) (CUMSG) Κολοκύθι (Θ) (CUUPG) Κολοκύθα (Θ) (CUUMA) Πεπόνι (Θ) (CUMME) Καρπούζι (Θ) (CITLA)	Λεπιδόπτερα: Τούτα <i>Tuta absoluta</i> (GNORAB) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI) Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> (PLUSCH) Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	37,5-50	-	-	Μέσω στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89)	4/7

	Φυλλορύκτες: Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP)					
Μαρούλι (Θ) (LACSA)	Λεπιδόπτερα: Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI)	37,5-50	-	-	Μέσω στάγδην άρδευσης ή υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως το φυτό αποκτήσει το πλήρες μέγεθος για συγκομιδή (BBCH 12-89)	3/7
Μαρούλι (Υ) (LACSA) και σαλατικά: Λυκοτρίβολο (Υ) (VLLLO) Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) (CICEL) Κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & φύτρες (Υ) (LEPSA) Γαιοκάρδαμο (Υ) (BARVE)	Λεπιδόπτερα: Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)	11,5	-	-	Μέσω στάγδην άρδευσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως οι κεφαλές αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 12-49)	1 Ανά τρία χρόνια
Ρόκα (Υ) (ERUVE) Κόκκινο σινάπι (Υ) (BRSJU) Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανο- μένων ειδών κράμβης) (Υ)	Λεπιδόπτερα: <i>Autographa gamma</i> (PYTOGA) Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI) Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> (FRANOC) Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN)	11,5	-	-	Εμβάπτιση φυταρίων πριν τη μεταφύτευση από τα δύο (2) έως τα πέντε (5) πραγματικά φύλλα (BBCH 12-15) Η εφαρμοζόμενη δόση είναι 4 κ.εκ. / 1000 φυτάρια, με μέγιστη δόση 11,5 κ.εκ./στρ.	1 Ανά τρία χρόνια

Φασόλια (με λοβό) (Θ) (PHSVX)	Λεπιδόπτερα: Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Τούτα <i>Tuta absoluta</i> (GNORAB) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI), Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> (PLUSCH) Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes</i> <i>vapourariorum</i> (TRIAVA) Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) Θρίπες <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> (FRANOC), Φυλλορύκτες: Λιριόμυζα <i>Liriomyza sp.</i> (LIRISP)	37,5-50	-	-	Μέσω υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89)	2/7
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Λεπιδόπτερα: Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI) Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	37,5	-	-	Μέσω υδροπονικού συστήματος στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89)	4/7

Φράουλα (Υ) ² (FRAAN)	Λεπιδόπτερα: Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR) Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> (LAPHEG), <i>Spodoptera littoralis</i> (SPODLI)	15	-	-	Μέσω στάγδην άρδευσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών από τα δύο (2) πραγματικά φύλλα έως την ωρίμανση (BBCH 12-89)	1 Ανά τρία χρόνια
Παρατηρήσεις: 1. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες. 2. Η χρήση στις φράουλες υπαίθρου περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ. 3. Για τη στάγδην εφαρμογή το pH του διαλύματος να ρυθμίζεται στο 5-6, οι σταλάκτες να τοποθετηθούν πλησίον της ρίζας και το προϊόν να εφαρμόζεται στο πρώτο τρίτο του κύκλου άρδευσης.						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το προϊόν να εφαρμόζεται με εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07 GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει το προϊόν της αντίδρασης των 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος, σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά την εφαρμογή, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, εφαρμόστε το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία cyantraniliprole, κάθε τρία έτη στον ίδιο αγρό.

SPe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε αποστραγγιζόμενα εδάφη για τη στάγδην χρήση στην καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια της φράουλας (Υ) από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην απορρίπτετε απευθείας στα επιφανειακά ύδατα το διάλυμα απορροής από υδροπονικές καλλιέργειες.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Καταπολεμήστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Σε περίπτωση που εμφανιστούν δερματικά συμπτώματα ή αλλεργική αντίδραση, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. **Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030), Πιπεριά (Θ) (0231020), Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκύθι (Θ) (0232030), Κολοκύθα (Θ) (0233020), Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ) (0233030), Μαρούλι (Υ+Θ) (0251000) και σαλατικά (Υ): Λυκοτρίβολο (Υ) (0251010), Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/πλάτυφυλλα αντίδια (Υ) (0251030), Κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & φύτρες (Υ) (0251040), Γαιοκάρδαμο (Υ) (0251050), Ρόκα (Υ) (0251060), Κόκκινο σινάπι (Υ) (0251070), Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ) (0251080), Φασόλια (με λοβό) (Θ) (0260010), Φράουλα (Υ+Θ) (0152000)	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και θερμοκρασία ανώτερη των 0°C.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στα Part A των σχετικών Εκθέσεων Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:

- Provide data on possible metabolite accumulation in soil and transfer of those metabolites in rotational crops next to applications simulating multiple consecutive years of accumulation.
- A method for the determination of the impurity methane sulfonic acid in the formulation.
- **New validated methods for determination of IN-Q6S09 and IN-RYA13 in VERIMARK® 2.0 formulation using non-hazardous solvents.**

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4933/127138/09.05.2023 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ