



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.02.2025
Αριθμ. πρωτ: 51814

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. -
«Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14767 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFINTO (δ.ο. flonicamid 50% β/β), ως προς τα στοιχεία στον υπεύθυνο επικοινωνίας, στον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά και στην εγγυημένη σύνθεση, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
- Την αριθμ. 4525/122068/13.05.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος, ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 14511 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (εντομοκτόνο) ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG (δ.ο. flonicamid 50% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5078/59875/29.05.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 67895/12.03.2025) 9ΜΚ94653ΓΗ-6Δ0
8. Την αριθμ. 41702/13.02.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 14767 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AFINTO (δ.ο. flonicamid 50% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 13633/349069 π.ε. /04.02.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία στον υπεύθυνο επικοινωνίας, στον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά και στην εγγυημένη σύνθεση, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **1.4β,γ,στ, 3, 5, 6** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 71 000
E-mail: info@agribiz.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττική
Τηλ.: 210-6666612-13
E-mail: leda.zacharopoulou@syngenta.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: flonicamid 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 47,92 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Ι της αίτησης με ημερομηνία 3-8 -2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 131951) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 13998/333055/20.12.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το φυτοπροστατευτικό προϊόν αναφοράς ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος ή εμβάπτιση/διαβροχή του δίσκου σποράς μαρουλιού και άλλων σαλατικών (μηχανικά με στάγδην άρδευση έως και μια (1) ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία μεταφύτευσης).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Συνδυαστικότητα: -

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. Αριθμ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες)
		γρ./ στρέμμα	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u> Πορτοκαλιές (CIDSΙ), Μανταρινιές (CIDRE), Λεμονιές (CIDLI), Γκρέϊπ- φρουτ (CIDPA), Κιτριά (CIDME), Φράπες (CIDGR), Νεραντζιές (CIDAΥ), Περγαμόντο (CIDAB)	Αφίδες Εσπεριδοειδών <i>Aphis citricola</i> (APHISI), <i>Toxoptera auranti</i> (TOXOAU), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	10	3.5-10	100–300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Ροδακινιές (PRNPS)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE), <i>Brachycaudus schwartzi</i> (APPESW)	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Κερασιές (PRNAV)	Αφίδες <i>Myzus cerasi</i> (MYZUCE), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Brachycaudus</i>	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται

	<i>helichrysi</i> (ANURHE), <i>Brachycaudus schwartzi</i> (APPESW), <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR)					
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Δαμασκηνιές (PRNDO)	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE), <i>Brachycaudus schwartzi</i> (APPESW)	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Μηλιές (MABSD)	Γκρίζα αφίδα <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Dysaphis pyri</i> (DYSAPY), <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA) Πράσινη αφίδα <i>Aphis pomi</i> (APHIPO)	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u> Αχλαδιές (PYUCO), Αχλαδιές NASHI (PYUPC) Κυδωνιές (CYDOB)	Αφίδες, γκρίζα αφίδα της αχλαδιάς <i>Dysaphis pyri</i> (DYSAPY), <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA)	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες (LYPES), Μελιτζάνες (SOLME) υπαίθρου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες (LYPES), Μελιτζάνες (SOLME) θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum</i>	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση)

	<i>euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)				(ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u> Τομάτες (LYPES), Μελιτζάνες (SOLME) θερμοκηπίου (εφαρμογές με στάγδην άρδευση)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	16	--	200-500	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος	
<u>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</u> Αγγούρια (CUMSA), Αγγουράκια (CUMSA), Κολοκυθάκια (CUUPG) θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	10	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι (TRZSS)	Αφίδες <i>Aphis nasturtii</i> (APHINA), <i>Macrosiphum avenae</i> (MACSAV) <i>Macrosiphum dirhodum</i> (MACSSP), <i>Metopolophium dirhodum</i> (METODR), <i>Rhopalosiphum padi</i> (RHOPPA)	14	--	20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός (NIOTA)	Αφίδες <i>Myzus sp.</i> (MYZUSP) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> * (THRITB)	14	--	40-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Καπνός * (ΝΙΟΤΑ) (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>	Αφίδες <i>Myzus nicotianae</i> (MYZUNI), <i>Myzus sp.</i> (MYZUSP), <i>Aphis sp.</i> (APHISP) Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> (THRITB)	14		40-60	Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές max (1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος μετά από 14 ημέρες) εφόσον απαιτείται
Βαμβάκι (GOSHI)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Λύγκος * <i>Lygus sp.</i> (LYGUSP)	7.5	--	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾	2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αρακάς (με λοβό) ** (PIBSX) υπαίθρου <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	14	35-70	20-40	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6 ^{ου} ξεδιπλωμένου φύλλου (BBCH 16) χωρίς την παρουσία μελισσών	1 εφαρμογή
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (2ORNH) Τριανταφυλλιές (ROSSS) υπαίθρου και θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum sp.</i> (MACSSP), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	14	--	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων. ⁽¹⁾ (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ</u> (2ORNW)					Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	

Μαρούλι (LACSA) Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια (CICEN), Ρόκα (ERUVE), Λυκοτρίβολο (VLLLO), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κόκκινο σινάπι (BRSJU)	<i>Αφίδες</i> <i>Nasonovia</i> <i>ribisnigri</i> (NASORN), <i>Myzus sp.</i> (MYZUSP), <i>Macrosiphum</i> <i>sp.</i> , (MACSSP) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	2 mg σκ./φυτό (αντιστοιχεί σε 14 γρ. σκ./ στρ.)	--	--	Εμβάπτιση/ διαβροχή του δίσκου σποράς πριν την μεταφύτευση των νεαρών φυταρίων, από την ανάπτυξη του 1ου φύλλου έως 6 ^{ου} φύλλου νωρίς την άνοιξη μέχρι το τέλος του φθινοπώρου (BBCH 11-16)	1 εφαρμογή
Μπιζέλια με λοβό (PIBSX), Φασόλια με λοβό (PHSVX)	<i>Αφίδες</i> <i>Acyrtosiphon</i> <i>pisum</i> (ACYRON)	14	--	20-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο (BBCH 11-71)	1 εφαρμογή
Όσπρια: Μπιζέλια (PISBX), Φασόλια (PHSVX)	<i>Αφίδες</i> <i>Acyrtosiphon</i> <i>pisum</i> (ACYRON)	14	--	20-60	Με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο (BBCH 11-71)	1 εφαρμογή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
- 2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
- 4) Η εφαρμογή με εμβάπτιση/διαβροχή των δίσκων μηχανικά, με στάγδην άρδευση, πριν την μεταφύτευση να γίνεται 1 μέρα (μέγιστο) πριν την καθορισμένη ημερομηνία μεταφύτευσης. Η δόση η οποία θα εφαρμοστεί να μην ξεπερνά τα 2 mg σκευάσματος/φυτό.

* Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας του Βαμβακιού και του Καπνού, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

** Για τη χρήση ήσσονος σημασίας του Αρακά (με λοβό), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία flonicamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά IRAC.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται:

- **Η εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.**

- Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.

- Επεμβάσεις με AFINTO νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.

- Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με AFINTO. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το flonicamid.

- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές.

- Ο συνολικός αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο με προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία flonicamid δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών που αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων αυτών.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βαμβάκι	75
Εσπεριδοειδή	60
Μαρούλι (0251020), Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια (0251030), Ρόκα (0251060), Λυκοτρίβολο (0251010), Γαιοκάρδαμο (0251050), Κόκκινο σινάπι (0251070)	49
Σιτάρι (0500090)	28
Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές, Nashi	21

Ροδακινιές, Δαμασκηνιές, Κερασιές, Αρακάς (με λοβό), Μπιζέλια με λοβό (0260030), Φασόλια με λοβό (0260010)	14
Καπνός	7
Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια Θερμοκηπίου, Τομάτες, Μελιτζάνες (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	1
Μπιζέλια (όσπρια) (0300030), Φασόλια (όσπρια) (0300010)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 13633/349069 π.ε./04.02.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ