



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.03.2025
Αριθ. πρωτ.: 57523

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14670 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (flupyradifurone 20% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14670 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (flupyradifurone 20% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 407049/24.12.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Διευρύνουμε την αριθμ. 14670 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (flupyradifurone 20% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Ελιά (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κηκιδόμυγα* <i>Dasineura oleae</i> DASYOL Βαμβακάδα* <i>Euphyllura olivina</i> EUPHOL Μυτιλόμορφη ψώρα* <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL	75	-	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο της πλήρους έκπτυξης των ανθοταξιών μέχρι πριν από την πλήρη ωρίμανση των καρπών (το χρώμα των καρπών έχει σχεδόν αλλάξει) (BBCH 55-85). Ειδικά για τον δάκο, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού.	1 εφαρμογή τον χρόνο
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Φράπα CIDGR Νεραντζιά CIDAU	Αφίδες Aphididae 1APHIF	75	-	120-150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του	1

					50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 69-75	
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κοκκοειδή <i>Delottococcus aberiae</i> DLTCAB Ψύλλα των εσπεριδοειδών <i>Trioza erytreae</i> TRIZER Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης* <i>Aleurocanthus spiniferus</i> ALECSN	75	-	120-150	Ψεκάσμος καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 69-75	1
Αμπέλι VITVI	Τζιτζικιάκια <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL	20 για ύψος κόμης 80 εκ. 25 για ύψος κόμης 100 εκ. 30 για ύψος κόμης 120 εκ.	-	50-100	Ψεκάσμος καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής όταν οι ταξιανθίες είναι πλήρως αναπτυγμένες, ως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 57-81)	1
	Κοκκοειδή <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Φυλλοξήρα <i>Viteus vitifoliae</i> VITEVI Ψευδόκοκκος <i>Planococcus ficus</i> PLANFI <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u>	50	-	50-100		

	Θρίπας* <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC					
Σολανώδη Υπαίθρου (Υ) Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU	45	-	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	1
Κολοκυνθοειδή Υπαίθρου (Υ) Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPG Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CCUMA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	56	-	45-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89)	1
Μαρούλι (Υ) LACSA	Αφίδες <i>Nasonovia</i> <i>ribisnigri</i> NASORN <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Uroleucon</i> <i>sonchi</i> DACTSN <i>Aulacorthum</i> <i>solani</i> AULASO <i>Acyrtosiphon</i> sp. ACYRSP <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	62,5	-	50-100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το 10% της ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προς κατανάλωση μέρους του φυτού (BBCH 41-49)	1
Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ) PIBSX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon</i> <i>pisum</i>	37,5	-	10-40	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια

Μπιζέλια ξηρά (Υ) PIBSA	ACYRON				την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι τον σχηματισμό των 9 πρώτων φύλλων και ελίκων. (BBCH 12-19)	
					Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των λοβών (BBCH 30-87)	1 εφαρμογή τον χρόνο
Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) PHSVX Κουκί χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) VICFX ΟΣΠΡΙΑ Φασόλι (Υ) PHSVX Κουκί (Υ) VICFX	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA	37,5	-	20-75	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των λοβών. BBCH 69-75	1 εφαρμογή τον χρόνο
					Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής κατά το στάδιο ανάπτυξης των πλευρικών βλαστών. BBCH 21-29	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια
Καπνός NIOTA	Αφίδες <i>Myzus nicotianae</i> MYZUNI <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	50	-	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του δεύτερου	1

					πραγματικού φύλλου μέχρι τα συγκομίσιμα φύλλα φτάσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 12-49)	
Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Τζιτζικάκια* <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	37,5	-	20-60	Ψεκάσμος καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την έναρξη αποξήρανσης του φυλλώματος (BBCH 12-90)	1 εφαρμογή τον χρόνο
Καλλωπιστικά Βολβώδη (NNNZL) (Θ)	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA	50	-	50-100	Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11)	4/7
Καλλωπιστικά (Θ): Ανθοκομικά και Πολυετή Καλλωπιστικά, Φυτώρια Δένδρων	Αφίδες <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Macrosiphum rosae</i> MACSRO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus ascalonicus</i> MYZUAS <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE	50	-	50-150	Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (από BBCH 11)	4/7
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	75	-	50-150		

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CCUPG Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CCUMA Σολανώδη (Θ): Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU	45 ανά ύψος φυτού 100 εκ.	60	75 λίτρα/ 100 εκ. ύψους φυτού	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-89) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	2/10
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	56 ανά ύψος φυτού 100 εκ.	75			
Φράουλα (Θ) FRAAN	Αφίδες <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> CHTSFR <i>Macrosiphum rosae</i> MACSRO	50	-	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πέμπτου (5 ^{ου}) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89)	2/10
	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	62,5				
Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ) (Raspberry) RUBID Μαύρο Βατόμουρο (Θ) (Blackberry) RUBFR	Αφίδες <i>Aphis idaei</i> APHIID <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	50 για ύψος κόμης 100 εκ. 100 για ύψος κόμης 200 εκ.	100	50 100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του πέμπτου (5 ^{ου}) πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 15-89) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	2/10
Καρότο DAUCS	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ψύλλα του καρότου <i>Bactericera trigonica</i>	37,5	-	30-80	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής το στάδιο του 9 ^{ου}	1

	BCTCTR				πραγματικού φύλλου μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εδώδιμου μέρους του φυτού (BBCH 19-49)	
Μηλιά* MABSD Αχλαδιά* PYUCO	Χρήση ήσσονος σημασίας: Ανθονόμος <i>Anthonomus pomorum</i> ANTHPO <i>Anthonomus piri</i> ANTHPY	12,5 για ύψος κόμης 100 εκ. 25 για ύψος κόμης 200 εκ. 37,5 για ύψος κόμης 300εκ.	-	30-150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος από το στάδιο της ρόδινης/ λευκής κορυφής έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 54-65)	1
Παρατηρήσεις: - Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα. - Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στα τζιτζικάκια στο βαμβάκι, τον μαύρο ακανθώδη αλευρώδη στην πορτοκαλιά, την κηκιδόμυγα, τη βαμβακάδα και τη μυτιλόμορφη ψώρα στην ελιά, τον θρίπα στο αμπέλι και στις καλλιέργειες της μηλιά και της αχλαδιάς. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος». Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με τις παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.						
Κερασιά PRSVX	Μαύρη αφίδα της κερασιάς <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE	12,5 για ύψος κόμης 100 εκ. 25 για ύψος κόμης 200 εκ. 37,5 για ύψος κόμης 300 εκ.	-	50 100 150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών. BBCH 69-81 Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 300 εκ.	1
Δαμασκηνιά PRNDO Χρήση ήσσονος σημασίας	Αφίδες <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Brachycaudus helichrysi</i> ANURHE	12,5 για ύψος κόμης 100 εκ. 25 για ύψος κόμης 200 εκ. 37,5 για ύψος	-	50 100 150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης των	1

		κόμης 300 εκ.			καρπών. BBCH 69-81 Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 300 εκ.	
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Νεραντζιά CIDAU Φράπα CIDGR	Αφίδες Aphididae 1APHIF	75	-	120-150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 55-75	1
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ	<u>Χρήσεις</u> <u>ή σσονος</u> <u>σημασίας:</u> Κοκκοειδή <i>Delottococcus</i> <i>aberiae</i> DLTCAB Ψύλλα των εσπεριδοειδών <i>Trioza erytreae</i> TRIZER Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης* <i>Aleurocanthus</i> <i>spiniferus</i> ALECSN	75	-	120-150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 55-75	1
Εσπεριδοειδή Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Κιτριά CIDME Πράσινη λεμονιά (Λάιμ) CIDAF	Αφίδες Aphididae 1APHIF	75	-	120-150	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 55-75 <u>(Αν καθοριστούν</u> <u>MRLs και στα</u> <u>προϊόντα των</u> <u>καλλιεργειών και</u>	1

					<u>το μέλι.)</u> Από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 69-75 (Αν καθοριστούν <u>MRLs μόνο στα προϊόντα των καλλιεργειών.)</u>	
Εσπεριδοειδή Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κοκκοειδή <i>Delottococcus aberiae</i> DLTCAB Ψύλλα των εσπεριδοειδών <i>Trioza erytreae</i> TRIZER	75	-	120-150	Ψεκάσμός καλύψεως φυλλώματος. Από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 55-75 (Αν καθοριστούν <u>MRLs και στα προϊόντα των καλλιεργειών και το μέλι.)</u> Από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των καρπών. BBCH 69-75 (Αν καθοριστούν <u>MRLs μόνο στα προϊόντα των καλλιεργειών.)</u>	1
Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) PHSVX Κουκί χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) VICFX	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA	37,5	-	20-75	Ψεκάσμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο εμφάνισης των οφθαλμών μέχρι το στάδιο	1 εφαρμογή τον χρόνο

ΟΣΠΡΙΑ Φασόλι (Υ) PHSVX Κουκί (Υ) VICFX					ανάπτυξης του 50% του τελικού μεγέθους των λοβών. BBCH 55-75	
Φραγκοστάφυλο (κόκκινο, μαύρο ή άσπρο) (Θ ¹) RIBNI, RIBRU (¹ Walk-in-tunnel Καλλιέργεια στο έδαφος)	Αφίδες Aphididae 1APHIF	20 για ύψος κόμης 100 εκ. 30 για ύψος κόμης 150 εκ.	-	50 100	Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων μέχρι μετά την ωρίμαση των καρπών για συγκομιδή (έναρξη της φυσικής αποκοπής των καρπών). BBCH 11-89 (<u>Αν καθοριστούν MRLs και στο προϊόν της καλλιέργειας και το μέλι.</u>) Από το τέλος της άνθησης μέχρι μετά την ωρίμαση των καρπών για συγκομιδή (έναρξη της φυσικής αποκοπής των καρπών). BBCH 69-89 (<u>Αν καθοριστούν MRLs μόνο προϊόν της καλλιέργειας.</u>) Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 150 εκ.	1

Αντιστοίχως θα τροποποιηθούν και τα σχετικά σημεία:

- Σημείο 11

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της μανταρινιάς, της λεμονιάς, της κιτριάς και

της πράσινης λεμονιάς

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια της κερασιάς και της δαμασκηιάς
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για την καλλιέργεια των φραγκοστάφυλων

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε:

μία αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της μανταρινιάς, της λεμονιάς, της κιτριάς, της πράσινης λεμονιάς της κερασιάς και της δαμασκηιάς

• Σημείο 13

Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά-Κιτριά (0110030), Πράσινη λεμονιά (0110040): 30 ημέρες

Κερασιά (0140020): 7 ημέρες

Δαμασκηιά (0140040): 14 ημέρες

Φραγκοστάφυλο (Θ) (0154030): 3 ημέρες

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασία για πρόσωπο και μάτια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια.

Σε περίπτωση εντατικής επαφής με το φύλλωμα της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή στο θερμοκήπιο, φοράτε αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe2: Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε αποστραγγιζόμενα εδάφη.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων για την καλλιέργεια τομάτας (Υ), πιπεριάς (Υ), μελιτζάνας (Υ), αγγουριού (Υ), κολοκυθίου (Υ), κολοκύθας (Υ), καρπουζιού (Υ) και καπνού
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή φυτική ζώνη

ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της πορτοκαλιάς, του γκρέιπφρουτ, της φράπας και της νεραντζιάς

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 μέτρων για την καλλιέργεια του μαρουλιού (Υ)
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες ελιάς, ξηρού μπιζελιού, μπιζελιού με ή χωρίς λοβό, φασολιού (χλωρό και όσπριο), κουκιού (χλωρό και όσπριο) και καρότου
- αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του βαμβακιού
- **φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς.**

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε:

- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη 5 μέτρων για τις καλλιέργειες αμπέλι, τομάτα (Υ), πιπεριά (Υ), μελιτζάνα (Υ), αγγούρι (Υ), κολοκύθι (Υ), κολοκύθα (Υ) και καρπούζι (Υ) ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50%
- μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80% για την καλλιέργεια της ελιάς
- μία αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της πορτοκαλιάς, του γκρέιπφρουτ, της φράπας και της νεραντζιάς
- **μία αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 70% ή μία αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις καλλιέργειες της μηλιάς και της αχλαδιάς.**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Πορτοκαλιά-Νεραντζιά (0110020) Γκρέιπφρουτ-Φράπα (0100000)	30
Βαμβάκι (0260030), Καρότο (0213020)	21
Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010) - οινοποιήσιμο (0151020) Ελιά επιτραπέζια (0161030) - ελαιοποιήσιμη (0402010)	14
Μπιζέλι με λοβό (0260030) (Υ) Μπιζέλι χωρίς λοβό (0260040) (Υ) Μπιζέλι ξηρό (0300030) (Υ) <u>1 εφαρμογή κάθε χρόνο</u>	7
Μπιζέλι με λοβό (0260030) (Υ)	Καθορίζεται από τον

Μπιζέλι χωρίς λοβό (0260040) (Υ) Μπιζέλι ξηρό (0300030) (Υ) <u>1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια</u>	χρόνο εφαρμογής (BBCH 12-19)
Φασόλι με λοβό (Υ)-Κουκί με λοβό (Υ) (0260010) Όσπρια Φασόλι-Κουκί (0300010) <u>1 εφαρμογή κάθε χρόνο</u>	7
Φασόλι χωρίς λοβό (Υ)-Κουκί χωρίς λοβό (Υ) (0260020) <u>1 εφαρμογή κάθε χρόνο</u>	3
Φασόλι με λοβό (Υ)-Κουκί με λοβό (Υ) (0260010) Φασόλι χωρίς λοβό (Υ)-Κουκί χωρίς λοβό (Υ) (0260020) Όσπρια Φασόλι-Κουκί (0300010) <u>1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια</u>	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Τομάτα (Υ/Θ) (0231010), Πιπεριά (Υ/Θ) (0231020), Μελιτζάνα (Υ/Θ) (0231030) Αγγούρι (Υ/Θ) (0232010), Κολοκύθι (Υ/Θ) (0232030), Κολοκύθα (Υ/Θ) (0233020) Καρπούζι (Υ/Θ) (0233030), Μαρούλι (Υ) (0251020), Φράουλα (Θ) (0632010), Σμέουρο/ Κόκκινο Βατόμουρο (Θ) (0153030), Μαύρο Βατόμουρο (Θ) (0153010)	3
Καπνός, Καλλωπιστικά (Θ)	Μη εφαρμόσιμο
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020)	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8067/106364 Ο.Ε./09.08.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ