



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθμ. πρωτ.

11.03.2025
66122

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα
Πληροφορίες:	Ν. Αβραμίδης		Αττικής
Τηλέφωνο:	210 92 87 224		
E-mail:	navramidis@minagric.gr	E-mail:	leda.zacharopoulou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60421 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCORE 25 EC (δ.ο. difenoconazole 25% β/ο), ως προς τα στοιχεία στον παρασκευαστή της δ.ο., στον κάτοχο της άδειας, στον υπεύθυνο επικοινωνίας και τελικής διάθεσης στην αγορά, στον παρασκευαστή του σκευάσματος, στις συσκευασίες, στις οδηγίες χρήσης, στο φάσμα δράσης, στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, στο χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις προειδοποιητικές λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο καθώς επίσης την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. (ΕΕ) 2024/197 της επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2023 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 1272/2008 όσον αφορά την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση ορισμένων ουσιών.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 408548/30.12.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 60421 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCORE 25 EC (δ.ο. difenoconazole 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7063/74836/10.06.2014 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία στον παρασκευαστή της δ.ο., στον κάτοχο της άδειας, στον υπεύθυνο επικοινωνίας και τελικής διάθεσης στην αγορά, στον παρασκευαστή του σκεύασματος, στις συσκευασίες, στις οδηγίες χρήσης, στο φάσμα δράσης, στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, στο χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις προειδοποιητικές λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες - αντίδοτο καθώς επίσης την προστασία των καταναλωτών.

Η άδεια διάθεσης στην αγορά διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60421

10.06.2014

15.03.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή

SCORE 25 EC

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική Ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Difenoconazole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

94% (β/β) min

Χημική ομάδα

ομάδα τριαζολών-DMIs

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG
CH 4058 - Basel, Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Crop Protection Monthey SA
Route de l'Île au Bois, CH-1870 Monthey, **Ελβετία**
2. Deccan Fine Chemicals (India) Private Ltd Kesavaram
Venkatanagaram Post Payakaraopeta Mandal, Visakhapatnam
District, Andra Pradesh 531 127, **Ινδία**

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές **κατατέθηκαν με την αριθμ. 101742/02.11.2011** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, **παρουσιάζονται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης**. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττική
Τηλ.:210-6666612-13
E-mail: leda.zacharopoulou@syngenta.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΛΔΑ: ΡΩΧ14653ΠΓ-Θ0Γ
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττική
Τηλ.:210-6666612-13
E-mail: leda.zacharopoulou@syngenta.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας 15349 Ανθούσα Αττική
Τηλ.:210-6666612-13
E-mail: leda.zacharopoulou@syngenta.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Syngenta Crop Protection AG
CH 4058 - Basel, Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Crop Protection Monthey SA
Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία
2. Chemark ZRT
06/75 hrsz., H-8182 Berhida, Peremarton-Gyartelep, Ουγγαρία
3. Schirm GmbH Schönebeck
Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218 Schönebeck/Elbe, Γερμανία
4. Syngenta Production France S.A.S.
Route de la Gare-BP 1, 30670 Aigues-Vives, Γαλλία
5. Phyteurop
Rue Pierre My, Z.I. de Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
6. SBM Formulation
CS 621, ZI Avenue Jean Foucault, 34535 Béziers Cedex, Γαλλία
7. Syngenta South Africa (Pty) Limited
4 Krokodildrift Road, Brits 0250, Νότια Αφρική
8. Syngenta Chemicals B.V.
Rue de Tyberchamps, 37, B-7180 Seneffe, Βέλγιο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

ΑΔΑ: ΡΩΧ14653ΠΓ-ΘΟΓ
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Crop Protection Monthey SA
Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία
2. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
2ο χλμ. Κοινοτικής οδού Οινοφύτων - Αγ. Θωμά, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας
3. Chemark ZRT
06/75 hrsz., H-8182 Berhida, Peremarton-Gyartelep, Ουγγαρία
4. Schirm GmbH Schönebeck
Geschwister-Scholl-Strasse 127, 39218 Schönebeck/Elbe, Γερμανία
5. Syngenta Production France S.A.S.
Route de la Gare-BP 1, 30670 Aigues-Vives, Γαλλία
6. Phyteurop
Rue Pierre My, Z.I. de Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
7. SBM Formulation
CS 621, ZI Avenue Jean Foucault, 34535 Béziers Cedex, Γαλλία
8. Syngenta South Africa (Pty) Limited
4 Krokodildrift Road, Brits 0250, Νότια Αφρική
9. Syngenta Chemicals B.V.
Rue de Tyberchamps, 37, B-7180 Seneffe, Βέλγιο

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: difenoconazole 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 74,92% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. **101742/02.11.2011** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, **παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης**. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες, Μπιτόνια	10 κ.εκ. έως 20 λίτρα	HDPE, HDPE-PA, f-HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται **μόνο** για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του **SCORE 25 EC** και ανακινείτε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχανήμα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν /ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (**φιάλες, μπιτόνια**) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:-

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει το δραστικό συστατικό difenconazole (τριαζόλη) που κινείται διελασματικά και έχει προληπτική δράση.

Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, λαχανικά, φράουλα, πατάτα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι κ.ά.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού		
Μηλιά (MABSD)	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> (VENTIN)	30	100-150	15-20	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) (BBCH 61-84)	3/10

Αχλαδιά (PYUCO) Μουσμουλιά (MSPGE) Κυδωνιά (CYDOB)	Φουζικλάδιο <i>Venturia pyrina</i> (VENTPI)	30	100-150	15-20	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας (περίπου το 10% των ανθέων έχει ανοίξει) έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης (φάση απόκτησης του τυπικού χρωματισμού της ποικιλίας) (BBCH 61-84)	3/10
Ροδακινιά (PRNPS)	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) Ωίδιο <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP) Εξώασκος <i>Taphrina</i> sp. (TAPHSP) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Φώμοψη* <i>Fusicoccum</i> <i>amygdale</i> (FUSCAM)	45	100-150	20-30	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 60) μέχρι 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή	2/7
Βερικοκιά (PRNAR)	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) Ωίδιο <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP) Εξώασκος <i>Taphrina</i> sp. (TAPHSP)	45	100-150	20-30	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 60) μέχρι 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή	2/7
Δαμασκηνιά (PRNDO) Κερασιά (PRNCE)	Φαιά σήψη <i>Monilia</i> sp. (MONISP) Ωίδιο <i>Sphaerotheca</i> sp. SPHRSP Εξώασκος <i>Taphrina</i> sp. (TAPHSP)	30	100-150	20	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανθοφορίας έως τα φρούτα να είναι ώριμα για συγκομιδή (BBCH 60-87)	3/10

Ελιά (OLVEU)	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium</i> sp. (CYCLSP) <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> (COLLGL) <i>Colletotrichum acutatum</i> (COLLAC) <i>Colletotrichum clavatum</i> (COLLCLO) Κερκόσπορα* <i>Pseudocercospora cladosporioides</i> (CERCCL)	50	80	50-60	Ψεκάσμος φυλλώματος όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους, ξεκινάει η σκλήρυνση του πυρήνα (παρουσιάζει αντίσταση στην απόσπαση) έως την ανάπτυξη του τυπικού χρωματισμού του καρπού (BBCH 75-85)	2/14
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ωίδιο <i>Erysiphe necator</i> (UNCINE) Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i> (GUIGBI)	20	100	12-20	Ψεκάσμος φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο του μαλακώματος των ραγών (BBCH 12-85)	4/10
Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Ωίδιο <i>Podosphaera</i> sp. (PODOSP)	50	50-100	50	Ψεκάσμος φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη συγκομιδή (BBCH 51-89)	2/7
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Ωίδιο <i>Podosphaera</i> sp. (PODOSP)	50	50-100	50	Ψεκάσμος φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη συγκομιδή (BBCH 51-89)	3/7
Σμέουρα (RUBFR) Βατόμουρα (RUBID)	Ωίδιο <i>Podosphaera</i> sp. (PODOSP) Δρεπανοπεζίζα <i>Drepanopeziza</i> sp. (DREPSP) Μαύρη σήψη <i>Didymella</i> sp. (DIDYSP) Σκωρίαση <i>Phragmidium</i> sp. (PHRASP)	40	50-100	30-40	Ψεκάσμος φυλλώματος από την έναρξη της ανάπτυξης των βλαστών έως την έναρξη του φουσκώματος των ανθοφόρων και φυλλοφόρων οφθαλμών (BBCH 31-49)	2/7

Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Leveillula</i> sp. (LEVESP) Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium</i> sp. (CLADSP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή (BBCH 20-87)	3/7
Πεπόνι (CUMME) Καρπούζι (CITLA) Αγγούρι (CUMSA) Κολοκύθι (CUUPG) (Α+Θ)	Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) <i>Sphaerotheca</i> sp. (SPHRSP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος Υ: Από την εμφάνιση των πρώτων θηλυκών ανθών έως τη συγκομιδή (BBCH 51-86) Θ: Από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή (BBCH 21-89)	3/8
Αγκινάρα (CYUSC)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Έλκος <i>Leptosphaeria</i> <i>maculans</i> (LEPTMA) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> sp. (MYCOSP) Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) <i>Leveillula</i> sp. (LEVESP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της ανάπτυξης της φυλλικής μάζας έως το 60% της μέγιστης φυλλικής μάζας (BBCH 40-46)	3/7
Κουνουπίδι (BRSOB) Λάχανο (BRSOL)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> <i>brassicicola</i> (MYCOBR)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους (BBCH 40-46)	3/10

Μπρόκολο (BRSOK)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) Έλκος <i>Leptosphaeria maculans</i> (LEPTMA) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella brassicicola</i> (MYCOBR)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως ότου φθάσει το 60% του τελικού της μεγέθους (BBCH 40-46)	3/10
Μαϊντανός (Υ) (PARCR)	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE), <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI) Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)	2/14
Μαϊντανός (Θ) (PARCR)	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE) <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI) Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)	3/14
Σέλερυ (Υ+Θ) (APUGD)	Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο διόγκωσης της βάσης των φύλλων έως ότου το φυτό φτάσει στο τυπικό του μέγεθος (BBCH 40-49)	Υ: 3/14 Θ: 2/14

Κρεμμύδι (ALLCE) Σκόρδο (ALLSA)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Σκωρίαση <i>Puccinia allii</i> (PUCCAL)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη έως τη λήξη της βολβοποίησης (BBCH 40-49)	2/12
Πράσο (ALLPO)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Σκωρίαση <i>Puccinia allii</i> (PUCCAL)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος από έναρξη της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου φυτικού μέρους έως το μήκος και η διάμετρος του βλαστού να φτάσουν το τυπικό τους μέγεθος (BBCH 40-49)	3/12
Σπαράγγι (ASPSS)	Σκωρίαση <i>Puccinia</i> sp. (PUCCSP) Στεμφύλιο <i>Stemphylium</i> sp. (STEMSP)	50	50-100	-	Όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως τη συγκομιδή (BBCH 41-89)	3/14
Πατάτα (SOLTU) Γλυκοπατάτα (IPOBA)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP)	60	50-100	-	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως τη συγκομιδή (BBCH 40-85)	3/7
Ζαχαρότευτλα (BEAVA) Παντζάρι (BEAVX)	Κερκοσπορίωση <i>Cercospora beticola</i> (CERCBE) Ραμουλάρια <i>Ramularia beticola</i> (RAMUBE) Ωίδιο <i>Erysiphe betae</i> (ERYSBF) Σκωρίαση <i>Uromyces betae</i> (UROMBE)	40-50	50-100	-	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο που τα φύλλα καλύπτουν το 10% της επιφάνειας του εδάφους έως τα τεύτλα/παντζάρια φτάσουν το τελικό μέγεθος για συγκομιδή (BBCH 31-49)	3/21
Όσπρια Ξηρά φασόλια (PHSVX) Φακές (LENCU) Ρεβίθι (CIEAR) Λούπινα (LUPAL)	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> (ASCOPI) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> sp. (MYCOSP)	40	40-50	-	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης ως τη συγκομιδή (BBCH 51-79)	2/21

Μελιτζάνα (Υ+Θ) (SOLME) Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Leveillula</i> sp. (LEVESP)	50	50-100	50	Ψεκάσμος φυλλώματος από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή (BBCH 20-87)	2/10
Λαχανάκια Βρυξελλών (BRISO)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) Έλκος <i>Leptosphaeria</i> <i>maculans</i> (LEPTMA) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> <i>brassicicola</i> (MYCOBR)	50	50-100	50	Ψεκάσμος φυλλώματος από την έναρξη ανάπτυξης των κεφαλών έως όπου το 70% των κεφαλών να έχουν κλείσει (BBCH 40-47)	2/14
Καλλωπιστικά (Υ+Θ): Τριαντάφυλλα (ROSSS) Χρυσάνθεμα (CHYHO) Γαρύφαλλα (DINCA) Γλαδιόλα (GLASS) Καλεντούλα (CLDOF) Ντάλια (DAHSS) Βερόνικα (VEROF) Μπιγκόνια (CMIGR) Ποτεντίλη (PTLER) Αγγελική (ANKAR) Ευώνυμο (EUOEU) Αλθαία (ALGOF)	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. (ALTESP) Κερκοσπορίωση <i>Cercospora</i> sp. (CERCSP) Ανθράκωση <i>Colletotrichum</i> sp. (COLLSP) Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. (ERYSSP) Σκωρίαση <i>Phragmidium</i> sp. (PHRASP) <i>Uromyces</i> sp. (UROMSP) <i>Puccinia</i> sp. (PUCCSP) <i>Phyllosticta</i> sp. (PHYSSP) Ραμουλάρια <i>Ramularia</i> sp. (RAMUSP) Σεπτόρια <i>Septoria</i> sp. (SEPTSP)	50	50-100	50	Ψεκάσμος φυλλώματος από την έναρξη ανάπτυξης της βλάστησης έως την ωρίμανση των σπόρων/ καρπών (BBCH 40-89)	3/14

	Στεμφύλιο <i>Stemphylium sp.</i> (STEMSP)					
Φύλλα σέλινου** (Υ) (APUGS) Φύλλα άνηθου** (Υ) (AFEGR) Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria sp.</i> (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE) <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI) Αλτερναρίωση <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)	2/14
Φύλλα σέλινου** (Θ) (APUGS) Φύλλα άνηθου** (Θ) (AFEGR) Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria sp.</i> (SEPTSP) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSHE) <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI) Αλτερναρίωση <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP)	50	50-100	50	Ψεκασμός φυλλώματος κατά το στάδιο της φυλλικής ανάπτυξης του φυτού (BBCH 40)	3/14
Καστανιά** (CSNSA) Χρήση ήσσονος σημασίας	Φαιά σήψη <i>Gnomoniopsis castaneae</i> (GNMPCA)	45	80-90	-	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 69-79)	2/14
Αμυγδαλιά** (PRNDU) Χρήση ήσσονος σημασίας	Φαιά σήψη <i>Monilia sp.</i> (MONISP)	45	80-90	-	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 69-79)	2/14
Φιστικιά** (PIAVE) Χρήση ήσσονος σημασίας	Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria sp.</i> (BOTSSP)	45	80-90	-	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό	2/14

					τους μέγεθος (BBCH 69-79)	
Καρυδιά** (IUGRE) Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση <i>Colletotrichum</i> sp. (COLLSP) Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium</i> sp. (CLADSP)	45	80-90	-	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογές από το τέλος της άνθησης και μέχρις ότου το 90% των καρπών πάρουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 69-79)	2/14

Παρατηρήσεις:

- Εφαρμόζετε την χαμηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι χαμηλή και την υψηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).
- Στα καλλωπιστικά, συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή πριν την καθολική εφαρμογή του σκευάσματος.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του γλοιοσπόριου και της κερκόσπορας στην ελιά και κατά της φώμοψης στη ροδακινιά. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα φύλλα σέλινου, τα φύλλα άνηθου, την καστανιά, την αμυγδαλιά, τη φιστικιά και την καρυδιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία difenoconazole που ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το Difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMs) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DIMs.

- Να μην γίνονται πάνω από το 50% των συνολικών εφαρμογών με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στις τριαζόλες.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

Μέχρι ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα κινδύνου:

			KΙΝΔΥΝΟΣ
GHS07	GHS08	GHS09	

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH 066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).**

SPr3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη:

- 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς
- 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού
- 15 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών (όψιμες εφαρμογές)
- 25 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών (πρώιμες εφαρμογές), της κερασιάς και της δαμασκηιάς
- 30 μέτρων για τις καλλιέργειες της βερικοκιάς και της ροδακινιάς - 12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες των ζαχαροτεύτλων, του παντζαριού, των ξερών φασολιών, της φακής, των ρεβιθιών και των λούπινων
- 10-12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τις καλλιέργειες της μελιτζάνας, της πιπεριάς, του αγγουριού, του κολοκυθιού, του πεπονιού, του καρπουζιού, της τομάτας, της φράουλας, της πατάτας, της γλυκοπατάτας, του κρεμμυδιού, του σκόρδου, του πράσου, του μαϊντανού, της αγκινάρας, του λάχανου, του κουνουπιδιού, του μπρόκολου, των λαχανακίων Βρυξελλών, του σέλερυ, των φύλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου και του σπαραγγιού
- 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της καστανιάς, της αμυγδαλιάς, της φιστικιάς και της καρυδιάς.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τα σμέουρα και τα βατόμουρα.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορεθούν.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μην προκαλείτε εμετό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Φράουλα (Y+Θ) (0152000), Τομάτα (Θ) (0231010), Αγγούρι (Y+Θ) (0232010), Κολοκύθι (Y+Θ) (0232030), Πεπόνι (Y+Θ) (0233010), Καρπούζι (Y+Θ) (0233030), Πατάτα (0211000), Γλυκοπατάτα (0212030), Μελιτζάνα (Y+Θ) (0231030), Πιπεριά (Y+Θ) (0231020)	3
Ροδακινιά (0140030), Κερασιά (0140020), Δαμασκηνιά (0140040), Σμέουρα (0153030), Βατόμουρα (0153010), Τομάτα (Y) (0231010), Βερικοκιά (0140010)	7
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Μουσμουλιά (0130040), Κυδωνιά (0130030), Αγκινάρα (Y) (0270050), Μπρόκολο (Y) (0241010), Κουνουπίδι (Y) (0241020), Μαϊντανός(Y+Θ) (0256040), Σέλερυ (Y+Θ) (0270030), Κρεμμύδι (Y) (0220020), Σκόρδο (Y) (0220010), Φύλλα σέλινου (Y+Θ) (0256030), Φύλλα άνηθου (Y+Θ) (0256030-006)	14
Αμπέλι (επιτραπέζιο 0151010 & οινοποιήσιμο 0151020), Πράσο (Y) (0270060), Λάχανο (Y) (0242020), Ζαχαρότευτλο (0900010), Παντζάρι (0213010), Λαχανάκια Βρυξελλών (0242010)	21
Όσπρια [Ξηρά φασόλια (0300010), Φακές (0300020), Ρεβίθι (0300030), Λούπινα (0300040)], Κάστανο (0120040), Αμύγδαλο (0120010), Φιστίκι (0120100), Καρύδι (0120110)	28
Ελιά (0161030 + 0402010)	30
Σπαράγγι (0270010), Καλλωπιστικά	--

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Παραμένει σταθερό για **δύο (2)** χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στην **έκθεση αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/ συμπληρωματικά στοιχεία: -

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7063/74836/10.06.2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ