



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.03.2025
Αριθμ. πρωτ: 79629

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Asahi Chemical Europe s.r.o., Τσεχίας
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
- Agribiz
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 8227 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ASAHI SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate 0,1% β/ο + sodium o-nitrophenolate 0,2% β/ο + sodium p-nitrophenolate 0,3% β/ο), ως προς τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα στοιχεία στο χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του σκευάσματος καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 45 αυτού.
 - (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 11199/15.01.2025 αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.

7. Την αριθμ. 13614/380691/11.12.2023 αίτηση και τα αριθμ. 54458/26.02.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 8227 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ASAHI SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate 0,1% β/ο + sodium o-nitrophenolate 0,2% β/ο + sodium p-nitrophenolate 0,3% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8700/95582/23.07.2014 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα στοιχεία στο χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του σκευάσματος καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **3, 5, 6, 7, 10, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός **ψεκαστικών μηχανημάτων**:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. **Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Πορτοκαλιά CIDSΙ	Βελτίωση της καρπόδεσης. Βελτίωση του μεγέθους, της ποιότητας των καρπών και ποσότητας της παραγωγής.	100	100	100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση των ταξιανθιών (πράσινοι οφθαλμοί) έως ότου οι καρποί να έχουν το 40% του τελικού τους μεγέθους. 3 ^{ος} ψεκασμός 30 μέρες μετά τον 2 ^ο ψεκασμό. (1 ^{ος} BBCH 55-59, 2 ^{ος} BBCH 67-71, 3 ^{ος} BBCH 72-74)	3/28
Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI	Βελτίωση του χρώματος των καρπών και της ποσότητας της παραγωγής.	100	100 (1 ^{ος} ψεκασμός) 50-100 (2 ^{ος} και 3 ^{ος} ψεκασμός)	100 (1 ^{ος} ψεκασμός) 100-200 (2 ^{ος} και 3 ^{ος} ψεκασμός)	Ψεκασμοί από την εμφάνιση των ταξιανθιών (πράσινοι οφθαλμοί) έως ότου οι καρποί να έχουν το 40% του τελικού τους μεγέθους. 3 ^{ος} ψεκασμός 30 μέρες μετά τον 2 ^ο ψεκασμό. (1 ^{ος} BBCH 55-59, 2 ^{ος} BBCH 67-71, 3 ^{ος} BBCH 73-75)	3/14
Φράουλα (θερμοκηπίου) FRAAN	Βελτίωση της καρπόδεσης. Βελτίωση του μεγέθους, της ποιότητας των καρπών και ποσότητας της παραγωγής.	100	167-333	30-60	Ψεκασμοί από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως την αρχή της ωρίμασης. (BBCH 55-85)	4/7
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) (VITVI)	Αύξηση γονιμότητας γύρης, καλύτερη γονιμοποίηση, παρθενοκαρπικό δέσιμο, βελτίωση μεγέθους & ποιότητας καρπών, πρωιμότητα.	50-75	50	100-150	1 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες πριν την άνθηση, 2 ^{ος} στην αρχή της άνθησης και επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες.	4/10
Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού LYPES, SOLME	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	100-250	40-100	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.	4/15

Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου LYPES, SOLME	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	50-200	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.	4/15
Πιπεριά Θερμοκηπίου CPSAN	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	50-200	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες.	5/15
Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου CUMSA CUUPG	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	50-200	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.	4/10
Ρύζι ORYSA	Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής.	50	-	30-100	Ένας ψεκασμός Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι πρώτοι κόκκοι να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 61-71)	1
Ελιά (επιτραπέζια, ελαιολιπώσιμη) OLVEU	Βελτίωση της άνθησης και της καρπόδεσης, της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής.	100	50-100	100-200	1 ^{ος} ψεκασμός στο στάδιο των μπουμπουκιών 2 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες αργότερα 3 ^{ος} ψεκασμός στην άνθηση και 4 ^{ος} ψεκασμός στην καρπόδεση.	4/10
Παρατηρήσεις: 1. Η δόση/ΗΛ θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψ.υ./στρ ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση/στρ. 2. Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή. Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέες MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.						
Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Αγρού και Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	100-250	40-100	1 ^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 2 ^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατό το 50% των χρήσιμων θηλυκών ανθέων 3 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες μετά το 2 ^ο ψεκασμό.	3/10

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Απαγορεύεται η χρήση επινώτιου ψεκαστήρα για τις καλλιέργειες μανταρινιάς και λεμονιάς. Να γίνεται η εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό μηχάνημα φερόμενο/συρόμενο από γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ).

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

ΕΥΗ 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
«Φοράτε προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες της μανταρινιάς και λεμονιάς με ψεκαστικό μηχάνημα φερόμενο/συρόμενο από γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ)».

«Κατά τον ψεκασμό στις υπόλοιπες καλλιέργειες φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή στις καλλιέργειες της μανταρινιάς και λεμονιάς, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια ή εφόσον τηρείται διάστημα επανεισόδου στον αγρό 3 ημερών φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).**

- 13** Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πορτοκαλιά (0110020)	32
Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά (0110030)	7
Φράουλα (θερμοκηπίου) (0152000)	7
Τομάτα(0231010) και Μελιτζάνα (0231030) Αγρού	3
Αμπέλι [επιτραπέζια (0151010) και οινοποιήσιμα (0151020) σταφύλια]	14

Τομάτα (0231010) και Μελιτζάνα (0231030) Θερμοκηπίου	3
Αγγούρι(0232010) και Κολοκυθάκι (0232030) Θερμοκηπίου	3
Ελιά (Επιτραπέζιες 0161030 & Ελαιοποιήσιμες 0402010)	60
Ρύζι (0500060)	30
Πιπεριά Θερμοκηπίου (0231020)	3

*Υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 5.1. παραπάνω.

Πεπόνι (0233010) και Καρπούζι (0233030) αγρού & θερμοκηπίου	3
--	---

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 8700/95582/23.07.2014 μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ