



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.03.2025
Αριθ. πρωτ.: 81439

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Industrial Química Key, S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14887 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KAPPA AGRO OIL MAX [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 79% β/o] σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
7. Την αριθμ. 350710/12.11.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14887 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KAPPA AGRO OIL MAX [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 79% β/o].

8. Την αριθμ. 6713/10.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14887 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) KAPPA AGRO OIL MAX [paraffin oil (CAS 8042-47-5) 79% β/ο], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 350710/12.11.2024 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Φράπα CIDGR	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU Άσπρη ψώρα <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria pergandii</i> PARLPE Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes beckii</i> LEPSBE Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Ακάρεα <i>Eutetranychus banksi</i> EUTEBA <i>Panonychus citri</i> METTCI	1000-1500	100-200	1000-3000	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Αχλαδομηλιά PYUPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Βαμβακάδα** <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	Ψευδόκοκκος** <i>Planococcus citri</i> PSECCI Ψώρες** <i>Eriococcus</i> <i>lagerstroemiae</i> ERIOLA Ματόψειρα** <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA					
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Δαμασκηνιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα <i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE <u>Χρήση ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Κίτρινος τετράνυχος** <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
Ελιά OLVEU	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	750-1500	50-100	375-1500	Εφαρμογή από τη συγκομιδή μέχρι την άνθηση BBCH 00-59 ή από την πτώση των πετάλων έως την έναρξη της πύξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου (μέγεθος 50% του τελικού) BBCH 71-75	1
	<u>Χρήσεις ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Παρλατόρια** <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Πολλίνια** <i>Pollinia pollini</i> POLNPO	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	

	Άσπρη ψώρα** <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE Μυτιλόμορφη ψώρα** <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Ψώρες** <i>Leucaspis riccae</i> LEUARI <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> CHRYDI Ακάρεα** <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI <i>Tegolophus hassani</i> TEGLSP <i>Oxycenus maxwelli</i> OXYNMA <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA					
Αμπέλι VITVI	Ψώρα <i>Parthenolecanium corni</i> LECACO Ψευδόκκοκος <i>Planococcus citri</i> PSECCI	750-1500	50-100	375-1500	Χειμερινή εφαρμογή πριν την άνθηση BBCH 00-57	1
	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> METTUL				Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	
	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ερίνωση** <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI				Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	
Αμυγδαλιά* PRNDU Χρήση ήσσονος σημασίας	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadrapsidiotus perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπιν <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	PSEAPE <i>Planococcus</i> <i>/Pseudococcus citri</i> PSECCI <i>Diaspis</i> sp. DIASSP Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU Ψώρες <i>Sphaerolecanium</i> <i>prunastri</i> LECAPN <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Παραμορφωτικό ακάρι <i>Aceria sheldoni</i> ACEISH Ακάρεα <i>Aculus pelekassi</i> ACULPE <i>Bryobia rubrioculus</i> BRYORU					
Φουντουκιά* CYLAV Χρήση ή σσονος σημασίας	Βαμβακάδα <i>Diaspis</i> sp. DIASSP Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Ακάρεα <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR					
Φιστικιά* PIAVE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Ψώρες <i>Parthenolecanium pruinsum</i> LECAPI <i>Parthenolecanium corni</i> LECACO <i>Coccus hesperidum</i> COCCH	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
Ροδιά* PUNGR Χρήση ήσσονος σημασίας	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Ακάρεα <i>Eriophyes grannati</i> ACEIGA	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
Συκιά* FIUCA Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU Ψευδόκοκκος <i>Planococcus ficus</i> PLANFI	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1
Ακτινιδιά* ATIDE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i>	750-1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.	1

	METTUL Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπης <i>Pseudauleacaspis pentagona</i> PSEAPE					
--	--	--	--	--	--	--

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.
6. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης ανά 100 λίτρα και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ.) ανά στρέμμα, όπως έχει οριστεί για κάθε καλλιέργεια.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, ροδιάς, συκιάς και ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στις χρήσεις ήσσονος σημασίας στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ελιάς και αμπελιού. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

11Δηλώσεις
προφύλαξης**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.**Spe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων σε εσπεριδοειδή, **ροδιά** και 10 μέτρων σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, **αμυγδαλιά, φουντουκιά, φιστικιά, συκιά και ακτινιδιά.****Spe3:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.**SPe8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο

που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030) Μανταρινιά (κλημεντίνες) (0110050) Πορτοκαλιά (0110020), Φράπα (0110010-002) Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020) Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040) Αχλαδόμηλα (0130020-001) Βερικοκιά (0140010), Κερασιά (0140020) Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002), Δαμασκηνιά (0140040) Ελιά (0402010), Αμπέλι (0151000) Αμυγδαλιά (0120010), Φουντουκιά (0120060), Φιστικιά (0120100) Ροδιά (0163050), Συκιά (0161020) Ακτινιδιά (0162010)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
 2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
 3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 350710/12.11.2024 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ