



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16-4-2025
Αριθ. Πρωτ.: 102998

Ταχ. Δ/νση	:Λεωφ. Α. Συγγρού 150 176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ	ΠΡΟΣ:	Nufarm GmbH &Co KG (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΤΚ 57022 l.vellis@efthymiadis.gr)
Πληροφορίες	:Μ.Γάσπαρη		
Τηλέφωνο	:210 – 928 7250		
e-mail	: mgaspari@minagric.gr		

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14661 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) CARNADINE (δ.ο. acetamiprid) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
 - γ) του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/158 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2025, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **acetamiprid** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 3504/49178/31-5-2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14661 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CARNADINE (δ.ο. acetamiprid) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την από 24/3/2025 εισήγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 50255/21-2-2025 αίτηση και τα από 11/3/2025, 24/3/2025 και 4/4/2025 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14661** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνου**) **CARNADINE (δ.ο. acetamiprid)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 3504/49178/31-5-2018 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς **το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.**

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:	Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών
			κ.εκ./στρ. (max)	κ.εκ. σκευάσμ. / 100 lt ψεκαστικού υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSI, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDNO, Γκρέιπ φρούτ CIDPA, Φράπα CIDGR, Λάιμ CIDAF		Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i> , <i>PHYNCI</i>)	50-70	35-50	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/ 30
		Πράσινη αφίδα (<i>Aphis spiraecola</i> , <i>APHISI</i>) Αφίδα βαμβακιού (<i>Aphis gossypii</i> , <i>APHIGO</i>) Μαύρη αφίδα (<i>Toxoptera aurantia</i> , <i>TOXOAU</i>)	35	25	60-140		
		Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantia</i> , <i>AONDAU</i>) Παρλατόρια (<i>Parlatoria pergandii</i> , <i>PARLPE</i> , Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus citri</i> , <i>PSECCI</i>)	150	50-70	100-200		
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO		Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>LITHBL</i> , <i>Phyllonorycter corylifoliella</i> , <i>PRYCCO</i> , <i>Leucoptera malifoliella</i> , <i>LEUCSC</i>)	25	25-35*	70-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/ 60
		Πράσινη αφίδα (<i>Aphis pomi</i> , <i>APHIPO</i>)	25	15-25	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
		Ρόδινη αφίδα (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>DYSAPL</i>) Αφίδα αχλαδιού (<i>Dysaphis pyri</i> , <i>DYSAPY</i>)	25	25	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	
		Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i> , <i>CARPPPO</i>)	25	35-50*	50-70*	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	
		Οπλοκάμπη (<i>Hopllocampa sp.</i>) (<i>HOPLSP</i>)	25	35-50*	50-70*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	

Ροδακινιά Νεκταρινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE) Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera malifoliella</i> , LEUCSC, <i>Phyllonorycter blancardella</i> , LITHBL) Τζιτζικάκια (<i>Empoasca sp.</i> , EMPOSP)	20	25-35*	55-80*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
	Αφίδες (<i>Hyalopterus pruni</i> , HYALPR, <i>Brachycaudus sp.</i> , ANURSI)	20	25	80	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	
	Θρίπες (<i>Thrips meridionalis</i> THRIME)	20	35-50*	40-55*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	
	Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i> LASPMO) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i> ANARLI)	20	35-50*	40-55*	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	
Δαμασκηλιά PRNDO	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Hyalopterus pruni</i> , HYALPR) Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera malifoliella</i> , LEUCSC, <i>Phyllonorycter blancardella</i> , LITHBL)	25	25	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/ 20
	Καρπόκαψα <i>Cydia funebrana</i> , LASPFU	25	25	100	Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις	
Κερασιά PRNAV	Ραγολέτις (<i>Rhagoletis cerasi</i> , RHAGCE)	35	25-35	100-150	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	2/ 14
	Μαύρη αφίδα (<i>Myzus cerasi</i> MYZUCE)	25	15-25	100-150		
Ελιά Ελαιοποιήσιμη OLVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> PRAYOL)	50	50	50-100	Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων	2/14
	Δάκος της ελιάς <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	50	25-50	50-100	Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	

Ελιά (επιτραπέζια) ΟΛVEU	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae PRAYOL</i>)	45	45	50-100	Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας ή καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων	1
	Δάκος της ελιάς <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	45	45	50-100	Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο) VITVI	Τζιτζικάκια (<i>Scaphoideus titanus, SCAPLI,</i> <i>Empoasca vitis, EMPOFL</i>)	25	25-35*	70-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana, POLYBO</i>)	25	35-45*	55-70*	Ψεκασμός κάλυψης σύμφωνα με τις Γεωρικές Προειδοποιήσεις	
Βαμβάκι GOSSS	Αφίδες (<i>Aphis gossypii, APHIGO</i>) <i>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</i> Καφέ Βρωμούσα <i>Halymorpha</i> <i>halys** (HALYHA)</i>	20		50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	2/ 20
Λουπά σαλατικά (εκτός baby leaf): -Κάρδαμο (LEPSA) -Γαιοκάρδαμο (BARVE) -Ρόκα (ERUVE) -Κόκκινο σινάπι (BRSJU)	Αφίδες (<i>Nasonovia ribis-nigri NASORN</i>)	25-35		50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
	(<i>Macrosiphum euphorbiae, MACSEU</i>) <i>Myzus persicae MYZUPE</i>	20-25		50-100		
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata, LPTNDE</i>)	10-15		40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	2/ 7
	Αφίδες (<i>Myzus persicae, MYZUPE,</i> <i>Macrosiphum euphorbiae, MACSEU</i>)	20		30-60		

Τομάτα (Υ) LYPES	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU)	20-25	20-25*	50-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> , BEMITA)	30	35-50*	60-85*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	
Τομάτα (Θ) LYPES	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU)	20-25	20-25*	50-100*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.	1
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> , BEMITA)	25	35-50*	50-70*	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	
Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> , MYZUPE, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , MACSEU)	20-25	20-25	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	2/ 20
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> , BEMITA)	35-50	35-50	100-170	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	
Κουνουπίδι (Υ) BRSOB, Μπρόκολο (Υ) BRBOK, Λάχανο (Υ) BRSOL	Πλουτέλλα (<i>Plutella xylostella</i> , PLUTMA)	25-35		50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	1
Ελαιοκράμβη BRBNN	Αφίδες (<i>Brevicoryne brassicae</i> , BRVCBR)	25		10-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	2/7
	Σκαθάρι της γύρης (<i>Meligethes aeneus</i> , MELIAE) <i>Phyllotreta atra</i> (PHYEAT)	30		10-40	Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.
2. Μην ψεκάζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικονίαση.
3. Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ/100 λιτ. ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

* Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο στρέμμα.

** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Για εφαρμογή σε δέντρα και στο αμπέλι:

“Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή”.

Για εφαρμογή σε θερμοκήπιο:

“Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή”.

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια.»

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μια:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 m για εφαρμογή σε ντομάτα μελιτζάνα, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf).
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 m για εφαρμογή σε πατάτα, αμπέλι και ελαιοκράμβη.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 m ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 m ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%, σε δαμασκηνιά.
- απέκαστη ζώνη 30 m ή απέκαστη ζώνη 20 m με χρήση ακροφυσίων

- μείωσης της διασποράς κατά 50% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε κερασιά.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 m, ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή.
 - αψέκαστη ζώνη 50 m με φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 m ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε εσπεριδοειδή (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση).
 - φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 m ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε ελιά.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργημένη γη:

- 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή νωρίς), βερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά.
- 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή 5 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή αργά) και κερασιά.
- 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο), δαμασκηνιά, μηλιά και αχλαδιά.
- 5 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% σε ντομάτα και μελιτζάνα.
- 15 m ή 10 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 m με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε ελιά.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ/στρέμμα), Βαμβάκι, Δαμασκηνιά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο	14
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	21
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα)	60
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Φράπα): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα)	30
Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf)	10
Πατάτα, Μελιτζάνα (Υ), Ελιά ελαιοποιήσιμη	7
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	21
Επιτραπέζια ελιά	28
Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά	3
Τομάτα (Υ)	14
Ελαιοκράμβη	20

Β

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. **3504/49178/31-5-2018** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ