



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 9-5-2025  
Αριθ. πρωτ: 122093

Ταχ. Δ/ση :Λεωφ. Α. Συγγρού 150  
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες :Μ.Γάσπαρη  
Τηλέφωνο :210 – 928 7250  
e-mail : [mgaspari@minagric.gr](mailto:mgaspari@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: LAINCO S.A. Ισπανίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ  
Ε.Ε. «Agribiz»  
TK 115 27 Αθήνα)  
[info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 61186 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) YADIKI (δ.ο. potassium phosphonate) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις :
  - του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
  - του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2024/2619 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2024, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας fosetyl, **potassium phosphonates** and disodium phosphonate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
- Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
- Τη με αριθ. πρωτ. 365496/22.11.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61186 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) YADIKI (δ.ο. potassium phosphonate), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τη με αριθ. πρωτ. 62503/7-3-2025 αίτηση.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **61186** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) YADIKI (δ.ο. **potassium phosphonate**), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 1070/16660/06.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το **φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή**.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                                                | Στόχος                                                                                       | Δόσεις σκευάσματος |                       |                               | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                                                                      | Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              | κ.εκ./ στρ         | κ.εκ / 100 λίτρα νερό | Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρ. |                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| Αμπέλι<br>(οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)<br>VITVI                                                                                                                                                                     | Περωνόσπορος<br><i>Plasmopara viticola</i><br>(PLASVI)                                       | 75-250             | 150-250               | 50-100                        | Ψεκασμοί φυλλώματος από το τέλος ανάπτυξης του φυλλώματος και επανάληψη εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (BBCH >20) | 3/10                                                                              |
| Εσπεριδοειδή<br>Γκρέιπ φρούτ<br>CIDPA<br>Λεμονιά CIDLI<br>Μανταρινιά<br>CIDRE<br>Πορτοκαλιά<br>CIDSΙ<br>Φράπα<br>CIDGR<br>Λιμμετία<br>(Πράσινο λεμόνι)<br>CIDAF<br>Κιτριά<br>CIDME<br>Νερατζιά<br>CIDAU<br>Περγαμόντο<br>CIDAB | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora</i> sp.<br>(PHYTSP)                                             | 150 - 875          | 150 - 250             | 100 - 350                     | Ψεκασμοί φυλλώματος μετά την έκπτυξη των βλαστών (BBCH >40)                                                                                      | 2/ 20                                                                             |
| Μηλοειδή<br>Μηλιά<br>MABSD<br>Αχλαδιά<br>PYUCO<br>Κυδωνιά<br>CYDOB<br>Μουσμουλιά<br>MSPGE<br>Ιαπωνική Μουσμουλιά<br>ΕΙΟJA                                                                                                      | Φουζικλάδιο<br><i>Venturia inaequalis</i><br>(VENTIN),<br><i>Venturia pyrina</i><br>(VENTPI) | 125-250            | 250                   | 50-100                        | Ψεκασμοί φυλλώματος από το τέλος της άνθησης έως την έναρξη ωρίμανσης του καρπού (BBCH 69-81)                                                    | 3/5                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |              |           |          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ελιά<br>(επιτραπέζιες και ελαιο-<br>ποιήσιμες ελιές)<br>OLVEU                                                                                                                                                                                                                                                                | Κυκλοκόνιο<br>( <i>Spilocaea<br/>oleaginea</i> )<br>CYCLOL | 120 -<br>250 | 150 - 250 | 80 - 100 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος<br>από την έναρξη<br>της βλάστησης<br>έως την έναρξη<br>χρωματισμού<br>του καρπού<br>(BBCH 11-81)                                                                                 | 3 / 10<br><br>1 ψεκασμός το<br>χειμώνα<br>2 ψεκασμοί την<br>άνοιξη |
| Μαρούλι (Υ)<br>LACSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Περονόσπορος<br><i>Bremia lactu-<br/>cae</i><br>(BREMLA)   | 45 – 250     | 150 – 250 | 30 – 100 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος<br>από την<br>εμφάνιση του<br>2 <sup>ου</sup><br>πραγματικού<br>φύλλου έως<br>ότου η κεφαλή<br>φθάσει στο<br>τυπικό της<br>μέγεθος και<br>μορφή<br>(BBCH 12-49)                   | 3 / 10                                                             |
| Λυκοτρίβολο (Υ)<br>VLLLO<br>Σκαρόλες<br>(πικρίδα) (Υ)/<br>πλατύφυλλα<br>αντίδια (Υ)<br>CICEL<br>Κάρδαμο &<br>άλλα<br>βλαστάρια &<br>φύτρες (Υ)<br>LEPSA<br>Γαιοκάρδαμο<br>(Υ) BARVE<br>Ρόκα (Υ)<br>ERUVV<br>Κόκκινο σινάπι<br>(Υ) BRSJU<br>Καλλιέργειες<br>νεαρών<br>φύλλων<br>(συμπεριλαμβανομένων<br>ειδών κράμβης)<br>(Υ) | Περονόσπορος<br><i>Bremia<br/>lactucae</i><br>(BREMLA)     | 45 – 250     | 150 – 250 | 30 – 100 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος<br>από την<br>εμφάνιση του<br>2 <sup>ου</sup><br>πραγματικού<br>φύλλου έως τα<br>προς συγκομιδή<br>φύλλα να<br>φτάσουν στο<br>τυπικό τους<br>μέγεθος και<br>μορφή<br>(BBCH 12-49) | 3 / 10                                                             |
| Φραγκομαϊντανός (Υ)<br>ANRCE<br>Σχοινόπρασο (Υ) ALLSC<br>Φύλλα σέλινου (Υ)<br>APUGS<br>Μαϊντανός (Υ)<br>PARCR<br>Φασκόμηλο (Υ)<br>SALOF<br>Δενδρολίβανο (Υ) RMSOF<br>Θυμάρι (Υ)                                                                                                                                              | Περονόσπορος<br><i>Bremia<br/>lactucae</i><br>(BREMLA)     | 45 – 250     | 150 – 250 | 30 – 100 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος<br>από την<br>εμφάνιση του<br>2 <sup>ου</sup><br>πραγματικού<br>φύλλου έως τα<br>προς συγκομιδή<br>φύλλα να<br>φτάσουν στο<br>τυπικό τους                                         | 3 / 10                                                             |

|                                                                                                           |                                                        |          |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ΤΗΥΝΥ<br>Βασιλικός (Υ)<br>ΟCΙΒΑ<br>Δάφνη/<br>Δαφνόφυλλα (Υ) LURNO<br>Δρακόντιο/<br>Εστραγκόν (Υ)<br>ARTDR |                                                        |          |           |          | μέγεθος και μορφή (BBCH 12-49)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Λωτός<br>DOSKA                                                                                            | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria alternata</i><br>(ALTEAL)  | 250      | 150 – 250 | 30 – 100 | Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καρποί αποκτήσουν το 60% του τελικού τους μεγέθους έως και την πλήρη ωρίμανση (BBCH 76-89)                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 / 15 |
| Αβοκάντο<br>PEBAM                                                                                         | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora cinnamomi</i><br>(PHYTCN) | 375      | 150 – 250 | 50 – 150 | Ψεκασμοί φυλλώματος, αργά την άνοιξη – καλοκαίρι<br>1 <sup>ος</sup> από την έναρξη της άνθισης έως την πτώση των πετάλων (BBCH 59-67)<br><br>2 <sup>ος</sup> όταν ο καρπός έχει μέγεθος 10mm έως ότου αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους (BBCH 71-75)<br><br>3 <sup>ος</sup> όταν ο καρπός αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους έως την ωρίμανση (BBCH 75-85) | 3 / 10 |
| Βατόμουρα (Υ)<br>RUBFR<br>Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ)<br>RUBID<br>Φραγκοστάφυλα (κόκκινα,            | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora</i> sp.<br>(PHYTSP)       | 45 – 250 | 150 – 250 | 30 – 100 | Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι βλαστοί αποκτήσουν το 30% του τελικού τους μήκους έως το τέλος της                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 / 10 |

|                                                                                                                                         |                                                                                                      |          |           |           |                                                                                                                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| μαύρα ή άσπρα) (Υ)<br>RIBNI & RIBRU<br>Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ)<br>RIBUC<br>Μύρτιλλα (Υ)<br>VACAN, VACCO,<br>VACVG |                                                                                                      |          |           |           | άνθισης<br>(BBCH 33-69)                                                                                                        |         |
| Ανανάς<br>ANHCO                                                                                                                         | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora nicotianae</i><br>(PHYTNN)<br><i>Phytophthora cinnamomi</i><br>(PHYTCN) | 600      | -         | 300 – 400 | Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο των 10 φύλλων μέχρι τον πλήρη σχηματισμό του καρπού (BBCH 10-79)                             | 2* / 20 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                      | -        | 150       | -         | 1 <sup>η</sup> εφαρμογή με εμβάπτιση κατά τη φύτευση (BBCH 00)                                                                 | 2*      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                      | 600      | 150       | 300 – 400 | 2 <sup>η</sup> εφαρμογή με ψεκασμό ένα μήνα μετά τη φύτευση (BBCH 05-10)                                                       |         |
| Πατάτα<br>SOLTU                                                                                                                         | Περονόσπορος<br><i>Phytophthora infestans</i><br>(PHYTIN)                                            | 250      | 150 – 250 | 30 – 100  | Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των κονδύλων (BBCH 12-49)   | 3 / 10  |
| Τομάτα (Θ)<br>LYPES<br>Μελιτζάνα (Θ)<br>SOLME                                                                                           | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora infestans</i><br>(PHYTIN)                                               | 45 – 250 | 150 – 250 | 30 – 100  | Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89) | 3 / 10  |
| Πιπεριά (Θ)<br>CPSAN                                                                                                                    | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora capsici</i><br>(PHYTCP)                                                 | 45 – 250 | 150 – 250 | 30 – 100  | Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως και την πλήρη                                  | 3 / 10  |

|                      |                                                     |          |           |          |                                                                                                                                                                   |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                      |                                                     |          |           |          | ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89)                                                                                                                                  |        |
| Φράουλα (Θ)<br>FRAAN | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora</i><br>sp.<br>(PHYTSP) | 45 – 250 | 150 – 250 | 30 – 100 | Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου έως οι πρώτοι καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 12-85) | 3 / 10 |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προβολής.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. \*Στην καλλιέργεια του ανανά δεν θα πρέπει οι εφαρμογές να ξεπερνούν τις δύο (2) συνολικά, ανά καλλιεργητική περίοδο.
4. Να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ.) ανά στρέμμα, όπως έχει οριστεί για κάθε καλλιέργεια.

Οι κάτωθι χρήσεις δεν εγκρίνονται αλλά θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

|                                                                                       |                                                     |          |           |          |                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Αζάρολος (Υ)<br>(μεσογειακά μούσμουλα)<br>CSCAZ<br>Καρποί<br>κουφοξυλιάς (Υ)<br>SAMNI | Φυτόφθορα<br><i>Phytophthora</i><br>sp.<br>(PHYTSP) | 45 – 250 | 150 – 250 | 30 – 100 | Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι βλαστοί αποκτήσουν το 30% του τελικού τους μήκους έως το τέλος της άνθισης (BBCH 33-69) | 3 / 10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Στο σημείο 13: Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

- Αζάρολος (Υ) (μεσογειακά μούσμουλα), καρποί κουφοξυλιάς (Υ): 7 μέρες

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετα-συλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα                                                                                                     | Ημέρες |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Μήλα - 0130010,<br>Αχλάδια – 0130020,<br>Κυδώνια – 0130030,<br>Μούσμουλα – 0130040,<br>Ιαπωνικά Μούσμουλα - 0130050 | 35     |
| Ανανάς - 0163080                                                                                                    | 30     |
| Λωτός - 0161060                                                                                                     | 20     |
| [Γκρέιπ φρουτ, Φράπα – 0110010],                                                                                    | 15     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>[Πορτοκαλιά, Περγαμόντο, Νεραντζιά – 0110020],<br/> [Λεμονιά, Κιτριά – 0110030],<br/> Λιμμετία (πράσινα λεμόνια) – 0110040,<br/> Μανταρινιά – 0110050,<br/> Αμπέλι (επιτραπέζιο) - 0151010<br/> Αμπέλι (οινοποιήσιμο) – 0151020,<br/> [Ελιά (επιτραπέζια) – 0161030,<br/> (ελαιοποιήσιμη) – 0402010]<br/> Μαρούλι (Υ) - 0251020,<br/> Λυκοτρίβολο (Υ) – 0251010,<br/> Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα<br/> αντίδια (Υ) – 0251030,<br/> Κάρδαμο &amp; άλλα βλαστάρια &amp; φύτερες<br/> (Υ) – 0251040,<br/> Γαιοκάρδαμο (Υ) – 0251050,<br/> Ρόκα (Υ) – 0251060,<br/> Κόκκινο σινάπι (Υ) – 0251070,<br/> Καλλιέργειες νεαρών φύλλων<br/> (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμ-<br/> βης) (Υ) – 0251080,<br/> Φραγκομαϊντανός (Υ) – 0256010,<br/> Σχοινόπρασο (Υ) – 0256020,<br/> Φύλλα σέλινου (Υ) – 0256030,<br/> Μαϊντανός (Υ) – 0256040,<br/> Φασκόμηλο (Υ) – 0256050,<br/> Δενδρολίβανο (Υ) – 0256060,<br/> Θυμάρι (Υ) – 0256070,<br/> Βασιλικός (Υ) – 0256080,<br/> Δάφνη/ δαφνόφυλλα (Υ) – 0256090,<br/> Δρακόντιο/ εστραγκόν (Υ) – 0256100,<br/> Αβοκάντο – 0163010,<br/> Πατάτα – 0211000,<br/> Τομάτα (Θ) – 0231010,<br/> Μελιτζάνα (Θ) – 0231030,<br/> Πιπεριά (Θ) - 0231020</p> |   |
| <p>Φράουλα (Θ) – 0152000,<br/> Βατόμουρα (Υ) – 0153010,<br/> Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ) –<br/> 0153030,<br/> Μύρτιλλα (Υ) – 0154010,<br/> Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, μαύρα,<br/> άσπρα) - 0154030<br/> Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, πράσινα,<br/> κίτρινα) - 0154040</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 |

**Β**

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

**Γ**

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 365496/22.11.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**