



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27.05.2025
Αριθ. πρωτ.: 139988

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14819 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO ENERGY (deltamethrin 1% β/ο + flupyradifurone 7,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς:
 - Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/2640 της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 1,4-διμεθυλοναφθαλίνιο, **διφθοροξικό οξύ (DFA)**, fluopyram και **flupyradifurone** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 512/160400.Ε./08.02.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14819 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO ENERGY (deltamethrin 1% β/ο + flupyradifurone 7,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 39097/11.02.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 14819 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SIVANTO ENERGY (deltamethrin 1% β/ο + flupyradifurone 7,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 512/160400.Ε./08.02.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5**, **6**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ./ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Τζιτζικάκια <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Empoasca viridula</i> EMPOVI	40	40	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH 69-81	2/14
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	-	75	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο έναρξης του κλεισίματος των γραμμών (10% των φυτών) έως 10 μέρες πριν την άνθηση. BBCH 31- 49	1
Γλυκό καλαμπόκι ZEAMS Αραβόσιτος ZEAMX	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	-	125	40-80	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο γεμίσματος των κόκκων. BBCH 70-75	1
	Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> DIABVI	-	75	40-80	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της έκπτυξης της	

					φύλλου έως 10 ημέρες πριν την άνθηση BBCH 51-58 και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο γεμίσματος των κόκκων. BBCH 71-75	
	<i>Zyginidia</i> sp. ZYGNSP	-	75	20-80	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως 10 ημέρες πριν την άνθηση BBCH 14-58 και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο γεμίσματος των κόκκων. BBCH 71-75	
Ελαιοκράμβη ανοιξιάτικη BRSNS Ελαιοκράμβη χειμερινή BRSNW	<i>Brassicogethes</i> (<i>Meligethes</i>) <i>aeneus</i> MELIAE	-	75	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την πλήρη ανάπτυξη των λοβών. BBCH 69-79	2/14
Σιτάρι ανοιξιάτικο TRZAS Σιτάρι χειμερινό TRZAW	Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Βρωμούσες <i>Eurygaster</i> spp. EURYSP Κνεφάσια <i>Cnephasia pumicana</i> CNEPPU <i>Calamobius filum</i> CALBFI	-	75	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH 69-83	2/14

Κριθάρι ανοιξιάτικο HORVS Κριθάρι χειμερινό HORVW	Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPPA <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Βρωμούσες <i>Eurygaster</i> spp. EURYSP Κνεφάσια <i>Cnephasia pumicana</i> CNEPPU <i>Calamobius filum</i> CALBFI	-	75	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH 69-83	2/14
Σίκαλη ανοιξιάτικη SECCS Σίκαλη χειμερινή SECCW	Αφίδες <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Βρωμούσες <i>Eurygaster</i> spp. EURYSP Κνεφάσια <i>Cnephasia pumicana</i> CNEPPU	-	75	20-60	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής μετά το τέλος της άνθησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH 69-83	2/14

Παρατηρήσεις:

- Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές deltamethrin, flupyradifurone οι οποίες ανήκουν στις ομάδες 3 και 4, αντίστοιχα κατά IRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε το ψεκαστικό διάλυμα.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασία για μάτια και πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe2: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε τα παρακάτω:

- Αμπέλι: Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Πατάτα για πρώιμες και όψιμες εφαρμογές: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Ελαιοκράμβη Ανοιξιάτικη: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Ελαιοκράμβη Χειμερινή: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Γλυκό καλαμπόκι, **αραβόσιτος** (1 εφαρμογή με 125 κ.εκ/στρ.): μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
- Γλυκό Καλαμπόκι, **αραβόσιτος** (1 εφαρμογή με 75 κ.εκ/στρ.): μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Σιτάρι Ανοιξιάτικο, Κριθάρι Ανοιξιάτικο, Σίκαλη Ανοιξιάτικη: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Σιτάρι Χειμερινό, Κριθάρι Χειμερινό, Σίκαλη Χειμερινή: μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους αφήστε τα παρακάτω:

- Αμπέλι: μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%.
- Για τις λοιπές καλλιέργειες: μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5

μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90% ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες (0151010) και Επιτραπέζιες ποικιλίες (0151020) Πατάτες (0211000)	14
Γλυκό καλαμπόκι (0234000) Αραβόσιτος (050030)	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Ελαιοκράμβη χειμερινή/ανοιξιάτικη (0401060)	45
Κριθάρι χειμερινό/ανοιξιάτικο (050010) Σίκαλη χειμερινή/ανοιξιάτικη (0500070) Σιτάρι χειμερινό/ανοιξιάτικο (0500090)	30

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 512/160400.Ε./08.02.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ