



Ορθή επανάληψη ως προς το σημείο 13 και συγκεκριμένα την αφαίρεση των καλλιεργειών Κερασιά (0140020), Βυσσινιά(0140990), Δαμασκηλιά (0140040), Ιαπωνική Δαμασκηλιά (0140990), Κορομηλιά (0140990) (Αριθ. Πρωτ. 149524/04.06.2025).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.06.2025
Αριθ. πρωτ: 145231

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ABEE
Αγησιλάου 6-8,
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60697 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (δ.ο. fluopyram + trifloxystrobin), ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή καθώς επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 & 45 αυτού.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).

- 4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικών κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄ 2339/14.05.2025).
- 5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
- 6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
- 7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
- 8. Την αριθμ. 91751/ 04.04.2025 απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 60697 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (δ.ο. fluopyram + trifloxystrobin).
- 9. Την από τον Ιούλιο του 2024 έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου-ΜΦΙ (ΕΜΠ 453) για την επέκταση του φάσματος δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος LUNA SENSATION SC.
- 10. Την αριθμ. 4456/117979/29.04.2021 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 53231/25.02.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 60697 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (δ.ο. fluopyram + trifloxystrobin), που ανανεώθηκε με την αριθμ. 91751/ 04.04.2025 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή καθώς επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 6, 10, 11, 13 και 17 διαμορφώνονται ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λτ. ψεκ. υγρού	κ.εκ./στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού (λτ./στρ.)		
Μαρούλι (Θ) (LACSA)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC) <i>S. minor</i> (SCLEMI) Ριζοκτόνια <i>Rhizoctonia solani</i> (RHIZSO) Κερκοσπορίωση <i>(Cercospora beticola)</i> (CERCBE)	---	80	30-80	Εφαρμογή από την εμφάνιση του 3ου φύλλου μέχρι το μαρούλι να φτάσει το 50% του τυπικού μεγέθους του (BBCH 13-45).	1

Καπνός (NIOTA)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC) <i>S. minor</i> (SCLEMI)	---	80	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο που το φυτό έχει φτάσει το 50% του τελικού ύψους του μέχρι το 20% της άνθησης (BBCH 35-62).	1
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> / <i>Podosphaera macularis</i> (SPHRMA) Ανθράκωση <i>Colletotrichum fragariae</i> (COLLFR) Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σεπτορίωση <i>Mycosphaerella fragariae</i> (MYCOFR)	---	80	30-80	Εφαρμογή από την έναρξη ανάπτυξης των νεαρών φυτών (σχηματισμός των στολώνων) μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 40-89).	(Θ): 2 / 7
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες) (VITVI)	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> / <i>Erysiphe necator</i> (UNCINE)	(10-67)	20	50-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως το μέγεθος σκαγιού (BBCH 15-73).	2 / 21
	Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i> (GUIGBI)	(13-67)	20			2 / 14
Φασόλια με λοβό (Υ) (PHSVX)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC)	---	80	30-80	Εφαρμογές από την πλήρη ανάπτυξη/ εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι οι λοβοί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 61-75).	1
Τομάτα (Θ) (LYPES) Πιπεριά (Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	40	30	75	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας</u> <u>100 εκ.</u>	2/10-14
Ροδακινιά¹ (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR)	Μονιλία <i>Monilinia laxa</i> (MONILA) <i>Monilinia fructigena</i> (MONIFG)	---	50	25-150	Εφαρμογές από το στάδιο των κλειστών ανθέων (κλειστά μπουμπούκια)	1

	<i>Monilinia fructicola</i> (MONIFC)				έως την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 55-87)	
	Ωίδιο <i>Podosphaera pannosa</i> (SPHRPA)	---	30	25-150	Εφαρμογές από το στάδιο των κλειστών ανθέων (κλειστά μπουμπούκια) έως την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 55-87)	2/7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Η χρήση στη φράουλα θερμοκηπίου δεν περιλαμβάνει προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.
2. Η χρήση του σκευάσματος σε θερμοκήπια υδροπονίας επιτρέπεται μόνο αν διαθέτουν σύστημα ανακύκλωσης του νερού.
3. Αποφύγετε εφαρμογή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
4. Στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος μόνο μέχρι ύψος φυτών ενός (1) μέτρου.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία *trifloxystrobin*, η οποία ανήκει στην ομάδα 11 (Quinone outside Inhibitors- QoIs) κατά FRAC και τη δραστική ουσία *fluopyram*, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 (Succinate dehydrogenase inhibitors- SDHIs) κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται :

- το σκεύασμα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες δράσης με μη διασταυρούμενη ανθεκτικότητα.
- το σκεύασμα να χρησιμοποιείται προληπτικά ή στην αρχή της προσβολής. Κάτω από υψηλή προσβολή το μεσοδιάστημα των επεμβάσεων να μην ξεπερνά τις 7-10 ημέρες.
- να μην πραγματοποιούνται περισσότερες από 4 εφαρμογές με μυκητοκτόνα της ομάδας QoIs ή SDHIs σε καλλιέργειες που εκτελούνται 12 ή περισσότερες εφαρμογές.
- να πραγματοποιούνται το μέγιστο 2 συνεχόμενες εφαρμογές με μυκητοκτόνα της ομάδας QoIs και SDHIs.

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει Trifloxystrobin, 1,2-benzisothiazolin-3-one, ενεργό μίγμα από 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).

H362: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
 P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.
 P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

«Να αφήνεται αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων στην καλλιέργεια αμπέλου για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων.»

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- για τις καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
- για την καλλιέργεια της φράουλας μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων.
- για την καλλιέργεια μαρουλιού μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
- για την καλλιέργεια αμπελιού μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- για την καλλιέργεια φασολιού και καπνού μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- **για τις καλλιέργειες πυρηνοκάρπων:**
 - α)** για μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. / στρέμμα και για πρώιμες εφαρμογές μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
 - β)** για μία εφαρμογή με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. / στρέμμα και για όψιμες εφαρμογές μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση

- ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%
- γ) για δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 30 κ.εκ. /στρέμμα και για πρώιμες εφαρμογές, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή 30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
- δ) για δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 30 κ.εκ. /στρέμμα και για όψιμες εφαρμογές, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 25% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία, κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη και κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων (ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία).

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αμπέλι [Οινοποιήσιμες (0151020) και Επιτραπέζιες (0151000) ποικιλίες], Φασόλια με λοβό (Υ) (0260030)	14
Μαρούλι (Θ) (0251020), Ροδακινιά (και Νεκταρινιά) (0140030), Βερικοκιά (0140010)	7
Φράουλα (Θ) (0152000), Πιπεριά (Θ) (0231020), Τομάτα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030)	3
Καπνός	Όπως ορίζεται από το στάδιο της καλλιέργειας κατά τον χρόνο εφαρμογής

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- An assessment of the toxicological profile of plant metabolites of trifloxystrobin (including its structural isomers) and their exposure
- Pending information on the toxicological profile of CGA 321113, feeding studies on ruminants including measurement of the conjugated residues of CGA 321113 in liver and kidney might be necessary.
- **An assessment of the toxicological profile of plant metabolites of trifloxystrobin (including its structural isomers) and their exposure (EFSA, 2017).**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρθμ. 91751/ 04.04.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ