



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.06.2025  
Αριθ. πρωτ.: 153987

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ  
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της με αριθ. 14511 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΤΕΡΡΕΚΙ (flonicamid 50 % β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
7. Την αριθμ. 5078/59875/29.05.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14511 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΤΕΡΡΕΚΙ (flonicamid 50 % β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την αριθμ. 79440/24.03.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14511 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΤΕΡΡΕΚΙ (flonicamid 50 % β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5078/59875/29.05.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                      | Στόχος                                                                                                                                                                                                  | Δόσεις σκευάσματος |                          |                            | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής                                                       | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | γρ./στρέμμα        | γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ |                                                                                   |                                                                         |
| <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u><br>Πορτοκαλιές<br>CIDSΙ<br>Μανταρινιές<br>CIDRE<br>Λεμονιές<br>CIDLI<br>Γκρέιπφρουτ<br>CIDPA<br>Κιτριά<br>CIDME<br>Φράπες<br>CIDGR<br>Νεραντζιές<br>CIDAU<br>Περγαμόντο<br>CIDAB | Αφίδες<br>Εσπεριδοειδών<br><i>Aphis citricola</i><br>APHISΙ<br><i>Toxoptera auranti</i><br>ΤΟΧΟΑΥ<br><i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE                                 | 10                 | 3,5-10                   | 100-300                    | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup> | 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται                             |
| <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u><br>Ροδακινιές<br>PRNPS                                                                                                                                                            | Αφίδες<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Hyalopterus pruni</i><br>HYALPR<br><i>Brachycaudus helichrysi</i><br>ANURHE<br><i>Brachycaudus schwartzi</i><br>APPESW                                  | 14                 | 8-14                     | 100-150                    | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup> | 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                             |
| <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u><br>Κερασιές<br>PRNAV                                                                                                                                                              | Αφίδες<br><i>Myzus cerasi</i><br>MYZUCE<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Brachycaudus helichrysi</i><br>ANURHE<br><i>Brachycaudus schwartzi</i><br>APPESW<br><i>Hyalopterus pruni</i><br>HYALPR | 14                 | 8-14                     | 100-150                    | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup> | 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                             |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |    |      |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u><br>Δαμασκηνιές<br>PRNDO                                           | Αφίδες<br><i>Hyalopterus pruni</i><br>HYALPR<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Brachycaudus helichrysi</i><br>ANURHE<br><i>Brachycaudus schwartzi</i><br>APPESW                      | 14 | 8-14 | 100-150 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                      | 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                                |
| <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u><br>Μηλιές<br>MABSD                                                   | Γκριζα αφίδα<br><i>Dysaphis plantaginea</i><br>DYSAPL<br><i>Dysaphis pyri</i><br>DYSAPY<br><i>Eriosoma lanigerum</i><br>ERISLA<br>Πράσινη αφίδα<br><i>Aphis pomi</i><br>APHIPO              | 14 | 8-14 | 100-150 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                      | 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                                |
| <u>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</u><br>Αχλαδιές<br>PYUCO<br>Αχλαδιές NASHI<br>PYUPC<br>Κυδωνιές<br>CYDOB | Αφίδες<br>Γκριζα αφίδα της αχλαδιάς<br><i>Dysaphis pyri</i><br>DYSAPY<br><i>Eriosoma lanigerum</i><br>ERISLA                                                                                | 14 | 8-14 | 100-150 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                      | 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                                |
| <u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u><br>Τομάτες<br>LYPES<br>Μελιτζάνες<br>SOLME<br>υπαίθρου               | Αφίδες<br><i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>MACSEU<br><i>Macrosiphum</i> sp.<br>MACSSP<br><i>Aphis fabae</i><br>APHIFA | 10 | --   | 50-100  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                      | 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται                                                |
| <u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u><br>Τομάτες<br>LYPES<br>Μελιτζάνες<br>SOLME<br>θερμοκηπίου            | Αφίδες<br><i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>MACSEU<br><i>Macrosiphum</i> sp.<br>MACSSP<br><i>Aphis fabae</i>           | 10 | --   | 50-100  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. <sup>(1)</sup> (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα | 3 εφαρμογές max<br>(1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | ΑΡΗΙΦΑ                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |         | έντομα)                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ</u><br>Τομάτες<br>LYPES<br>Μελιτζάνες<br>SOLME<br><br>Θερμοκηπίου<br>(εφαρμογές με<br>στάγδην άρδευση) | Αλευρώδεις<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA<br><i>Trialeurodes</i><br><i>vaporariorum</i><br>TRIAVA                                                                                                                                                | 16 | -- | 200-500 | Η πρώτη<br>εφαρμογή γίνεται<br>στα φύλλα<br>ενάντια στις<br>αφίδες. Σε αυτή<br>την περίπτωση ο<br>αριθμός<br>εφαρμογών είναι<br>max 3 με δύο<br>επεμβάσεις<br>στάγδην άρδευση<br>και μία<br>φυλλώματος          |                                                        |
| <u>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</u><br>Αγγούρια<br>CUMSA<br>Αγγουράκια<br>CUMSA<br>Κολοκυθάκια<br>CUUPG<br><br>Θερμοκηπίου        | Αφίδες<br><i>Aphis gossypii</i><br>ΑΡΗΙΓΟ<br><i>Myzus persicae</i><br>ΜΥΖΥΡΕ<br><i>Macrosiphum</i><br><i>euphorbiae</i><br>MACSEU<br><i>Macrosiphum</i> sp.<br>MACSSP<br><i>Aphis fabae</i><br>ΑΡΗΙΦΑ                                                | 10 | -- | 50-100  | Εφαρμογή με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής χωρίς<br>την παρουσία<br>μελισσών. <sup>(1)</sup><br>(ιδιαίτερα στο<br>θερμοκήπιο όταν<br>το 5% των<br>φύλλων έχει<br>προσβληθεί από<br>1 ή περισσότερα<br>έντομα) | 3 εφαρμογές<br>ανά 14 ημέρες<br>εφόσον<br>απαιτείται   |
| Σιτάρι<br>TRZSS                                                                                                    | Αφίδες<br><i>Aphis nasturtii</i><br>ΑΡΗΙΝΑ<br><i>Macrosiphum</i><br><i>avenae</i><br>MACSAV<br><i>Macrosiphum</i><br><i>dirhodum</i><br>MACSSP<br><i>Metopolophium</i><br><i>dirhodum</i><br>METODR<br><i>Rhopalosiphum</i><br><i>padi</i><br>RHOPPA | 14 | -- | 20-50   | Εφαρμογή με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής χωρίς<br>την παρουσία<br>μελισσών                                                                                                                                  | 2 εφαρμογές<br>ανά 21 ημέρες<br>εφόσον<br>απαιτείται   |
| Καπνός<br>ΝΙΟΤΑ                                                                                                    | Αφίδες<br><i>Myzus</i> sp.<br>ΜΥΖΥΡΕ<br><br><u>Χρήση ήσσονος</u><br><u>σημασίας:</u><br>Θρίπες<br><i>Thrips tabaci</i> *<br>ΘΡΙΤΒ                                                                                                                    | 14 | -- | 40-60   | Εφαρμογή με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής χωρίς<br>την παρουσία<br>μελισσών                                                                                                                                  | 2 εφαρμογές<br>ανά 14 ημέρες<br>εφόσον<br>απαιτείται   |
| Καπνός**<br>ΝΙΟΤΑ<br>(εφαρμογή με<br>ριζοπότισμα με το                                                             | Αφίδες<br><i>Myzus nicotianae</i><br>ΜΥΖΥΝΙ<br><i>Myzus</i> sp.                                                                                                                                                                                      | 14 | -- | 40-60   | Εφαρμογή κατά<br>τη μεταφύτευση<br>χωρίς την<br>παρουσία                                                                                                                                                        | 2 εφαρμογές<br>max<br>(1 εφαρμογή με<br>ριζοπότισμα με |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                           |       |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| νερό της μεταφύτευσης)<br><br><i>Χρήση ήσσονος σημασίας</i>                                                                       | MYZUSP<br><i>Aphis</i> sp.<br>APHISP<br>Θρίπες<br><i>Thrips tabaci</i><br>THRITB                                                                 |                                                           |       |        | μελισσών                                                                                                                                                                                 | το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος μετά από 14 ημέρες) εφόσον απαιτείται |
| Βαμβάκι<br>GOSHI                                                                                                                  | Αφίδες<br><i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO<br><br><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br>Λύγκος *<br><i>Lygus</i> sp.<br>LYGUSP                        | 7,5                                                       | --    | 50-80  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                                        | 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται                                            |
| Αρακάς (με λοβό)**<br>PIBSX<br>Υπαίθρου<br><br><u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u>                                                      | Αφίδες<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Aphis fabae</i><br>APHIFA                                                                        | 14                                                        | 35-70 | 20-40  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6 <sup>ου</sup> ξεδιπλωμένου φύλλου (BBCH 16) χωρίς την παρουσία μελισσών                                                       | 1 εφαρμογή                                                                               |
| <u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</u><br>2ORNH<br>Τριανταφυλλιές<br>ROSSS<br><br>υπαίθρου και θερμοκηπίου                                      | Αφίδες<br><i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO<br><i>Myzus persicae</i><br>MYZUPE<br><i>Macrosiphum</i> sp.<br>MACSSP<br><i>Aphis fabae</i><br>APHIFA | 14                                                        | --    | 50-100 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων. <sup>(1)</sup> (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα) | 3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                           |
| <u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ</u><br>2ORNW                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                           |       |        | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών                                                                                                                       |                                                                                          |
| Μαρούλι<br>LACSA<br>Σκαρόλες (πικρίδα)/<br>Πλατύφυλλα<br>Αντίδια<br>CICEN<br>Ρόκα<br>ERUVE<br>Λυκοτρίβολο<br>VLLLO<br>Γαιοκάρδαμο | Αφίδες<br><i>Nasonovia ribisnigri</i><br>NASORN<br><br><i>Myzus</i> sp.<br>MYZUSP<br><br><i>Macrosiphum</i> sp.<br>MACSSP                        | 2 mg<br>σκ./φυτό<br><br>(αντιστοιχεί σε 14 γρ. σκ./ στρ.) | --    | --     | Εμβάπτιση/ διαβροχή του δίσκου σποράς πριν την μεταφύτευση των νεαρών φυταρίων, από την ανάπτυξη του 1 <sup>ου</sup> φύλλου έως 6 <sup>ου</sup> φύλλου νωρίς την άνοιξη μέχρι            | 1 εφαρμογή                                                                               |

|                                                                   |                                                                                                                                                 |    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BARVE<br>Κόκκινο σινάπι<br>BRSJU                                  | <i>Aphis gossypii</i><br>APHIGO                                                                                                                 |    |    |       | το τέλος του<br>φθινοπώρου<br>BBCH 11-16                                                                                                                                                                                                         |            |
| Μπιζέλι με λοβό<br>PISBX                                          | Αφίδες<br><i>Acyrtosiphon</i><br><i>pisum</i><br>ACYRON                                                                                         | 14 | -- | 20-60 | Εφαρμογή με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής, από το<br>στάδιο έκπτυξης<br>του πρώτου<br>πραγματικού<br>φύλλου έως όταν<br>το 10% των λοβών<br>φτάσει το τυπικό<br>μήκος του καρπού<br>(την Άνοιξη, από<br>Απρίλιο έως<br>Οκτώβριο<br>BBCH 11-71 | 1 εφαρμογή |
| Φασόλι με λοβό<br>PHSVX                                           | Αφίδες<br><i>Acyrtosiphon</i><br><i>pisum</i><br>ACYRON<br><br><u>Χρήση ήσσονος<br/>σημασίας:</u><br><i>Aphis fabae</i> *<br>APHIFA             | 14 | -- | 20-60 | Εφαρμογή με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής, από το<br>στάδιο έκπτυξης<br>του πρώτου<br>πραγματικού<br>φύλλου έως όταν<br>το 10% των λοβών<br>φτάσει το τυπικό<br>μήκος του καρπού<br>(την Άνοιξη, από<br>Απρίλιο έως<br>Οκτώβριο<br>BBCH 11-71 | 1 εφαρμογή |
| Όσπρια:<br>Μπιζέλι<br>PISBX<br>Φασόλι<br>PHSVX                    | Αφίδες<br><i>Acyrtosiphon</i><br><i>pisum</i><br>ACYRON<br><br><u>Χρήση ήσσονος<br/>σημασίας:</u><br><i>Aphis fabae</i> *<br>APHIFA             | 14 | -- | 20-60 | Με την εμφάνιση<br>της προσβολής,<br>από το στάδιο<br>έκπτυξης του<br>πρώτου<br>πραγματικού<br>φύλλου έως όταν<br>το 10% των λοβών<br>φτάσει το τυπικό<br>μήκος του καρπού<br>(την Άνοιξη, από<br>Μάρτιο έως<br>Οκτώβριο<br>BBCH 11-71           | 1 εφαρμογή |
| Φακή (όσπριο)**<br>LENCU<br><br><i>Χρήση ήσσονος<br/>σημασίας</i> | Αφίδες<br><i>Acyrtosiphon</i><br><i>pisum</i><br>ACYRON<br><i>Aphis fabae</i><br>APHIFA<br><i>Aphis</i> sp.<br>APHISP<br><i>Macrosiphum</i> sp. | 14 | -- | 20-60 | Εφαρμογή με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής, από<br>το στάδιο<br>έκπτυξης του 1 <sup>ου</sup><br>πραγματικού<br>φύλλου έως την<br>πλήρη άνθηση<br>(έχει ανοίξει το                                                                              | 1 εφαρμογή |

|                                                                 |                                                                                          |    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                 | MACSSP<br><i>Myzus</i> sp.<br>MYZUSP                                                     |    |    |       | 50% των ανθέων)<br>(την Άνοιξη, από<br>Μάρτιο έως<br>Οκτώβριο<br>BBCH 11-65                                                                                                                                                                        |            |
| Λούπινο<br>(όσπριο)**<br>LUPAL<br><br>Χρήση ήσσονος<br>σημασίας | Αφίδες<br><i>Aphis</i> sp.<br>APHISP<br><i>Macrosiphum</i><br><i>albifrons</i><br>MACSAL | 14 | -- | 10-30 | Εφαρμογή με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής, από<br>το στάδιο<br>έκπτυξης του 1 <sup>ου</sup><br>πραγματικού<br>φύλλου έως την<br>πλήρη άνθηση<br>(έχει ανοίξει το<br>50% των ανθέων)<br>(την Άνοιξη, από<br>Μάρτιο έως<br>Οκτώβριο<br>BBCH 11-65 | 1 εφαρμογή |

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
4. Η εφαρμογή με εμβάπτιση/διαβροχή των δίσκων μηχανικά, με στάγδην άρδευση, πριν την μεταφύτευση να γίνεται 1 μέρα (μέγιστο) πριν την καθορισμένη ημερομηνία μεταφύτευσης. Η δόση η οποία θα εφαρμοστεί να μην ξεπερνά τα 2 mg σκευάσματος/φυτό.

\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του θρίπα στον καπνό (εφαρμογή με ψεκασμό), κατά του λύγκου στο βαμβάκι και κατά της αφίδας *Aphis fabae* στα φασόλι με λοβό και στα όσπρια φασόλι και μπιζέλι. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

\*\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καπνού (εφαρμογή με ριζοπότισμα), αρακά με λοβό, φακής και λούπινου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση  
στην αγορά όταν πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργεια<br>(Κωδικός προϊόντος με βάση<br>το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)                 | Ημέρες |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Εσπεριδοειδή                                                                                        | 60     |
| Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές, Nashi                                                                   | 21     |
| Ροδακινιές, Δαμασκηνιές, Κερασιές, Αρακάς<br>(με λοβό)                                              | 14     |
| Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια<br>θερμοκηπίου, Τομάτες, Μελιτζάνες<br>(υπαίθρου και θερμοκηπίου) | 1      |
| Καπνός                                                                                              | 7      |
| Σιτάρι                                                                                              | 28     |
| Βαμβάκι                                                                                             | 75     |

|                                                                                                                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Μαρούλι (0251020), Σκαρόλες (πικρίδα)/<br>Πλατύφυλλα Αντίδια (0251030), Ρόκα<br>(0251060), Λυκοτρίβολο (0251010),<br>Γαιοκάρδαμο (0251050), Κόκκινο σινάπι<br>(0251070) | 49                                        |
| Μπιζέλια με λοβό (0260030), Φασόλια με<br>λοβό (0260010)                                                                                                                | 14                                        |
| Μπιζέλια (όσπρια) (0300030), Φασόλια<br>(όσπρια) (0300010), <b>Φακή (όσπριο)</b><br><b>(0300020), Λούπινο (όσπριο) (0300040)</b>                                        | Καθορίζεται<br>από τον χρόνο<br>εφαρμογής |

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

## III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5078/59875/29.05.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

**ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**