



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.06.2025
Αριθ. πρωτ.: 156220

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
e-mail: leda.zacharopoulou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14496 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PREMIUS with zeon technology 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3743/95967/20.05.2024 απόφασή μας, με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 14496 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PREMIUS with zeon technology 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 104192/17.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Διευρύνουμε την αριθμ. 14496 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PREMIUS with zeon technology 10 CS (lambda-cyhalothrin 10% β/ο), που ανανεώθηκε με την αριθμ. 3743/95967/20.05.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 7, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά MABSD	Φυλλορύκτης <i>Phyllonorycter</i> sp. 1PRYCG <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	10	--	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1
Αχλαδιά PYUCO	Φυλλορύκτης <i>Phyllonorycter</i> sp. 1PRYCG Ψύλλα <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPI <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	10	--	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-87).	1
Ροδακινιά PRNPS	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	10	--	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO Κοχυλίδα <i>Eupoecilia ambiguella</i> CLYSAM <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	10	10-25	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των βλαστοφόρων οφθαλμών έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89).	1
Ελιά OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	10	--	50-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών και την εκκόλαψη των ωών από το στάδιο όπου τα εξωτερικά μικρά φύλλα ανοίγουν και διασταυρώνονται κοντά στην κορυφή τους έως ότου ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους (ξεκινάει η σκλήρυνση του πυρήνα) (BBCH 09-75)	1
	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	3,75	125	3 (Εφαρμογή 300 κ.εκ. ψεκαστικού υγρού/ δέντρο. Μέγιστος αριθμός ψεκασμένων δέντρων ανά στρέμμα: 10)	Δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος σε συνδυασμό με ENTOMELA 50 SL ή ENTOMELA 75 SL ή DACUS BAIT 100 στις εγκεκριμένες δόσεις, σύμφωνα με τις συλλήψεις ακμαίων στις δακοπαγίδες. Να εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια κάθε 2 ^{ου} δέντρου του	2/14

					ελαιώνα	
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Πτεριά (Υ+Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	10	10-20 (Υπαίθρου) 6,6-20 (Θερμοκηπ ίου)	50-100 (Υπαίθρου) 50-150 (Θερμοκηπίο υ)	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89).	1
Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSC Κολοκύθι (Υ+Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP	10	10-20 (Υπαίθρου) 6,6-20 (Θερμοκηπ ίου)	50-100 (Υπαίθρου) 50-150 (Θερμοκηπίο υ)	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή (BBCH 09-89).	1
Λάχανο BRSOX Μπρόκολο BRBOK	Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	7,5-10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή (BBCH 09-49).	1
Φακή LENCU	Βρούχος <i>Bruchus</i> sp. BRCHSP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera</i>	10	10	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή	1

	<i>frugiperda</i> LAPHFR				(BBCH 09-89).	
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE <u>Χρήση ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> LAPHFR	10	--	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την συγκομιδή (BBCH 09-49).	1
Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i> HELIAR Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora</i> <i>gossypiella</i> PECTGO	15	--	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδιών (BBCH 60-81).	1
	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus</i> sp. MYZUSP <u>Χρήση ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Σποντόπτερα* <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> LAPHFR	15	--	50-80	Ψεκασμός φυλλώματος όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος από το στάδιο της εμφάνισης του 1 ^{ου} πρώτου αληθινού φύλλου έως την έναρξη ανοίγματος των καρυδιών (BBCH 11-81).	
Καστανιά*** CSNSA <i>Χρήση ήσσονος</i> <i>σημασίας</i>	Καρπόκαψα <i>Cydia</i> sp. CYDISP Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> LAPHFR	10	--	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1

Αμυγδαλιά*** PRNDU Φυστικιά*** ΡΙΑΒΕ Καρυδιά*** IUGNI, IUGRE Χρήσεις ήσσονος σημασίας	Καρπόκαψα <i>Cydia</i> sp. CYDISP Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> LAPHFR Ευρύτομο <i>Eurytoma</i> <i>amygdali</i> EURTAM <i>Eurytoma</i> <i>plotnikovi</i> EURTPL Ψύλλα της φιστικιάς <i>Agonosceua</i> sp. AGONSP Καφέ Βρωμούσα <i>Halyomorpha</i> <i>halys</i> HALYHA Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	10	--	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1
Κερασιά** PRNAV	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Θρίπας* <i>Thrips</i> sp. THRISP Ανάρσια*	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1

	<i>Anarsia lineatella</i> ANARLI Καρπόκαψα* <i>Cydia</i> sp. CYDISP Λιριόμιζα* <i>Liriomyza trifolii</i> LIRITR Φυλλορύκτης* <i>Phyllonorycter</i> sp. 1PRYCG Σποντόπτερα* <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> LAPHFR Καφέ Βρωμούσα* <i>Halyomorpha</i> <i>halys</i> HALYHA Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU					
Δαμασκηνιά** PRNDO	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ραγολέτιδα* <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE Θρίπας* <i>Thrips</i> sp. THRISP Ανάρσια* <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των πρώτων φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 19-89).	1

	Καρπόκαψα* <i>Cydia</i> sp. CYDISP Λιριόμιζα* <i>Liriomyza trifolii</i> LIRITR Φυλλορύκτης* <i>Phyllonorycter</i> sp. 1PRYCG Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR Καφέ Βρωμούσα* <i>Halyomorpha halys</i> HALYHA Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU					
Λεμονιά*** CIDLI Γκρέιπφρουτ*** CIDPA <i>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</i>	Κοκκοειδή <i>Coccus hesperidum</i> COCCHE Πράσινη Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI Προνύμφες λεπιδοπτέρων Μετκάλφα <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Καφέ Βρωμούσα <i>Halyomorpha halys</i> HALYHA	10	--	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο εμφάνισης των πράσινων κορυφών των φύλλων έως και τη συγκομιδή (BBCH 09-89).	1

	Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Φυλλορύκτης <i>Phyllonorycter</i> sp. 1PRYCG Σποντόπτερα <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR					
Μύρτιλλο** VACAN, VACCO VACVG	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κοχυλίδα* <i>Eupoecilia ambiguella</i> CLYSAM Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR Καφέ Βρωμούσα* <i>Halymorpha halys</i> HALYHA	10	10-25	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 09-89).	1
Κολοκύθα (Υ)** CUUMA	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Προνύμφες λεπιδοπτέρων Πράσινο σκουλήκι* <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα*	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυληδόνων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89).	1

	<i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Δορυφόρος της πατάτας* <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE Αλευρώδης* <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA					
Μπάμια (Υ)*** ABMES	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Δορυφόρος της πατάτας <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	10	10-20	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδόνων έως τη συγκομιδή (BBCH 09-89).	1
Κουνουπίδι** BRSOB	Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Υπονομευτής των σταυρανθών* <i>Dichrorampha petiverella</i> LASPDO Σποντόπτερα* <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	10	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της έκπτυξης των κοτυλιδόνων έως και τη συγκομιδή. (BBCH 09-89)	1

Κοφτοσκούληκα* <i>Agrotis</i> sp. AGROSP				
Μυζητικά ημίπτερα Ετερόπτερα* 1HETER				
Αλευρώδης* <i>Aleyrodes</i> <i>proletella</i> ALEUPR				
Αφίδες* <i>Aphis</i> sp. 1APHIG				
Δορυφόρος της πατάτας* <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE				
Θρίπας* <i>Thrips</i> sp. THRISP				

Παρατηρήσεις:

1. Να ρυθμίσετε τη δόση στο εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει την μέγιστη δόση σκευάσματος ανά στρέμμα.
2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά:

- του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς, της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, του αμπελιού, της ελιάς, του λάχανου, του μπρόκολου, της φακής, της πατάτας και του βαμβακιού,
- του θρίπα, της ανάρσιας, της καρπόκαψας, της λιριόμιζας, του φυλλορύκτη, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμούσας και της δροσόφιλας στην καλλιέργεια της κερασιάς
- της ραγολέτιδας, του θρίπα, της ανάρσιας, της καρπόκαψας, της λιριόμιζας, του φυλλορύκτη, της σποντόπτερας, της καφέ βρωμούσας και της δροσόφιλας στην καλλιέργεια της δαμασκηνιάς
- της κοχυλίδας, της σποντόπτερας και της καφέ βρωμούσας στην καλλιέργεια του μύρτιλλου
- του πράσινο σκουληκιού, της σποντόπτερας, του δορυφόρου της πατάτας και του αλευρώδη στην καλλιέργεια της κολοκύθας
- του υπονομευτή των σταυρανθών, της σποντόπτερας, των κοφτοσκούληκων, των ετερόπτερων, του αλευρώδη, των αφίδων, του δορυφόρου της πατάτας και του θρίπα στην καλλιέργεια του κουνουπιδιού.

Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**«Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιάς, δαμασκηνιάς, μύρτιλλου, κολοκύθας και κουνουπιδιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καστανιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, λεμονιάς, γκρέιπφρουτ και μπάμιας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την

αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και
- σποράς ή φύτευσης της
προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη ζώνη πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Η επανείσοδος στον αμπελώνα **και την καλλιέργεια του μύρτιλλου** επιτρέπεται μόνο αφού περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος φορώντας γάντια.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Υπαίθριες καλλιέργειες:

- Κατά την εφαρμογή με τρακτέρ φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- Κατά την χρήση ψεκαστικού μηχανήματος με εκτόξευση υποβοηθούμενη από ρεύμα αέρος (τουρμπίνα), πρέπει να χρησιμοποιείται τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
- Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή κατά την εφαρμογή με τρακτέρ με φερόμενα ή συρόμενα μέσα να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων.
- Κατά την χρήση με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) σε χαμηλού ύψους καλλιέργειες στον αγρό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.
- Κατά την χρήση με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) σε ψηλές καλλιέργειες φοράτε γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2) κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2), αδιάβροχη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για το κεφάλι/ μάτια και πρόσωπο κατά την εφαρμογή.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώτιου ψεκαστήρα στον αγρό.
- Σε περίπτωση επανεισόδου στη καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.
- Κατά τον δολωματικό ψεκασμό στην καλλιέργεια της ελιάς με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός):
 - φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή (τύπου FP2) κατά την

ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή.

- όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 50% για την προστασία των κατοίκων.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση επινώτιων ψεκαστήρων.

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες:

- Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες χαμηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχο παντελόνι, σακάκι από βαμβάκι/πολυέστερα και γάντια
- Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες υψηλής ανάπτυξης με ψεκαστικά μέσα χειρός (αυλός) φοράτε αδιάβροχη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση επανεισόδου στο θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:

- Σε μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, καστανιά, **αμυγδαλιά, φυσιτικά, καρυδιά, κερασιά, δαμασκηλιά, λεμονιά, γκρέιπφρουτ:** Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι ζώνη φυτικής ανάσχεσης και με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.
- Στο αμπέλι **και το μύρτιλλο** – πρώιμη εφαρμογή: Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.
- Στο αμπέλι **και το μύρτιλλο** – όψιμη εφαρμογή: Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% .
- Στην ελιά: Να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.
- Στο βαμβάκι: Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%.
- Σε λοιπές υπαίθριες καλλιέργειες (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λάχανο, μπρόκολο, **κολοκύθα, μπάμια, κουνουπίδι**): Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφήσετε μία ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.
- Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι) που γειτνιάζουν με υδάτινες επιφάνειες: Να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα ζώνη φυτικής ανάσχεσης ή να αφήσετε μια ζώνη φυτικής ανάσχεσης

20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 50%.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους:

- Σε δενδρώδεις καλλιέργειες: Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.
- Στο αμπέλι **και το μύρτιλλο**: Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 60% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς κατά 90%.
- Στο βαμβάκι: Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 70%.
- Σε λοιπές καλλιέργειες υπαίθρου (πατάτα, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, φακή, λάχανο, μπρόκολο, **κολοκύθα, μπάμια, κουνουπίδι**): Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 30%.
- Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι) με ύψος <50 εκ.: Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.
- Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι) με ύψος >50 εκ.: Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ζιζάνια σε ανθοφορία (απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους). Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Πολύ τοξικό σε βομβίνους και ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Ροδακινιά (0140030)-Νεκταρινιά (0140030- 002), Πατάτα (0211000), Ελιά επιτραπέζια (0161030), Ελιά ελαιοποιήσιμη (0402010) Λάχανο (0242020), Μπρόκολο (0241010) Καστανιά (0120040), Αμυγδαλιά (0120010) Καρυδιά (0120110), Φιστικιά (0120100) Λεμονιά (0110030), Γκρέιπφρουτ (0110010) Κερασιά (0140020), Δαμασκηνιά (0140040) Κουνουπίδι (0241020)	7

Τομάτα (0231010) (Υ+Θ) Μελιτζάνα (0231030) (Υ+Θ) Πιπεριά (0231020) (Υ+Θ) Αγγούρι (0232010) (Υ+Θ) Κολοκύθι (0232030) (Υ+Θ), Μπάμια (Υ) (0231040), Κολοκύθα (Υ) (0233020)	3
Βαμβάκι (0401090), Φακή (0300020), Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010), Αμπέλι οινοποιήσιμο (0151020), Μύρτιλλο (0154010)	14

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3743/95967/20.05.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ