



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.06.2025
Αριθ. πρωτ: 174980

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Αγησιλάου 6-8,
Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 60697 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (δ.ο. fluopyram + trifloxystrobin), ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 & 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αριθμ. 91751/ 04.04.2025 απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 60697 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (δ.ο. fluoptygram + trifloxystrobin).
9. Την από τον Ιούλιο του 2024 έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου-ΜΦΙ (ΕΜΠ 453) για την επέκταση του φάσματος δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος LUNA SENSATION SC καθώς και τα από τον Ιούνιο του 2025 αναθεωρημένα τμήματα αξιολόγησης του προϊόντος.
10. Την αριθμ. 4456/117979/29.04.2021 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 53231/25.02.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε** την αριθμ. **60697** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **LUNA SENSATION SC** (δ.ο. fluoptygram + trifloxystrobin), που ανανεώθηκε με την αριθμ. 91751/ 04.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το **φάσμα δράσης** του σκευάσματος, τις **ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές** υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις **δηλώσεις προφύλαξης** καθώς επίσης και την **τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή**.

Συγκεκριμένα τα σημεία **5, 6, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5. Φάσμα δράσης:							
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος				Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λτ. ψεκ. υγρού	κ.εκ./ 10.000 τμ φυλλικής επιφάνειας (LWA)*	κ.εκ./στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού (λτ./στρ.)		
Μαρούλι (Θ) (LACSA)	Βοτρυτίης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC) <i>S. minor</i> (SCLEMI) Ριζοκτόνια <i>Rhizoctonia solani</i> (RHIZSO) Κερκοσπορίωση (<i>Cercospora beticola</i>) (CERCBE)	---		80	30-80	Εφαρμογή από την εμφάνιση του 3ου φύλλου μέχρι το μαρούλι να φτάσει το 50% του τυπικού μεγέθους του (BBCH 13-45).	1

Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC) <i>S. minor</i> (SCLEMI)	---		80	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο που το φυτό έχει φτάσει το 50% του τελικού ύψους του μέχρι το 20% της άνθησης (BBCH 35-62).	1
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> / <i>Podosphaera macularis</i> (SPHRMA) Ανθράκωση <i>Colletotrichum fragariae</i> (COLLFR) Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σεπτορίωση <i>Mycosphaerella fragariae</i> (MYCOFR)	---		80	30-80	Εφαρμογή από την έναρξη ανάπτυξης των νεαρών φυτών (σχηματισμός των στολώνων) μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 40-89).	(Θ): 2 / 7
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες) (VITVI)	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> / <i>Erysiphe necator</i> (UNCINE)	(10-67)		20	50-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5ου φύλλου έως το μέγεθος σκαγιού (BBCH 15-73).	2 / 21
	Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i> (GUIGBI)	(13-67)		20			2 / 14
Φασόλια με λοβό (Υ) (PHSVX)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC)	---		80	30-80	Εφαρμογές από την πλήρη ανάπτυξη/ εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι οι λοβοί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους τους (BBCH 61-75).	1
Τομάτα (Θ+Τ) (LYPES) Πιπεριά (Θ+Τ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Θ+Τ) (SOLME)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	40		30	75	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας</u> <u>100 εκ.</u>	2/10-14
	Ωίδιο	—	160*	—	50-150	Εφαρμογές από	2/10

	<i>Leveillula taurica</i> (LEVETA), <i>Oidium lycopersici</i> (OIDILY)					την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	
Αγγούρι, Αγγουράκι (Θ+Τ) (CUMSA) Κολοκύθι (Θ+Τ) (CUUPG) Πεπόνι (Θ+Τ) (CUMME) Καρπούζι (Θ+Τ) (CITLA)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) <i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i> (DIDYBR)	---	300*	—	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	2/10
	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI), <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	---	160*	—	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.	1
Ροδακινιά ¹ (PRNPS), Βερικοκιά (PRNAR)	Μονίλια <i>Monilinia laxa</i> (MONILA) <i>Monilinia fructigena</i> (MONIFG) <i>Monilinia fructicola</i> (MONIFC)	---		50	25-150	Εφαρμογές από το στάδιο των κλειστών ανθέων (κλειστά μπουμπούκια) έως την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 55-87)	1
	Ωίδιο <i>Podosphaera pannosa</i> (SPHRPA)	---		30	25-150	Εφαρμογές από το στάδιο των κλειστών ανθέων (κλειστά μπουμπούκια) έως την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 55-87)	2/7
Αγγούρι (Υ) (CUMSA) Αγγουράκι (Υ)	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i> (DIDYBR)	---	---	60	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι	2/10

(CUMSA)) Κολοκύθι (Υ) (CUUPG)						την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 100 εκ</u>	
	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> (ERYSCI), <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)	---	---	40	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89). <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 100 εκ</u>	1
Τομάτα (Υ) (LYPES)	Αλτενάρια <i>Alternaria solani</i> (ALTESO) Ωίδιο <i>Levillula taurica</i> (LEVETA) / <i>Oidium neolycopersici</i> (OIDINL)			60	20-80	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89).	2/10
Καρότο (Υ) (DAUCS)	Αλτενάρια <i>Alternaria dauci</i> (ALTEDA) Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> (ERYSE)	-		50	20-80	Εφαρμογές από την έναρξη ανάπτυξης των ριζών (διάμετρος > 0.5 εκ) έως ότου φθάσουν στο τυπικό τους μέγεθος και μορφή (BBCH 41-49)	2/14
Μπρόκολο ² (Υ) (BRSOK) Κουνουπίδι (Υ) (BR SOB) Λάχανο ³ (Υ)	Αλτενάρια <i>Alternaria brassicae</i> (ALTEBA) / <i>Alternaria brassicicola</i> (ALTEBI) Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella brassicicola</i> (MYCOBR)			50	20-80	Εφαρμογές από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής μέχρι να φτάσει στο τυπικό της μέγεθος (BBCH 41-49)	2/14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:*** Δόση LWA:**

Σε γραμμικά συστήματα φύτευσης/ καλλιέργειας κάθετης ανάπτυξης, για την εφαρμογή της βέλτιστης δόσης σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, να γίνεται υπολογισμός της δόσης ανά στρέμμα λαμβάνοντας

υπόψη τις διαστάσεις της καλλιέργειας (ύψος βλάστησης και απόσταση μεταξύ των γραμμών) και της δόσης LWA ως εξής:

Τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα= $(LWA/100.000) \times \text{δόση LWA}$,

όπου $LWA = 2 \times (\text{ύψος βλάστησης (μέτρα)} \times 10.000 / \text{απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)})$

• Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά στρέμμα για τις καλλιέργειες Κολοκυνθοειδών θερμοκηπίου (Αγγούρι, Κολοκύθι), ΣΤΟΧΟΣ: Βοτρύτης, *Stagonosporopsis cucurbitacearum*:

Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σημείο έκπτυξης της βλάστησης ή καρποφορίας μέχρι την κορυφή της βλάστησης.

Η δόση LWA είναι σταθερή (300 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 60 κ.εκ. ανά στρέμμα.

		Ύψος βλάστησης (μέτρα)							
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2
	0.75	20	40	60	60	60	60	60	60
	1	15	30	45	60	60	60	60	60
	1.25	12	24	36	48	60	60	60	60
	1.5	10	20	30	40	50	60	60	60
	2	8	15	23	30	38	45	53	60

• Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά στρέμμα για τις καλλιέργειες Σολανωδών θερμοκηπίου (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά), Κολοκυνθοειδών θερμοκηπίου (Αγγούρι, Κολοκύθι), ΣΤΟΧΟΣ: Ωίδιο:

Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σημείο έκπτυξης της βλάστησης ή καρποφορίας μέχρι την κορυφή της βλάστησης.

Η δόση LWA είναι σταθερή (160 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 40 κ.εκ. ανά στρέμμα.

		Ύψος βλάστησης (μέτρα)							
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2
	0.75	11	21	32	40	40	40	40	40
	1	8	16	24	32	40	40	40	40
	1.25	6	13	19	26	32	38	40	40
	1.5	5	11	16	21	27	32	37	40
	2	4	8	12	16	20	24	28	32

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η χρήση στο μπρόκολο περιλαμβάνει τη χρήση στο Κινέζικο μπρόκολο (BRSAG)
3. Η χρήση στο Λάχανο περιλαμβάνει τη χρήση στο Λευκό Λάχανο (BRSOL), το Κόκκινο Λάχανο (BRSOR), το Λάχανο σαβόι(BRSOS) και το κωνικό λάχανο(BRSON).
4. Θ (Χρήση Θερμοκήπιου), Υ (Χρήση Υπαίθρου), Τ (Χρήση σε ανοικτές κατασκευές τύπου Τούνελ)

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Η χρήση στη φράουλα θερμοκηπίου δεν περιλαμβάνει προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.
2. Η χρήση του σκευάσματος **στις καλλιέργειες μαρούλι και φράουλα** σε θερμοκήπια υδροπονίας επιτρέπεται μόνο αν διαθέτουν σύστημα ανακύκλωσης του νερού.
3. Αποφύγετε εφαρμογή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία *trifloxystrobin*, η οποία ανήκει στην ομάδα 11 (Quinone outside Inhibitors- QoIs) κατά FRAC και τη δραστική ουσία *fluopyram*, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 (Succinate dehydrogenase inhibitors- SDHIs) κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται :

- το σκεύασμα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες δράσης με μη διασταυρούμενη ανθεκτικότητα.
- το σκεύασμα να χρησιμοποιείται προληπτικά ή στην αρχή της προσβολής. Κάτω από υψηλή προσβολή το μεσοδιάστημα των επεμβάσεων να μην ξεπερνά τις 7-10 ημέρες.
- να μην πραγματοποιούνται περισσότερες από 4 εφαρμογές με μυκητοκτόνα της ομάδας QoIs ή SDHIs σε καλλιέργειες που εκτελούνται 12 ή περισσότερες εφαρμογές.
- να πραγματοποιούνται το μέγιστο 2 συνεχόμενες εφαρμογές με μυκητοκτόνα της ομάδας QoIs και SDHIs.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με πυκνό φύλλωμα φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προσωπίδα κατά την ανάμιξη /φόρτωση και επιπλέον αδιάβροχο σακάκι και παντελόνι κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

«Για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων να αφήνεται αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων στην καλλιέργεια αμπέλου».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

➤ **ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ :**

- Τομάτα, Πιπεριά και Μελιτζάνα και τη δόση των 30 κ.εκ./ στρ. μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
- Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα για τη δόση των 160 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι και Καρπούζι μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Φράουλα μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων.
- Μαρούλι μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

➤ **ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΝΕΛ:**

- για τις καλλιέργειες Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα για τη δόση των 160 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- για τις καλλιέργειες Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι για εφαρμογές με δόση 60 κ.εκ./ στρ., μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

➤ **ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:**

- Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι για εφαρμογές με δόση 60 κ.εκ./ στρ., μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι για τις εφαρμογές με δόση 40 κ.εκ./ στρ. μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Τομάτα μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
- Μπρόκολο, Κουνουπίδι και Κεφαλωτές κράμβες μία ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Καρότο, μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων.
- Αμπέλι μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Φασόλι με λοβό και Καπνός μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- **Ροδακινιά (συμπεριλαμβανομένης της Νεκταρινιάς) και Βερικοκιά:**
 - α) για μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. / στρέμμα και για πρώιμες εφαρμογές μία αψέκαστη ζώνη προστασίας

20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

- β) για μία εφαρμογή με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. / στρέμμα και για όψιμες εφαρμογές μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%
- γ) για δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 30 κ.εκ. /στρέμμα και για πρώιμες εφαρμογές, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή 30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
- δ) για δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 30 κ.εκ. /στρέμμα και για όψιμες εφαρμογές, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 25% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία, κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη και κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων (ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία).

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες) 0151000, Φασόλια με λοβό (Υ) (0260030) Καρότο (Υ) (0213020), Μπρόκολο (και Κινέζικο μπρόκολο) (Υ) (0241010), Κουνουπίδι (Υ) (0241020) Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Σαβόι και Κωνικό λάχανο) (Υ) (0242020)	14
Μαρούλι (Θ) (0251020), Ροδακινιά (και Νεκταρινιά) (0140030), Βερικοκιά (0140010),	7

Φράουλα (Θ) (0152000), Πιπεριά (Θ+Τ) (0231020), Τομάτα (Θ + Τ+Υ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ+Τ) (0231030), Αγγούρι (Υ+Θ+Τ) (0232010) Αγγουράκι (Υ + Θ+Τ) (0232020), Κολοκύθι (Υ+Θ+Τ) (0232030), Πεπόνι (Θ+Τ) (023010), Καρπούζι (Θ+Τ) (0233030).	3
Καπνός	Όπως ορίζεται από το στάδιο της καλλιέργειας κατά τον χρόνο εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρθμ. 91751/ 04.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ