



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.06.2025
Αριθ. πρωτ: 165525

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON SPA, Ιταλίας
(δια μέσω του υπευθύνου επικοινωνίας
της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,
19400, Κορωπί)
E-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 61166 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CORTINA (δ.ο. prothioconazole 40 % β/ο), ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος, τη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45),
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
3. Την αριθμ. 5156/129519/11.06.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61166 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CORTINA (δ.ο. prothioconazole 40 % β/ο).
4. Την από 4/2025 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 411/16.04.2025).
5. Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
6. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
7. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).

8. Τις αριθ. πρωτ. 10884/304215/08.20.2024 και 117450/07.05.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **61166** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **CORTINA (δ.ο. prothioconazole 40 % β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 5156/129519/11.06.2024, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος, τη τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5, 11, 13** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθμός εφαρμογών/ Καλλιεργ. περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./σπρ	κ.εκ / 100 λίτρα νερό	Όγκο ψεκ. Υγρού σε λίτρα/σπρ.		
Χειμερινό Σιτάρι μαλακό (TRZAW) Σιτάρι σκληρό (TRZDW) Σίκαλη (SECCW)	Σεπτορίωση (<i>Septoria sp.</i>) (SEPTSP) Φουζαρίωση (<i>Fusarium sp.</i>) (FUSASP) Σκωρίαση (<i>Puccinia sp.</i>) (PUCCSP)	40-50	--	20-60	Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 29-69).	1
Ανοιξιιάτικο Σιτάρι μαλακό (TRZAS) Σιτάρι σκληρό (TRZDS) Σίκαλη (SECCS)	Σεπτορίωση (<i>Septoria sp.</i>) (SEPTSP) Φουζαρίωση (<i>Fusarium sp.</i>) (FUSASP) Σκωρίαση (<i>Puccinia sp.</i>) (PUCCSP)	40-50	--	20-60	Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 29-69).	1
Χειμερινό Κριθάρι (HORVW) Ανοιξιιάτικο Κριθάρι (HORVS)	Ελμινθοσπορίωση/ Δικτυωτή κηλίδωση (<i>Pyrenophora teres</i>) (PYRNTE), Σκωρίαση (<i>Puccinia hordei</i>) (PUCCHD)	40-50	--	20-60	Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 29-61).	1
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) (SCLESC)	35-45	--	20-60	Από την έναρξη επιμήκυνσης των βλαστών μέχρι το 10% των λοβών να έχουν φτάσει στο τελικό τους	1

					μέγεθος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 30- 71).	
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	Κερκόσπορα (<i>Cercospora beticola</i>) (CERCBE)	30-40	--	20-60	Όταν το φύλλωμα καλύπτει το 90% του εδάφους μέχρι το ρίζωμα να φθάσει στο μέγεθος συγκομιδής με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής (BBCH 39-49).	2/14
Φρέσκα Μπιζέλια χωρίς λοβό (PIBSX) Φρέσκα Φασόλια χωρίς λοβό (PHSVX)	Ασκοχύτωση (<i>Ascochyta sp.</i>) Σκωρίαση (<i>Uromyces ssp.</i>) (UROMSP)	30-40	--	20-60	Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 51-69).	1
Αμυγδαλιά (PRNDU)	Πολυστίγμωση (<i>Polystigma fulvum</i>) (POLTFU)	40	--	50-150	Από την έναρξη ανάπτυξης ανθοφόρων οφθαλμών έως και την αρχή σχισίματος του περικαρπίου, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 51-85)	1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η χρήση στο Χειμερινό και Ανοιξιότικο Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) (TRZAW, TRZDW, TRZAS, TRZDS) περιλαμβάνει και το Χειμερινό και Ανοιξιότικο Τριτικάλε (TTLWI, TTLSO). 2. Η χρήση στα Φρέσκα Μπιζέλια χωρίς λοβό (PIBSX) περιλαμβάνει και τα Φρέσκα Ρεβίθια χωρίς λοβό (CIEAR).						
Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.						
Αγγούρι (Υ) (CUMSA) Αγγουράκι για τουρσί (Υ) (CUMSG) Κολοκύθι (Υ) (CUUPE)	Ωίδιο (<i>Oidium spp.</i>) (OIDISP)	20-30	--	20-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έναρξη ανάπτυξης των καρπών (BBCH 11-70)	1
Αγγούρι(Θ) (CUMSA) Αγγουράκι για τουρσί (Θ) (CUMSG) Κολοκύθι (Θ) (CUUPE)	Ωίδιο (<i>Oidium spp.</i>) (OIDISP)	20-30	--	20-60	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 11-89).	1
Πεπόνι (Υ) Καρπούζι (Υ)	Ωίδιο (<i>Oidium spp.</i>)	20-30	--	20-60	Με την εμφάνιση των πρώτων	1

(CITLA) Κολοκύθα (Υ) (CUUPM)	(OIDISP)				συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έναρξη ανάπτυξης των καρπών (BBCH 11-70)	
Μουσμουλιά (MSPGE) Κυδωνιά (CYDOB)	Φουζικλάδιο <i>Venturia</i> spp. (VENTSP) Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) (PODOLE)	25-30	--	50-150	Όταν οι αναπτυσσόμενοι βλαστοί έχουν το 90% του τελικού τους μήκος έως τη συγκομιδή των καρπών, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 39-85).	1
Βερικοκιά (PRNAR) Δαμασκηλιά (PRNDO) Κερασιά (PRNAV)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> (SPHRPA) Φαϊά Σήψη <i>Monilia laxa</i> (MONILA)	30-40	--	50-150	Από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως το στάδιο του πλήρους χρωματισμού των καρπών, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 51-85)	1
Ρύζι (ORYSA)	Πυρικουλάρια (<i>Pyricularia oryzae</i>) (PYRIOR) Ελμινθοσπορίωση (<i>Cochliobolus miyabeanus</i>) (COCHMI)	40-50	--	20-40	Μία εφαρμογή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ σταδίων έκπτυξης του φύλλου-σημαία και της έναρξης της άνθησης (BBCH 39-61).	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Στο σημείο 5, στις παρατηρήσεις:
-Η χρήση στη Κερασιά περιλαμβάνει (PRNAV) και τη Βυσσινιά (PRNCE).
- Στο σημείο 11: Δηλώσεις προφύλαξης:
-Spre3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε αμμώδη εδάφη στη καλλιέργεια του ρυζιού.
-Spre3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα ως εξής:
 - Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, **Βυσσινιά: 10 μέτρα**
 - Αγγούρι (Υ+Θ), Αγγουράκι για τουρσί(Υ+Θ), Κολοκύθι, (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ): 20 μέτρα**
- Στο σημείο 13: Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:
Μουσμουλιά (0130040), Κυδωνιά (0130030): 14 ημέρες,
Αγγούρι (0232010) (Υ+Θ):, Αγγουράκι για τουρσί (Υ+Θ): (0232020), Κολοκύθι (Υ+Θ): (0232030): 10 ημέρες,
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα(Υ): 3 ημέρες
Βερικοκιά (0140010), Κερασιά και Βυσσινιά (0140020), Δαμασκηλιά (0140040): 3 ημέρες,
Ρύζι (0500060): Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογή
- Στο σημείο 17:** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών
- **Επιβεβαιωτικά πειράματα για τους μεταβολίτες TDMs, όπως αναφέρονται στο part A για την καλλιέργεια του ρυζιού.**

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

*Φοράτε κατάλληλη, ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.*

Για την προστασία των περιοίκων και των κατοίκων να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη ασφαλείας προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50 %.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα ως εξής:

- Αμυγδαλιά, ελαιοκράμβη: 10 μέτρα
- Σιτάρι, **τριτικάλε**, σίκαλη, κριθάρι, ζαχαρότευτλα, **φρέσκα μπιζέλια χωρίς λοβό, φρέσκα φασόλια χωρίς λοβό, φρέσκο ρεβίθι χωρίς λοβό**: 20 μέτρα.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Καλλιέργειες	Ημέρες
Ελαιοκράμβη (0401060)	50
Σιτάρι (μαλακό, σκληρό) και Τριτικάλε (0500090) Σίκαλη (0500070) Κριθάρι (0500010)	35
Ζαχαρότευτλα (0900010)	28
Φρέσκα Μπιζέλια χωρίς λοβό, Φρέσκο Ρεβίθι χωρίς λοβό (0260040) Φρέσκα Φασόλια χωρίς λοβό (0260020)	14
Αμυγδαλιά (0120010)	3

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα :

- Επιβεβαιωτικά πειράματα για τους μεταβολίτες TDMs, **όπως αναφέρονται στο part A για τις καλλιέργειες σιτηρών, ζαχαρότευτλων.**

II. Ετικέτα σκεύασματος

– Η ετικέτα του σκεύασματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5156/129519/11.06.2024 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ