



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,  
Αρ. πρωτ.

01.07.2025  
178527

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Μ. Παπαλέξη  
Τηλέφωνο: 210 9287247  
e-mail: [mpapalexi@minagric.gr](mailto:mpapalexi@minagric.gr)

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι  
email: [dimitris.logothetis@bayer.com](mailto:dimitris.logothetis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 7928 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP GOLD (δ. ο. glyphosate 36% β/ο) ως προς τη διεύθυνση του παρασκευαστή του σκευάσματος και ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών του σκευάσματος στην Κύπερη - *Cyperus spp.* (φάσμα δράσης- σημείο 5)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 11525/326868/15.12.2023 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία ανανεώθηκε η με αριθμ. 7928 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP GOLD (δ. ο. glyphosate 36% β/ο).

7. Την αριθμ. 9993/275803/16.09.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. **7928** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP GOLD (δ. ο. glyphosate 36% β/ο)**, η οποία ανανεώθηκε με την αριθμ. 11525/326868/15.12.2023 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τη διεύθυνση του παρασκευαστή του σκευάσματος και ως προς τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών του σκευάσματος στην Κύπερη *Cyperus spp.*- (φάσμα δράσης- σημείο 5) .

Τα σημεία **1.4γ και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer S.A.S.  
**74 rue Gorge de Loup,**  
CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                         | Στόχος                                                                                                                                                                                                                    | Δόσεις σκευάσματος                                     |                                                    | Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής                                                                                                                    | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | κ.εκ./ στρέμμα                                         | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.                        |                                                                                                                                                |                                                                        |
| Πορτοκαλιά<br>CIDSΙ<br>Μανταρινιά CIDRE<br>Λεμονιά<br>CIDLI<br>Γκρέιπφρουτ<br>CIDPA<br><br>Αμυγδαλιά<br>PRNDU<br><br>Μηλιά<br>MABSD<br>Αχλαδιά<br>PYUCO | Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)<br>Μολόχα<br><i>Malva</i> sp.<br>MALSS<br>Αντράκλα<br><i>Portulaca oleracea</i><br>POROL<br>Πολυκόμπι<br><i>Polygonum</i> spp.<br>POLSS<br>Τσουκνίδα<br><i>Urtica</i> sp. URTSS | 150-200<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>400-600 | 20-40<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>20-40 | Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.                    | 1-3/28                                                                 |
| Βερυκοκιά<br>PRNPN<br>Ροδακινιά<br>PRNPS<br>Κερασιά<br>PRNAV<br><br>Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)                             | Πολυετή ζιζάνια (αγρωστώδη και πλατύφυλλα)<br><br><br><br><br>Αγριάδα<br><i>Cynodon dactylon</i><br>CYNDA<br><br>Βέλιουρας<br><i>Sorghum halepense</i><br>SORHA                                                           | 500-800<br><br><br><br><br>800<br><br><br>500          | 20-40<br><br><br><br><br>20-40<br><br><br>20-40    | Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. |                                                                        |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ελιά<br>OLVEU<br>(επιτραπέζιες και<br>ελαιοποιήσιμες<br>ποικιλίες)                                     | Φτέρη<br><i>Pteridium<br/>aquilinum</i><br>PTEAQ                                                                                                                                    | 500                                                              | 20-40 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                                                                                                        | Κύπερη<br><i>Cyperus</i> spp.<br>CYPSS                                                                                                                                              | 1 <sup>η</sup> εφαρμογή<br>600<br>2 <sup>η</sup> εφαρμογή<br>500 | 20-40 | α) 1 <sup>η</sup> εφαρμογή<br>κατά την άνθηση<br>β) 2 <sup>η</sup> εφαρμογή σε<br>περίπτωση<br>αναβλάστησης                                                                                                                                                              | 2 |
| Βαμβάκι<br>GOSHI                                                                                       | Ετήσια ζιζάνια<br>(αγρωστώδη και<br>πλατύφυλλα)                                                                                                                                     | 150-200                                                          | 20-40 | Κατευθυνόμενος<br>ψεκασμός με<br>καλύπτρα μεταξύ<br>των γραμμών <u>πριν</u><br><u>την έναρξη της</u><br><u>άνθησης της</u><br><u>καλλιέργειας</u> .<br>Τα σταγονίδια του<br>ψεκ. διαλύματος<br>δεν πρέπει να<br>έρχονται σε επαφή<br>με τα στελέχη και το<br>φύλλωμα των | 1 |
|                                                                                                        | Πολυετή ζιζάνια<br>Βέλιουρας<br><i>Sorghum<br/>halapense</i><br>SORHA                                                                                                               | 500                                                              | 20-40 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Καπνός<br>NIOTA                                                                                        | Οροβάγχη<br><i>Orobanche<br/>ramosa</i><br>ORARA                                                                                                                                    | α) 40<br>β) 60                                                   | 30-40 | Ψεκασμοί<br>καλύψεως:<br>α) 40 ημέρες μετά<br>τη μεταφύτευση<br>β) 60 ημέρες μετά<br>τη μεταφύτευση                                                                                                                                                                      | 2 |
| Αγροί μετά τη<br>συγκομιδή της<br>καλλιέργειας ή<br>πριν την<br>κατεργασία του<br>εδάφους για<br>σπορά | Ετήσια ζιζάνια<br>(αγρωστώδη και<br>πλατύφυλλα)                                                                                                                                     | 150-200                                                          | 20-40 | Όταν τα ζιζάνια<br>βρίσκονται στο<br>στάδιο της ζωηρής<br>τους ανάπτυξης.                                                                                                                                                                                                | 1 |
|                                                                                                        | Μολόχα<br><i>Malva</i> sp.<br>MALSS<br>Αντράκλα<br><i>Portulaca<br/>oleracea</i><br>POROL<br>Πολυκόμπι<br><i>Polygonum</i> spp.<br>POLSS<br>Τσουκνίδα<br><i>Urtica</i> sp.<br>URTSS | 400-600                                                          | 20-40 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                        |                                                                                                                                                                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Πολυετή ζιζάνια<br/>(αγρωστώδη και πλατύφυλλα)</p> <p>Βέλιουρας<br/><i>Sorghum halepense</i><br/>SORHA</p> <p>Φτέρη<br/><i>Pteridium aquilinum</i>PTEAQ</p>                                                                                                  | <p>500-600</p> <p>500</p> <p>500</p> | <p>20-40</p> <p>20-40</p> <p>20-40</p> | Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.                                                                                |        |
| <p>Ακαλλιέργητες εκτάσεις</p> <p>(βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές)</p> | <p>Ετήσια ζιζάνια<br/>(αγρωστώδη και πλατύφυλλα)</p> <p>Μολόχα<br/><i>Malva</i> sp.<br/>MALSS</p> <p>Αντράκλα<br/><i>Portulaca oleracea</i><br/>POROL</p> <p>Πολυκόμπι<br/><i>Polygonum</i> spp.<br/>POLSS</p> <p>Τσουκνίδα<br/><i>Urtica</i> sp.<br/>URTSS</p> | <p>150-200</p> <p>400-600</p>        | <p>20-40</p> <p>20-40</p>              | <p>Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.</p> <p>Στην περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί να καλυφθεί το πολύ το 50% της έκτασης αυτής.</p> | 1-3/21 |
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Πολυετή ζιζάνια<br/>(αγρωστώδη και πλατύφυλλα)</p>                                                                                                                                                                                                           | 500-1000                             | 20-40                                  | Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Αγριάδα<br/><i>Cynodon dactylon</i><br/>CYNDA</p>                                                                                                                                                                                                            | 750-1000                             | 20-40                                  |                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Βέλιουρας<br/><i>Sorghum halepense</i> SORHA</p>                                                                                                                                                                                                             | 500                                  | 20-40                                  |                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Φτέρη<br/><i>Pteridium aquilinum</i> PTEAQ</p>                                                                                                                                                                                                               | 500                                  | 20-40                                  |                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Περικοκλάδα<br/><i>Convolvulus arvensis</i> CONAR</p>                                                                                                                                                                                                        | 1000                                 | 20-40                                  |                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Κίρσιο<br/><i>Cirsium arvense</i> CIRAR</p>                                                                                                                                                                                                                  | 1000                                 | 20-40                                  |                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>Κύπερη<br/><i>Cyperus</i> spp.-</p>                                                                                                                                                                                                                          | 1 <sup>η</sup> εφαρμογή<br>600       | 20-40                                  | α) 1 <sup>η</sup> εφαρμογή κατά την άνθηση                                                                                                                         | 2      |

|                                                           |                                                       |                                |       |                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|
|                                                           | CYPSS                                                 | 2 <sup>η</sup> εφαρμογή<br>500 |       | β) 2 <sup>η</sup> εφαρμογή σε<br>περίπτωση<br>αναβλάστησης |        |
|                                                           | Ξυλώδεις<br>θάμνοι, βάτα<br><i>Rubus</i> sp.<br>RUBSS | 500-1000                       | 20-40 | Όταν βρίσκονται σε<br>πλήρη ανάπτυξη.                      | 1-3/21 |
| Κατά μήκος<br>αρδευτικών και<br>στραγγιστικών<br>καναλιών | Υδροχαρή<br>ζιζάνια                                   | 800-1000                       | 20-40 | Κοντά ή κατά την<br>άνθηση των<br>ζιζανίων.                | 1      |

Μέγιστη δόση ανά χρήση για το σύνολο των εφαρμογών /12 μήνες: 432 γρ. glyphosate/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3<sup>ο</sup>) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* sp. (Μολόχες), *Urtica* sp. (Τσουκνίδες), *Polygonum* sp. (Πολυκόμπι), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο (1-2) εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
4. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.
5. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.
6. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά.
7. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά.
8. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

## III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11525/326868/15.12.2023 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ