



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.07.2025
Αριθ. πρωτ.: 179866

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
151 25, Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 61205 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MONDIUM 26.7/6.7 WG (boscalid 26,7% β/β + pyraclostrobin 6,7% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 133426/21.05.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61205 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MONDIUM 26.7/6.7 WG (boscalid 26,7% β/β + pyraclostrobin 6,7% β/β).
- Την αριθμ. 146316/03.06.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 61205 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MONDIUM 26.7/6.7 WG (boscalid 26,7% β/β + pyraclostrobin 6,7% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 133426/21.05.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./στρ	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO	Μονίλια <i>Monilinia laxa</i> MONILA	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών BBCH 60-69 77-81	3/7-14
	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	60	60			
Κερασιά PRNAV	Μονίλια <i>Monilinia laxa</i> MONILA	60-75	60-75	100	Από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων BBCH 60-69	3/7-10
	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	60	60			
Φράουλα* (Θ) FRAAN	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	135-150	135-150	100	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών BBCH 61-89	3/5-7
	Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> SPHRMA	75-100	75-100			
Καρότο* (Υ) DAUCA	Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE	60-80	100	80	Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος BBCH 41-48	2/10-14
	Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA		75			
Τομάτα* (Υ+Θ) LYPES Πιπεριά*(Υ+Θ) CPSAN	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	100-150	100-150	100	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής. BBCH 10-89	3/7-10

Μαρούλι* (Υ) LACSA	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτίνη <i>Sclerotinia</i> <i>sclerotiorum</i> SCLESC	60-75	120-150	50	Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας. BBCH 33-47	2/7-10
Σπαράγγι ASPOF	Σκωρίαση <i>Puccinia asparagi</i> PUCCAS	75-100	75-100	100	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος BBCH 51-91	2/10-15
Κρεμμύδι (Υ) ALLCE Σκόρδο (Υ) ALLSA	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Περονόσπορος <i>Peronospora destructor</i> PERODE	150	150	100	Από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους BBCH 41-48	2/10-14
Αμυγδαλιά PRNDU	Μονίλια <i>Monilia</i> sp. MONISP Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	100	67-100	100-150	Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος BBCH 61-79	2/10-15
Φιστικιά PIAVE	Καμαροσπόριο <i>Botryosphaeria dothidea</i> BOTSDO	75-100	50-100	100-150	Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος BBCH 61-79	2/10-15
Κουκιά (Υ) φρέσκα VICFX Φασόλια (Υ) φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό PHSVX	Βοτρύτης <i>Botrytis</i> sp. BOTRSP Σκληρωτίνη <i>Sclerotinia</i> sp. SCLESP Σκωρίαση <i>Uromyces</i> sp. UROMSP	100-150	100-385	40-100	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης BBCH 15-89	2/10

Μπιζέλια (Υ) φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό PIBSX	Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOP1 Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. ERYSSP Περωνόσπορος <i>Peronospora</i> sp. PEROSP Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. SCLESP	100-150	100-385	40-100	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης BBCH 15-89	2/10
Σπανάκι SPCOL	Ανθράκνωση <i>Colletotrichum</i> sp. COLLSP Περωνόσπορος <i>Peronospora</i> sp. PEROSP Κλαδοσπόριο <i>Cladosporium</i> sp. CLADSP	75-100	75-250	40-100	Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} φύλλου, μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος BBCH 14-49	2/7-10
Αρωματικά φυτά (Θ) Βασιλικός (Θ) OCIBA	Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia</i> sp. SCLESP Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	150	150-375	40-100	Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φύλλων του φυτού BBCH 15-47	2/10
Καλλωπιστικά (Θ) Τριαντάφυλλο (Θ) ROSSS	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	80-150	150-375	40-100	Από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου μέχρι το τέλος της άνθισης BBCH 13-69	2/10
Φουντουκιά** CYLAV <i>Χρήση ήσσονος σημασίας</i>	Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP Φουζάριο <i>Fusarium lateritium</i> GIBBBA Ανθράκνωση <i>Colletotrichum</i> sp. COLLSP Κλαδοσπόριο <i>Cladosporium</i> sp. CLADSP	100	67-167	60-150	Από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 61-79	2/10-15

	Σκληρωτίνη <i>Sclerotinia</i> sp. SCLESP					
Καρυδιά** IUGRE Χρήση ήσσονος σημασίας	Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP Φουζάριο <i>Fusarium</i> sp. FUSASP Ανθράκνωση <i>Gnomonia</i> <i>leptostyla</i> GNOMLE Κλαδοσπόριο <i>Cladosporium</i> sp. CLADSP	100	67-167	60-150	Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 61-79	2/10-15
Καστανιά** CSNSA Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella</i> <i>maculiformis</i> MYCOMC <i>Phyllosticta</i> <i>maculiformis</i> MYCOMC <i>Cylindrosporium</i> <i>castaneiculum</i> CYLSCA	100	67-167	60-150	Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 61-79	2/10-15
Μελιτζάνα (Θ)** SOLME	Τεφρά σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Ωίδιο <i>Leveillulla taurica</i> LEVETA	100-150	100	100-150	Έναρξη ψεκασμών με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. BBCH 10-89 Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής.	3/7-10

Παρατηρήσεις:

* Όταν είναι παρόντα και τα δυο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση.

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες φουντουκιάς, καρυδιάς, καστανιάς και μελιτζάνας (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

1. Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
2. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε το στόμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian ασφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 30 μέτρων ή 15 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για την αμυγδαλιά, τη φιστικιά, **τη φουντουκιά, την καρυδιά και την καστανιά**
- 10 μέτρων για τα ψυχανθή
- 5 μέτρων για τις υπόλοιπες καλλιέργειες

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100), Φουντουκιά (0120060), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040)	28
Καρότο (Υ) (0213020), Κρεμμύδι (Υ) (0220020), Σκόρδο (Υ) (0220010), Σπανάκι (0252000), Βασιλικός (Θ) (0256080)	14
Κερασιά (0140020), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηλιά (0140040), Μαρούλι (Υ) (0251020), Κουκιά (Υ) (φρέσκα) (0260010-003), Φασόλια (Υ) (με λοβό και χωρίς λοβό-φρέσκα) (0260010, 0260020), Μπιζέλια (Υ) (με λοβό και χωρίς λοβό-φρέσκα) (0260030, 0260040)	7
Φράουλα (Θ) (0632010), Τομάτα(Υ+Θ) (0231010), Πιπεριά(Υ+Θ) (0231020), Μελιτζάνα (Θ) (0231030)	3
Σπαράγγι (Υ) (0270010), Τριαντάφυλλο(Θ) (0631030)	Μη εφαρμόσιμο

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 133426/21.05.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ