



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15.07.2025
Αριθ. πρωτ: 192037

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας
(δια μέσω του υπευθύνου επικοινωνίας
της εταιρείας
Κος Παναγιώτης Σπαράγγης
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια, Αττική
Email: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DAILY (δ.ο. clopyralid 2% β/ο + fluroxypyr (fluroxypyr-meptyl) 4% β/ο + MCPA 20% β/ο (υπό μορφή άλματος Κ*)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΕ) αριθ. 2021/1191 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2021 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **clopyralid**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
 - ε) (ΕΕ) αριθ. 2024/2781 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ... **fluroxypyr** ...

στ) (ΕΕ) αριθ. 2023/1757 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...**ΜCΡΑ**...

ζ) (ΕΕ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ)».
4. Την από 8768/236576/06.08.2024 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 1957/02.08.2024) καθώς και την συμπληρωματική 85815/31.03.2025 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης (ΕΜΠ 73/28.03.2025)
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339/14.05.25).
6. Τις αρ. πρωτ. 3801/100480/03.04.2023, 10883/304211/08.10.2024 και 190100/14.07.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο **33** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **DAILY (δ.ο. clopyralid 2% β/ο + fluroxypyr (fluroxypyr-meptyl) 4% β/ο + MCPA 20% β/ο (υπό μορφή άλατος Κ⁺)** της εταιρείας **Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

70594

15.07.2025

15.08.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

DAILY

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

clopyralid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97% β/β min

Χημική ομάδα:

Pyridine-carboxylates

Παρασκευαστής της δ.ο. :

SHARDA CROP CHEM LIMITED

Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, Ινδία
E-mail: regn@shardaintl.com

Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη

Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Zhejiang Avilive Chemical Co. Ltd

No.335 Jiangnan south Road, Hengdian Town, Dongyang City,
Zhejiang, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 3801/100480/03.04.2023
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο
PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της
ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

fluroxypyr (fluroxypyr-meptyl)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% β/β min

Χημική ομάδα:

Pyridyloxy-carboxylates

Παρασκευαστής της δ.ο. :

1.Shandong Luba Chemicals Co., Ltd.

No. 26 South Xizhou Road, Licheng District,
Jinan City, Shandong Province, 250100, Κίνα

2.Gansu Xinyu (Western) Chemical Co. Ltd.

No. 9, Xingfu Road, Building Materials
Chemical Industrial Zone, Yumen city, Jiuquan
City, Gansu Province, Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Shandong Luba Chemicals Co., Ltd.

Loujia Village, Tangwang Town, Licheng District, Jinan City,
Shandong Province, Κίνα

2. Gansu Xinyu (Western) Chemical Co. Ltd.

No. 9, Xingfu Road, Building Materials Chemical Industrial Zone,
Yumen city, Jiuquan City, Gansu Province, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 3801/100480/03.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 3

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

MCPA

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5% β/β min

Χημική ομάδα:

Phenoxy-carboxylates

Παρασκευαστής της δ.ο. :

Shandong Qiaochang Chemicals Co., Ltd.
No. 1181 Huanghe 12 Road, Binzhou,
Shandong,
P.C. 256601, Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Shandong Qiaochang Chemicals Co., Ltd.
No. 1181 Huanghe 12 Road, Binzhou, Shandong,
P.C. 256601, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 3801/100480/03.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία
E-mail: regn@shardaintl.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Παναγιώτης Σπαράγγης
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια, Αττική
Τηλ: 6979 254969
e-mail: p.sparangis@shardaintl.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π. Ε.
Μοναστηρίου 9, 54627 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 521045
E-mail: athinasarakini@gmail.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του

σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP CHEM LIMITED
Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)
Mumbai – 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Spachem S.L.**
Pol. Ind. Guadasequies s/n, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
- 2. Synthos AGRO Sp. z.o.o**
ul. Chemików, 32-600 Oświęcim, Πολωνία
- 3. I.R.C.A. Services S.P.A.**
S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG), Ιταλία
- 4. CIECH Sarzyna S.A.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Spachem S.L.**
Pol. Ind. Guadasequies s/n, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
- 2. Synthos AGRO Sp. z.o.o**
ul. Chemików, 32-600 Oświęcim, Πολωνία
- 3. I.R.C.A. Services S.P.A.**
S.S. Cremasca 591, N10, 24040-Fornovo S.G. (BG), Ιταλία
- 4. CIECH Sarzyna S.A.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
- 5. ΦΑΡΜΑΧΗΜ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 57022- Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 1026
- 6. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη
- 7. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**
80ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Βοιωτίας, Τ.Θ. 1315, 32200, Θήβα, Βοιωτία
- 8. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη
- 9. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00
- 10. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ. 570 22
- 11. Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε.**
Θέση Μαδάρω, Οινόφυτα Βοιωτίας
- 12. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.**
Στυλίδα, Άγιος Ιωάννης, 35300, Φθιώτιδα
- 13. TECHNOFARM SA**

ΒΙ.ΠΕ. Νέα Σάντα, 61100, Κιλκίς
14. MAGMA AGRO SA
 Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: clorpyralid 2% β/ο
 fluoxypyr (fluoxypyr-meptyl) 4% β/ο
 MCPA 20% β/ο (υπό μορφή άλατος Κ⁺)
Βοηθητικές ουσίες: 74,35 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ 3801/100480/03.04.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή Δοχείο	200 κ.εκ. έως 20 λίτρα	HDPE, COEX HDPE/PA, COEX HDPE/EVOH
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	200 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE, COEX HDPE/PA, COEX HDPE/EVOH Κουτί χάρτινο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός με 20 - 40 λίτρα νερό/στρ., μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (30 – 45 psi) και υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά.
Περιέχει τις δραστικές ουσίες MCPA , clorpyralid και fluroxypyr, οι οποίες έχουν μηχανισμό δράσης όμοιο με αυτόν των αυξινών.
Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και των ριζών, προκαλώντας τη νέκρωση των ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		Κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι (TRZAW, TRZDW) Κριθάρι (HORVW) Βρώμη (AVESW) Σίκαλη (SECCW)	Πλατύφυλλα ζιζάνια *	300-400	20-40	Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την έναρξης καλαμώματος έως την πλήρη ανάπτυξη του φύλλου σημαία (BBCH 30-39) ή Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την μέση του αδελφώματος έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 25-29)	1/ έτος ή 1 εφαρμογή <u>ανά 2 χρόνια</u> σε ουδέτερα ή όξινα εδάφη)

Παρατηρήσεις:

1. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις καλλιέργειες τριτκάλε, βρώμη, σίκαλη καθώς δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
2. Το εύρος της δόσης σχετίζεται με το στάδιο ανάπτυξης και την πυκνότητα των ζιζανίων (η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεαρά ζιζάνια ή σε χαμηλές πυκνότητες και η υψηλότερη δόση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζιζάνια που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης ή σε περιπτώσεις υψηλής πυκνότητας).
3. Τα ζιζάνια προς καταπολέμηση να έχουν μέγιστο ύψος 20-30 εκ.
4. Η χρήση στο Σιτάρι περιλαμβάνει και τα Τριτκάλε (TTLWI), Σπέλτα (TRZSP), Μονόκοκκο Σιτάρι (TRZMO), Δίκοκκο Σιτάρι (TRZDI) και Tritordeum (1TTOG).

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

Στη δόση 300 κ.εκ./στρ:

Ευαίσθητα ζιζάνια:Στελλάρια (*Stellaria media* – STEME)Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**Κολιτσίδα (*Galium aparine* - GALAP)Παπαρούνα (*Paraver rhoeas* – PAPRH)Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)

Αναρριχώμενο πολίγωνο (*Bilderdykia convolvulus* – POLCO)
Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)

Στη δόση 400 κ.εκ./στρ

Ευαίσθητα ζιζάνια :

Κολλιτσίδα (*Galium aparine* - GALAP)
Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL)
Παπαρούνα (*Paraver rhoeas* – PAPRH)
Στελλάρια (*Stellaria media* – STEME)
Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)
Πατάτα (*Solanum tuberosum*- SOLTU)
Αντράκλα (*Portulaca oleracea* – POROL)
Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)
Αναρριχώμενο πολίγωνο (*Bilderdykia convolvulus* – POLCO)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εξαιρετικά όξινα εδάφη (pH<5) μέχρι να ολοκληρωθεί το αδελφωμα στην καλλιέργεια (BBCH 25-29).

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές clorpyralid, fluroxypyr και MCPA, οι οποίες ανήκουν στην **ομάδα 4** κατά HRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα στο ίδιο χωράφι για 125 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή.

Να αποφεύγεται η καλλιέργεια κονδυλωδών και ριζωματωδών φυτών στο πλαίσιο αμειψισποράς μετά τη χρήση του σκευάσματος

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

9 Εικονογράμματα
κινδύνου:



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εξαιρετικά όξινα εδάφη (pH<5) μέχρι να ολοκληρωθεί το αδέλφωμα στην καλλιέργεια (BBCH 25-29).

Spe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά να μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από 1 φορά στα 2 έτη σε ουδέτερα και όξινα εδάφη μέχρι να ολοκληρωθεί το αδέλφωμα στην καλλιέργεια (BBCH 25-29).

SPe2: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών μην εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5 και κλίση κάτω από 0,5%, σε περίπτωση πρώιμης εφαρμογής (BBCH 25).

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: αφαιρέστε τα ρούχα εργασίας. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	Ημέρες
Σιτάρι, Τριτικάλε, Σπέλτα, Μονόκοκκο Σιτάρι, Δίκοκκο Σιτάρι, Tritordeum (0500090) Κριθάρι (0500010) Βρώμη (0500050) Σίκαλη (0500070)	Μη εφαρμόσιμο, καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα :

1. Selectivity trials in rye, oats and triticale
2. A fully validated analytical method, including its ILV and confirmatory method, according to SAN-TE/2020/12830 rev.1, for monitoring fluroxypyr residues in drinking water.
3. A fully validated analytical method, including its ILV and confirmatory method, with demonstrated extraction efficiency, according to SANTE/2020/12830-rev.1, for monitoring MCPA residues in animal matrices.

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ