



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.08.2025
Αριθ. πρωτ.: 223657

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74, Καλλιθέα
e-mail: Kornilia.Mitsopoulou@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14911 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VALACOR (chlorantraniliprole 35% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 63758/10.03.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14911 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VALACOR (chlorantraniliprole 35% β/β).
7. Την αριθμ. 193182/16.07.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14911 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VALACOR (chlorantraniliprole 35% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 63758/10.03.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		γρ./ στρ.	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	<i>Tuta absoluta</i> GNORAB	--	10-12 + 250 κ.εκ. Codacide ¹	30-150	Ψεκάσμος φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων (BBCH 15) έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες. ¹ Σε περίπτωση έντονης προσβολής <i>Tuta absoluta</i> , η προσθήκη Codacide επιτυγχάνει καλύτερη αποτελεσματικότητα.	2
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	--	8-12	30-150	Ψεκάσμος φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15 - BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2

Πιπεριά (Θ) CPSSS Καυτερή Πιπεριά (Θ) CPSSS, CPSFR	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH <i>Trichoplusia</i> spp. TRIPSP Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU <u>Χρήση ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> ** LAPHFR	--	8-12	30-120	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15 - BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2
Μπάμια (Θ)* ABMES Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH <i>Trichoplusia</i> spp. TRIPSP Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	--	8-12	30-120	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15 - BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2

	<i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR					
Τομάτα (Υ) LYPES Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH <i>Tuta absoluta</i> GNORAB Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	8-12	--	30-80	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο ωρίμανσης του πρώτου καρπού έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 71-BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες. ¹Σε περίπτωση έντονης προσβολής <i>Tuta absoluta</i>, η προσθήκη 250 κ.εκ Codacide επιτυγχάνει καλύτερη αποτελεσματικότητα.	2
Πιπεριά (Υ) CPSSS	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <i>Trichoplusia</i> spp. TRIPSP Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i>	8-12	--	30-80	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο ωρίμανσης του πρώτου καρπού (BBCH 71) έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2

	PYRUNU <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR					
Μπάμια (Υ)* ABMES Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <i>Trichoplusia</i> spp. TRIPSP Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	8-12	--	30-80	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο ωρίμανσης του πρώτου καρπού (BBCH 71) έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2
Πράσινα Φασολάκια (Θ) PHSVX	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	--	8-12	30-150	Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15 - BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2

Πράσινα Φασολάκια Με λοβό (Υ) PHSVX	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	8-12	--	30-120	Ψεκάσμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH15 - BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2
Κουνουπίδι (Υ) BRSOB Μπρόκολο (Υ) BRSOK Κεφαλωτές κράμβες Λάχανο (Υ) BRSOL Λάχανο Savoy (Υ) BRSOS (ή Λάχανο Μιλάνου (Υ))	Πλουτέλλα <i>Plutella xylosella</i> PLUTMA Σκώρος του λάχανου <i>Mamestra brassicae</i> BARABR Πιερίδα <i>Pieris rapae</i> PIERRA <i>Pieris brassicae</i> PIERBR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	8-10	--	50-100	Ψεκάσμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 2 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12 - BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό Αγγούρι (Θ) CUMSA Αγγουράκι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA Κολοκύθα (Θ) CUUPE	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <i>Trichoplusia</i> spp. TRIPSP Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	--	8-12	30-150	Ψεκάσμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 15 - BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες. Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη δόση για τα <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Spodoptera littoralis</i>.	2
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό Αγγούρι CUMSA Αγγουράκι (Υ) CUMSA Κολοκύθι (Υ) CUUPG Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA Κολοκύθα (Υ) CUUPE	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <i>Trichoplusia</i> spp. TRIPSP Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	8-12	--	30-120	Ψεκάσμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο ωρίμανσης του πρώτου καρπού (BBCH 71) έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89), και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2

Σπανάκι (Υ+Θ) SPQOL και άλλα φυλλώδη λαχανικά και κράμβες: Σκαρόλα (Υ+Θ) LACSE Αντίδι (Υ+Θ) CICEN Κάρδαμο (Υ+Θ) ETACA Ρόκα (Υ+Θ) ERUVE Κινέζικο λάχανο (Υ+Θ) BRSPK Σέσκουλα (Υ+Θ) BEAVC	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	8-12	--	30-80	Ψεκασμός φυλλώματος. Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρμογή να γίνεται από το στάδιο των 2 φύλλων (BBCH 12) έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί πλήρως (BBCH 49), ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρμογή να γίνεται μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89). Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.	2
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	8-12	--	30-80	Ψεκασμός φυλλώματος. Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρμογή να γίνεται από το στάδιο των 2 φύλλων (BBCH 12) έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί πλήρως (BBCH 49), ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρμογή να γίνεται μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89). Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες. Χρησιμοποιήστε τη μέγιστη δόση για τα <i>Helicoverpa armigera</i>, <i>Spodoptera littoralis</i>.	2

Καρότο (Υ) DAUCS Ραπανάκι (Υ) RAPSR	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Ψύλλα <i>Psila rosae</i> PSILRO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	10-12	--	20-80	Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρμογή να γίνεται από το στάδιο των 5 φύλλων (BBCH 15) έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί πλήρως (BBCH 49), ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρμογή να γίνεται μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89) και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 10 ημέρες.	2
Αρωματικά φυτά Σκατζίκι ή Φραγκομαϊντανός (Υ) ANRCE Σχοινοπράσο (Υ) ALLSC Μάραθος (Υ) FOEVU Κόλιανδρος (Υ) CORSΑ Άνηθος (Υ) AFEGR Κύμινο (Υ) CVUCY Αγγελική (Υ) ANKSS Μαϊντανός (Υ) PARCR Δυόσμος (Υ) MINSS Θρούμπι (Υ) STIHO Δενδρολίβανο (Υ) RMSOF Θυμάρι (Υ) THYSS Φύλλα δάφνης (Υ) LURNO Μαντζουράνα (Υ) MAJHO	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	8-12	--	30-80	Ψεκάσμός φυλλώματος. Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρμογή να γίνεται από το στάδιο των 2 φύλλων (BBCH 12) έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί πλήρως (BBCH 49), ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρμογή να γίνεται μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89). Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.	2

Ρίγανη (Υ) ORISS Βασιλικός (Υ) OCIBA Μέντα (Υ) MENPI Εστραγκόν (Υ) ARTDR						
Ριζώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός ζαχαρότευτλου Παντζάρια (Υ) BEAVD Ραπανοσέλινα (Υ) APUGR Χρένο (Υ) ARWLA Παστινάκη (Υ) PAVSA Ρίζα μαϊντανού (Υ) PARCR Ραπανάκια (Υ) RAPSR (Μαύρο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες) Κίτρινη κύπερη (Υ) <i>Cyperus esculentus</i> CUPES Λαγόχορτα (Υ) TROPS Γογγύλια (Υ) BRSRR	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Ψύλλα <i>Psila rosae</i> PSILRO <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	10-12	--	30-80	Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρμογή να γίνεται από το στάδιο των 5 φύλλων (BBCH 15) έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί πλήρως (BBCH 49), ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρμογή να γίνεται μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89) και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-10 ημέρες.	2
Βλήτα (Υ+Θ)* AMALI Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <i>Spodoptera frugiperda</i> LAPHFR	8-12	--	30-80	Ψεκάσμος φυλλώματος. Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρμογή να γίνεται από το στάδιο των 2 φύλλων (BBCH 12) έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί πλήρως (BBCH 49), ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρμογή να γίνεται μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89).	2

					Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.	
ΟΣΠΡΙΑ Ρεβίθια (Υ) CIEAR Φακές (Υ) LENCU Φασόλια ξερά (Υ) PHSVX Μπιζέλια ξερά (Υ) PIBSX Μπιζέλια χλωρά (Υ) PIBSA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Ασημένιος σκώρος <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> <i>Spodoptera frugiperda</i> ** LAPHFR	12	--	30-120	Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν οι πρώτοι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι ορατοί έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 51-89) Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.	2 Ανά δύο (2) χρόνια

Παρατηρήσεις:

1. Στις καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας και πιπεριάς χρησιμοποιείτε την μεγαλύτερη δόση για την αντιμετώπιση της *Tuta absoluta*.
2. Ανεξάρτητα τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, συνιστάται να μην εφαρμόζεται μικρότερη δόση από 8 γραμ. σκευάσματος/ στρέμμα σε όλες τις προαναφερθείσες καλλιέργειες εκτός του Καρότου και των ριζωδών/ κονδυλωδών λαχανικών όπου η ελάχιστη δόση/στρέμμα είναι 10γραμμ.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην μπάμια και στα βλήτα από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Καρότο (Υ) (0213020), Παντζάρια (Υ) (0213010), Ραπανοσέλινα (Υ) (0213030), Χρένο (Υ) (0213040), Παστινάκη (Υ) (0213060), Ρίζες μαϊντανού (Υ) (0213070), Ραπανάκια (Υ) (0213080) [Μαύρο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες (Υ)], Κίτρινη κύπερη (Υ) (0213080-005), Λαγόχορτα (Υ) (0213090), Γογγύλια (Υ) (0213110)	21
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020), Καυτερή Πιπεριά (Θ) (0231020-001), Πράσινα φασολάκια (Υ+Θ) (0260010), Κουνουπίδι (Υ) (0241020), Μπρόκολο (Υ) (0241010), Λάχανο (Υ) (0242020), Λάχανο Savoy (ή Λάχανο Μιλάνου) (Υ) (0242020-	1

003), Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010), Αγγουράκι (Υ+Θ) (0232020), Κολοκύθι (Υ+Θ) (0232030), Πεπόνι (Υ+Θ) (0233010), Καρπούζι (Υ+Θ) (0233030), Κολοκύθα (Υ+Θ) (0233020), Σπανάκι (Υ+Θ)- Βλήτα (Υ+Θ) (0252010), Σκαρόλα (Υ+Θ) (0251030), Αντίδι (Υ+Θ) (0251030), Κάρδαμο (Υ+Θ) (0251040), Ρόκα (Υ+Θ) (0251060), Κινέζικο λάχανο (Υ+Θ) (0243010), Σέσκουλα (Υ+Θ) (0252030) Μαρούλι (Υ+Θ) (0251020), Ρεβίθια (Υ) (0260030-003), Φακές (Υ) (0300020), Φασόλια ξερά (Υ) (0300010), Μπιζέλια ξερά (Υ) (0300030), Μπιζέλια χλωρά (Υ) (0260030), Σκατζίκι (Υ) ή Φραγκομαϊντανός (Υ) (0256010), Σχοινοπράσο (Υ) (0256020), Μάραθος (Υ) (0256030-007), Κόλιανδρος (Υ) (0256030-004), Άνηθος (Υ) (0256030-006), Κύμινο (Υ) (0810050), Αγγελική (Υ) (0256030-001), Μαϊντανός (Υ) (0256040), Δυόσμος (Υ) (0256080-023), Θρούμπι (Υ) (0256070- 008), Δενδρολίβανο (Υ) (0256060), Θυμάρι (Υ) (0256070), Φύλλα δάφνης (Υ) (0256090), Μαντζουράνα (Υ) (0256070-005), Ρίγανη (Υ) (0256070-007), Βασιλικός (Υ) (0256080), Μέντα (Υ) (0256080-001, 0256080-003, 0256080-020), Εστραγκόν (Υ) (0256100), Μπάμια (Υ+Θ) (0231040)	
--	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 63758/10.03.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ