



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.09.2025
Αριθ. πρωτ.: 241641

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 151 23, Μαρούσι
e-mail: ioannis.tsoutsanis@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 60697 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (fluopyram 25% β/ο + trifloxystrobin 25% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 91751/04.04.2025 απόφασή μας, με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 60697 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (fluopyram 25% β/ο + trifloxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 8482/227899/30.07.2024 (ΕΜΠ 1077/16.07.2024) Έκθεση Αξιολόγησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

8. Τις αριθμ. 4456/117979/29.04.2021 και 177223/02.07.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Διευρύνουμε τη με αριθ. 60697 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (fluorogran 25% β/ο + trifloxystrobin 25% β/ο), που ανανεώθηκε με την αριθμ. 91751/04.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος				Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ./ 10.000 τμ φυλλ. επιφ. (LWA)*	κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μαρούλι (Θ) LACSA	Βοτρυτής <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> SCLESC <i>S. minor</i> SCLEMI Ριζοκτόνια <i>Rhizoctonia solani</i> RHIZSO Κερκοσπορίωση <i>Cercospora beticola</i> CERCBE	--	--	80	30-80	Εφαρμογή από την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου μέχρι το μαρούλι να φτάσει το 50% του τυπικού μεγέθους του. BBCH 13-45	1
Καπνός NIOTA	Βοτρυτής <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> SCLESC <i>S. minor</i> SCLEMI	--	--	80	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο που το φυτό έχει φτάσει το 50% του τελικού ύψους του μέχρι το 20% της άνθησης. BBCH 35-62	1
Φράουλα (Θ) FRAAN	Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> / <i>Podosphaera macularis</i> SPHRMA	--	--	80	30-80	Εφαρμογή από την έναρξη ανάπτυξης των νεαρών φυτών (σχηματισμός των στολώνων)	2/7

	Ανθράκωση <i>Colletotrichum fragariae</i> COLFR Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σεπτορίωση <i>Mycosphaerella fragariae</i> MYCOFR					μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 40-89	
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> / <i>Erysiphe necator</i> UNCINE	10-67	--	20	50-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου έως το μέγεθος σκαγιού. BBCH 15-73	2/21
	Μαύρη σήψη <i>Guignardia bidwellii</i> GUIGBI	13-67	--	20			2/14
Φασόλια με λοβό (Υ) PHSVX	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> SCLESC	--	--	80	30-80	Εφαρμογές από την πλήρη ανάπτυξη/ εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι οι λοβοί να αποκτήσουν το 50% του τελικού μεγέθους τους. BBCH 61-75	1
Τομάτα (Θ+Τ) LYPES Πιπεριά (Θ+Τ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ+Τ) SOLME	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	40	--	30	75	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 51-89	2/10-14
	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium lycopersici</i> OIDILY	--	160*	--	50-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 100 εκ.</u>	2/10

						μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 51-89 <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.</u>	
Αγγούρι, Αγγουράκι (Θ+Τ) CUMSA Κολοκύθι (Θ+Τ) CUUPG Πεπόνι (Θ+Τ) CUMME Καρπούζι (Θ+Τ) CITLA	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI <i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i> DIDYBR	--	300*	--	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 51-89 <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 100 εκ.</u>	2/10
	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	--	160*	--	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 51-89 <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 200 εκ.</u>	1
Ροδακινιά ¹ PRNPS Βερικοκιά PRNAR <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</u> Κερασιά PRNAV Δαμασκηνιά PRNDO	Μονίλια <i>Monilinia laxa</i> MONILA <i>Monilinia fructigena</i> MONIFG <i>Monilinia fructicola</i> MONIFC	--	--	50	25-150	Εφαρμογές από το στάδιο των κλειστών ανθέων (μπουμπούκια) έως την πλήρη ωρίμανση. BBCH 55-87	1
	Ωίδιο <i>Podosphaera pannosa</i> SPHRPA	--	--	30	25-150	Εφαρμογές από το στάδιο των κλειστών ανθέων (μπουμπούκια) έως την πλήρη ωρίμανση. BBCH 55-87	2/7

Αγγούρι (Υ) CUMSA Αγγουράκι (Υ) CUMSA Κολοκύθι (Υ) CUUPG	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i> DIDYBR	--	--	60	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 51-89 <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 100 εκ.</u>	2/10
	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	--	--	40	30-150	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 51-89 <u>Μέγιστο ύψος καλλιέργειας 100 εκ.</u>	1
Τομάτα (Υ) LYPES <u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u> Μελιτζάνα (Υ)** SOLME	Αλτενάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO Ωίδιο <i>Levillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium neolycopersici</i> OIDINL	--	--	60	20-80	Εφαρμογές από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμανση. BBCH 51-89	2/10
Καρότο (Υ) DAUCS	Αλτενάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSE	--	--	50	20-80	Εφαρμογές από την έναρξη ανάπτυξης των ριζών (διάμετρος> 0.5 εκ.) έως ότου φθάσουν στο τυπικό τους μέγεθος και μορφή. BBCH 41-49	2/14

Μπρόκολο ² (Υ) BRSOK Κουνουπίδι (Υ) BRSOB Λάχανο ³ (Υ)	Αλτενάρια <i>Alternaria</i> <i>brassicae</i> ALTEBA <i>Alternaria</i> <i>brassicicola</i> ALTEBI Μυκοσφαιρέλλα <i>Mycosphaerella</i> <i>brassicicola</i> MYCOBR	--	--	50	20-80	Εφαρμογές από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής μέχρι να φτάσει στο τυπικό της μέγεθος. BBCH 41-49	2/14
--	---	----	----	----	-------	--	------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:***Δόση LWA:**

Σε γραμμικά συστήματα φύτευσης/ καλλιέργειες κάθετης ανάπτυξης, για την εφαρμογή της βέλτιστης δόσης σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, να γίνεται υπολογισμός της δόσης ανά στρέμμα λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της καλλιέργειας (ύψος βλάστησης και απόσταση μεταξύ των γραμμών) και της δόσης LWA ως εξής:

Τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα= $(LWA/100.000) \times \text{δόση LWA}$,
όπου $LWA = 2 \times (\text{ύψος βλάστησης (μέτρα)} \times 10.000 / \text{απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)})$

- Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά στρέμμα για τις καλλιέργειες Κολοκυνθοειδών Θερμοκηπίου (Αγγούρι, Κολοκύθι), ΣΤΟΧΟΣ: Βοτρυτής, *Stagonosporopsis cucurbitacearum*:

Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σημείο έκπτυξης της βλάστησης ή καρποφορίας μέχρι την κορυφή της βλάστησης.

Η δόση LWA είναι σταθερή (300 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 60 κ.εκ. ανά στρέμμα.

		Ύψος βλάστησης (μέτρα)							
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2
	0.75	20	40	60	60	60	60	60	60
	1	15	30	45	60	60	60	60	60
	1.25	12	24	36	48	60	60	60	60
	1.5	10	20	30	40	50	60	60	60
	2	8	15	23	30	38	45	53	60

- Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά στρέμμα για τις καλλιέργειες Σολανωδών Θερμοκηπίου (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά), Κολοκυνθοειδών Θερμοκηπίου (Αγγούρι, Κολοκύθι), ΣΤΟΧΟΣ: Ωίδιο:

Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σημείο έκπτυξης της βλάστησης ή καρποφορίας μέχρι την κορυφή της βλάστησης.

Η δόση LWA είναι σταθερή (160 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 40 κ.εκ. ανά στρέμμα.

		Ύψος βλάστησης (μέτρα)							
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0.25	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2
	0.75	11	21	32	40	40	40	40	40
	1	8	16	24	32	40	40	40	40
	1.25	6	13	19	26	32	38	40	40

	1.5	5	11	16	21	27	32	37	40
	2	4	8	12	16	20	24	28	32

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η χρήση στο μπρόκολο περιλαμβάνει τη χρήση στο Κινέζικο μπρόκολο (BRSAG)
3. Η χρήση στο Λάχανο περιλαμβάνει τη χρήση στο Λευκό Λάχανο (BRSOL), το Κόκκινο Λάχανο (BRSOR), το Λάχανο σαβόι (BRSOS) και το κωνικό λάχανο (BRSON).
4. Θ (Χρήση Θερμοκήπιου), Υ (Χρήση Υπαίθρου), Τ (Χρήση σε ανοικτές κατασκευές τύπου Τούνελ).
5. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη χρήση στη βυσσινιά.
6. Η χρήση στη δαμασκηλιά περιλαμβάνει τη χρήση στην κορομηλιά, τη δαμασκηλιά Damson και την ιαπωνική δαμασκηλιά.

****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια μελιτζάνας (Υ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Για τις καλλιέργειες θερμοκηπίου και ανοικτών κατασκευών τύπου τούνελ με πυκνό φύλλωμα φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προσωπίδα κατά την ανάμιξη /φόρτωση και επιπλέον αδιάβροχο σακάκι και παντελόνι κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

«Για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων να αφήνεται απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων στην καλλιέργεια αμπέλου».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

➤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ :

- Τομάτα, Πιπεριά και Μελιτζάνα και τη δόση των 30 κ.εκ./στρ. μία απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια

μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

- Τομάτα, Πυτεριά, Μελιτζάνα για τη δόση των 160 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι και Καρπούζι μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Φράουλα μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων.
- Μαρούλι μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

➤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΝΕΛ:

- για τις καλλιέργειες Τομάτα, Πυτεριά, Μελιτζάνα για τη δόση των 160 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- για τις καλλιέργειες Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

➤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

- Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι για εφαρμογές με δόση 60 κ.εκ./στρ., μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι για τις εφαρμογές με δόση 40 κ.εκ./στρ. μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Τομάτα, μελιτζάνα μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
- Μπρόκολο, Κουνουπίδι και Κεφαλωτές κράμβες μία ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Καρότο, μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων.
- Αμπέλι μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Φασόλι με λοβό και Καπνός μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.
- Ροδακινιά (συμπεριλαμβανομένης της Νεκταρινιάς), Βερικοκιά, **κερασιά, βυσσινιά, κορομηλιά, δαμασκηνιά Damson, ιαπωνική δαμασκηνιά:**
 - 1) για μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 50 κ.εκ./στρ. και για πρώιμες εφαρμογές μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση

ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

- 2) για μία εφαρμογή με μέγιστη δόση 50 κ.εκ./στρ. και για όψιμες εφαρμογές μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%
- 3) για δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρ. και για πρώιμες εφαρμογές, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή 30 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
- 4) για δύο εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρ. και για όψιμες εφαρμογές, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή 20 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

SPe3: Για τις καλλιέργειες ροδακινιά (συμπεριλαμβανομένης της νεκταρινιάς), βερικοκιά, **κερασιά, βυσσινιά, κορομηλιά, δαμασκηλιά Damson, ιαπωνική δαμασκηλιά**, για να προστατέψετε τα αρθρώποδα μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 25% σε συνδυασμό με μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία, κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη και κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων (ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία).

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και Επιτραπέζιες ποικιλίες) (0151000) Φασόλια με λοβό (Υ) (0260030) Καρότο (Υ) (0213020) Μπρόκολο (και Κινέζικο μπρόκολο) (Υ) (0241010), Κουνουπίδι (Υ) (0241020) Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Σαβόι και Κωνικό λάχανο) (Υ) (0242020)	14
Μαρούλι (Θ) (0251020) Ροδακινιά (και Νεκταρινιά) (0140030)	7

Βερικοκιά (0140010) Κερασιά-Βυσσινιά (0140020) Δαμασκηνιά-Κορομηλιά-Δαμασκηνιά Damson-Ιαπωνική Δαμασκηνιά (0140040)	
Φράουλα (Θ) (0152000) Πιπεριά (Θ+Τ) (0231020) Τομάτα (Θ+Τ+Υ) (0231010) Μελιτζάνα (Θ+Τ+Υ) (0231030) Αγγούρι (Υ+Θ+Τ) (0232010) Αγγουράκι (Υ+Θ+Τ) (0232020) Κολοκύθι (Υ+Θ+Τ) (0232030) Πεπόνι (Θ+Τ) (023010) Καρπούζι (Θ+Τ) (0233030)	3
Καπνός	Όπως ορίζεται από το στάδιο της καλλιέργειας κατά τον χρόνο εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 91751/04.04.2025 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ