

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.09.2025
Αριθ. πρωτ: 253616

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: SBM Développement SAS, Γαλλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κ. Φαρίδη Γρηγόριου
Δαβάκη 65, 17672 Καλλιθέα Αθήνα
e-mail: gregory@agriplus.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14762/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SANIUM SPRAY (δ.ο. flupyradifurone 0,008 % β/ο) για ερασιτεχνική χρήση ως προς την κατηγορία, τον τρόπο δράσης και το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης καθώς επίσης την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το **άρθρο 40 & 45** αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
7. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
8. Την από τον Μάρτιο του 2020 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής στην Γαλλία του όμοιου σκευάσματος SANIUM AL.
9. Την αριθμ. 11879/313968/07.12.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14762/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SANIUM SPRAY (δ.ο. flupyradifurone 0,008 % β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το με αριθμ. 98194/11.04.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την αξιολόγηση της σήμανσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SANIUM SPRAY.
11. Την αριθμ. 8399/225902/29.07.2024 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 246566/15.09.25 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. **Τροποποιούμε** την αριθμ. **14762/ΕΡ** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) SANIUM SPRAY (δ.ο. flupyradifurone 0,008 % β/ο) για ερασιτεχνική χρήση** που χορηγήθηκε με την αριθμ. 11879/313968/07.12.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατηγορία, τον τρόπο δράσης και το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης καθώς επίσης την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν την συγκομιδή.

Συγκεκριμένα τα σημεία **4, 5, 6, 9, 10, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ετοιμόχρηστο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής, για ερασιτεχνική χρήση σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού και καλλωπιστικών φυτών καθώς και σε υπαίθριες καλλιέργειες πατάτας, μπιζελιού και χλωρού φασολιού.

Δρα δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος του εντόμου με αποτέλεσμα την διατάραξη του νευρικού συστήματος και τον θάνατο του εντόμου.

Παρουσιάζει ταχύτατη αρχική δράση (knockdown effect) η οποία οδηγεί σε άμεση διακοπή της απομύζησης χυμών από τα έντομα.

Το σκεύασμα έχει δράση στα διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων (προνύμφες, νύμφες, ακμαία).

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις του ετοιμόχρηστου σκευάσματος σε κυβικά εκατοστά/ τετραγωνικό μέτρο (κ.εκ. / m ²)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME Πιπεριά (Θ) CPSAN Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	90 κ.εκ./ m ²	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89).	3/ 4-10
	Αλευρώδεις: <i>Bemisia tabaci</i> , (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	90 κ.εκ. / m ²		
Μπιζέλια με ή χωρίς λοβό (Υ) PIBSX Φασόλι χλωρό με ή χωρίς λοβό (Υ) PHSVX	Αφίδες <i>Acyrtosiphon pisum</i> (ACYRON) <i>Aphids sp</i> (APHIFA)	90 κ.εκ. / m ²	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη ανάπτυξης του φυτού έως την πλήρη καρποφορία (BBCH 20-79).	1
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	120 κ.εκ. / m ²	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη βλάστησης 10% έως την πλήρη ωρίμανση του κονδύλου (BBCH 31-49)	1

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Υπαίθρου	Κοκκοειδή: Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU) <i>Saissetia coffeae</i> (SAISHE) <i>Abgrallaspis</i> <i>cyanophylli</i> (ABGRCY) Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL) Παυλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> (PARLOL) Αφίδες: <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Aphis nerii</i> (APHINE) <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI) <i>Adelges cooleyi</i> (ADLGCO) Τζιζικάκια <i>Empoasca flavescens</i> (EMPOFL)	90 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ. 120 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ. 150 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ.	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη ανάπτυξης των βλαστών του φυτού BBCH >30	2/7
---------------------------------------	--	---	---	------------

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Θερμοκηπίου	Αφίδες <i>Aulacorthum solani</i> (AULASO), <i>Aphis fabae</i> (APHIFA), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU), <i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO), <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Myzus ascalonicus</i> (MYZUAS), <i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE) Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) Κοκκοειδή: <i>Saissetia coffeae</i> (SAISHE) <i>Abgrallaspis cyanophylli</i> (ABGRCY) Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> (SAISOL) Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> (PARLOL)	90 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ. 120 κ.εκ. / m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ. 150 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το πρώτο πραγματικό φύλλο/ζεύγος φύλλων (BBCH > 10).	2/7
Τομάτα (Υ) LYPES Μελιτζάνα (Υ) SOLME Πιπεριά (Υ) CPSAN	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	90 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 εκ. 120 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος 50 – 125 εκ. 150 κ.εκ./ m² όταν το φυτό έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 125 εκ.	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89)	2/14

Αγγούρι (Υ) CUMSA Κολοκύθι (Υ) CUUPG	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA) <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	120–150 κ.εκ./m ²	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 12-89)	2/14
Μαρούλι (Υ) LACSA	Αφίδες: <i>Nasonovia ribisnigri</i> (NASORN)	120–150 κ.εκ./m ²	Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προβολής από την εμφάνιση του δεύτερου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση (BBCH 12-49)	2/10
<u>Παρατηρήσεις:</u> Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.				

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο εφαρμογές με 150 κ.εκ. σκευάσματος ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο στην ίδια περιοχή εφαρμογής ανεξαρτήτου καλλιέργειας.
2. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
3. Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό.
4. Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.
5. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική flupyradifurone, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά IRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. **Υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική flupyradifurone για τις αφίδες και τους αλευρώδεις.**

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:

--

10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	EUH208: Περιέχει 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. With 2-methyl-3(2H)-isothiazolone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
-----------	---------------------------	---

11	Δηλώσεις προφύλαξης:	102+405: Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά. P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. <i>«Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά την εφαρμογή.»</i> <i>«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι, και πουκάμισο με μακριά μανίκια. Συστήνεται η χρήση γαντιών.»</i> SPr3: Για να προστατέψετε τα αρθρώροδα μη στόχους αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας, αγγουριού, κολοκυθιού, μαρουλιού και καλλωπιστικών φυτών. Μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ωφέλιμα έντομα. SPr8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες/Για την προστασία των μελισσών και άλλων εντόμων επικονίασης μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που ανθίζουν. Μην το χρησιμοποιείτε όπου οι μέλισσες αναζητούν ενεργά τροφή/Μην το εφαρμόζετε όταν ανθίζουν.
-----------	----------------------	--

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή:

Πεδίο Εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Τομάτα (Υ + Θ), Πιπεριά(Υ + Θ), Μελιτζάνα(Υ + Θ), Αγγούρι(Υ + Θ), Κολοκύθι (Υ + Θ), Μπιζέλια χωρίς λοβό (Υ) (0260040), Φασόλια χωρίς λοβό(Υ) (0260020), Μαρούλι (Υ)	3
Πατάτα (0211000), Μπιζέλια με λοβό (Υ) (0260030), Φασόλια με λοβό(Υ) (0260010)	7
Καλλωπιστικά (Υ, Θ)	Δεν ορίζονται

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρθμ. 11879/313968/07.12.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έκτοτε.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ