



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 271507

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Nisso Chemical Europe GmbH, Γερμανίας
(Δια της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ)
e-mail: info@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14620 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROFIL Extra 5 SL (acetamiprid 5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3880/38043/15.09.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14620 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROFIL Extra 5 SL (acetamiprid 5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 260964/26.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 14620 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROFIL Extra 5 SL (acetamiprid 5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 3880/38043/15.09.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Εσπεριδοειδή CIDSS Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE Κλημεντίνη CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA Κιτριά CIDME Περγαμόντο CIDAB Νεράντζια CIDAU Μοσχολέμονο (Λάιμ) CIDAF Φράπα CIDGR	Αφίδες APHISP Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus</i> sp. ALTHSP <i>Aleurocantus</i> sp. ALECSN Βρωμούσες <i>Closterotomus trivialis</i> CLCRTR κ.α. Κοκκοειδή <i>Planococcus</i> sp. PSECCI <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Φυλλοκνίστες PHYNCI <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	200	100-150	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-85	2/30
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca decedens</i> EMPODC κ.α.	150	100	100-150		

Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μούσμουλα MSPGE	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Μηλολόνθη <i>Melolontha melolontha</i> MELOME Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσανος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	150	100-150*	100-150*	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-85	1
	Ψύλλες (ενήλικα) PSYLPI Φυλλορύκτες <i>Leucoptera</i> sp. LEUCSP <i>Lithocolletis</i> sp. LITHSP <i>Phyllonorycter</i> sp. PRYCML Κηκιδόμυγες Tenthredinoidea DASYMA Τζιτζικάκια EMPODC Βρωμούσες 1PENTF Ανθονόμος <i>Anthonomus rubi</i> ANTHSP	150	100			

Πυρηνόκαρπα Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNCE	Αφίδες APHISP, MYZUPE Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Ραγολέτης κερασιάς <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Φυλλοδέτεες <i>Cacoecia rosana</i> CACORO <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	200	130-200	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-85	2/30
	Φυλλορύκτες LEUCSP, LITHSP, PRYCML Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Z. flammigera</i> ERYTFL <i>C. viridis</i> TETTVI Βρωμούσες 1PENTF	150	100			

Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN	Αφίδες APHISP, MYZUPE Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Ραγολέτης κερασιάς <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Φυλλοδέτεες <i>Cacoecia rosana</i> CACORO <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	150	130-200*	75-115*	Ψεκάσμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-85	1
	Φυλλορύκτες LEUCSP, LITHSP, PRYCML Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Z. flammigera</i> ERYTFL <i>C. viridis</i> TETTVI Βρωμούσες 1PENTF	150	100	100-150		

Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	Κοκκοειδή <i>Planococcus</i> sp. PLANSP <i>Heliooccus</i> sp. HELCSF	150	150	100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση της ταξιανθίας μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-85	1
	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Φυλλοξήρα αμπέλου PHYXSP Χρυσοκάνθαρος <i>Anomala vitis</i> ANMLVT Αφίδες APHISP, MYZUPE Θρίπες (εκτός από <i>F. occidentalis</i>) THRISP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Hyalesthes obsoletus</i> HYAEOB <i>Zygina rhamni</i> ERYTRH Φυλλορύκτες <i>Antispila</i> sp. ANTSSP <i>Phyllocnistis</i> sp. PHYNSP <i>Holocacista</i> sp.	150	150			

	HOLKSP					
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES	Αφίδες APHISP, MYZUPE Αλευρώδης TRIAVA, BEMITA Θρίπες THRISP Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE Καλόκορη <i>Calocoris</i> sp. CLCRSP Βρωμούσες <i>Nezara</i> sp. NEZASP <i>Palomena prasina</i> PALOPR Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Hyalesthes obsoletus</i> HYAEOB Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. HYAEOB <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	Υπαίθρου: 2/25-28 Θερμοκηπίου: 1
	Πυραλίδα πιπεριάς <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	160	160-250			

Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Αφίδες APHISP, MYZUPE	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	2/25-28
	Αλευρώδης TRIAVA, BEMITA					
	Θρίπες THRISP					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE					
	Καλόκορη <i>Calocoris</i> sp. CLCRSP					
	Βρωμούσες <i>Nezara</i> sp. NEZASP <i>Palomena prasina</i> PALOPR					
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Hyalesthes obsoletus</i> HYAEOB					
	Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. HYAEOB					
	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO					
	Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
	Πυραλίδα πιπεριάς <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	160	160-250			

Πιπεριά (Υ) CPSAN	Αφίδες APHISP, MYZUPE	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. BBCH 51-89	2/25-28
	Αλευρώδης TRIAVA, BEMITA					
	Θρίπες THRISP					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE					
	Καλόκορη <i>Calocoris</i> sp. CLCRSP					
	Βρωμούσες <i>Nezara</i> sp. NEZASP <i>Palomena prasina</i> PALOPR					
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Hyalesthes obsoletus</i> HYAEOB					
	Λυριόμυζα <i>Liriomyza</i> sp. HYAEOB					
	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO					
	Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
	Πυραλίδα πιπεριάς <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	160	160-250			

Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός) Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA Κολοκύθα (Υ) CUUPE	Αφίδες APHISP, APHIGO Αλευρώδεις TRIAVA, BEMITA <u>Χρήσεις ήσσοнос σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. BBCH 25-87	2/25-28
Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός) Αγγούρι (Υ) CUMSA Κολοκυθάκι (Υ) CUUPG	Αφίδες APHISP, APHIGO Αλευρώδεις TRIAVA, BEMITA <u>Χρήσεις ήσσοнос σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. BBCH 25-87	1
Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός) Αγγούρι για τουρσί (αγγουράκι) (Υ+Θ) CUMSA	Αφίδες APHISP, APHIGO Αλευρώδεις TRIAVA, BEMITA <u>Χρήσεις ήσσοнос σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. BBCH 25-87	2/25-28

Αγκινάρα CYUSC	Αφίδες APHISP	150	150-250	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους. BBCH 15-49	2/25
Ανθοκράμβες Μπρόκολο BRSOK Κουνουπίδι BRSOB Κεφαλωτές κράμβες (εκτός από λαχανάκια Βρυξελλών) Λάχανο BRSOL Κόκκινο λάχανο BRSOR Λάχανο σαβόι BRSOS Λευκό λάχανο BRSON	Αφίδες APHISP Βρωμούσες 1PENTF Κολεόπτερα (Άλτης) EPIXIN	140	160-250*	55-90*	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 2 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους. BBCH 12-49	1
Ψυχανθή Φασολάκια πράσινα BEANA Φασόλια (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) BEANA Αρακάς PEASS Μπιζέλια PEASS	Αφίδες APHISP Θρίπες THRISP Φυλλορύκτες LIRISP	160	160-250	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που οι λοβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 19-79	2/30-45
Όσπρια Φασόλια (ξηρά) BEANA Ρεβίθια CIEAR Φακές LENCU Κουκιά	Αφίδες APHISP Θρίπες THRISP Φυλλορύκτες LIRISP	160	160-250	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι	2/30-45

VICFX Φάβα LTHSA					το στάδιο που οι λοβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 19-79	
Πατάτα SOLTU	Αφίδες APHISP Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE Βρωμούσες 1PENTF	130	150-200	60	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^ο φύλλο του κύριου βλαστού μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των κονδύλων. BBCH 15-49	2/25
Βαμβάκι GOSHI	Αφίδες APHISP <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ Βρωμούσα** <i>Halyomorpha halys</i> HALYHA	130	150-200	60	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο φύλλο μέχρι το στάδιο που το 90% των καρυδιών αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 19-79	1
Ελαιοκράμβη BRSNN	Αφίδες APHISP Βρωμούσες 1PENTF Κολεόπτερα <i>Meligethes</i> spp. MELISP <i>Ceutorhynchus</i> spp. CEUTSP	130	150-200	60	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο φύλλο μέχρι το στάδιο που το 50% των λοβών αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. BBCH 19-75	1

Μηδική MEDSA	Αφίδες APHISP Άπιο <i>Arion</i> sp. APIOSP Γωνιόκτενα <i>Phytodecta fornicate</i> GONCFO	50	--	60-80	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9ο πραγματικό φύλλο μέχρι πριν το άνοιγμα των ανθέων. BBCH 19-60	2/25
Καπνός NIOTA	Αφίδες APHISP Άλτης <i>Epitrix hirtipennis</i> EPIXSP	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος. BBCH 19-49	1
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ)	Αφίδες APHISP Αλευρώδεις TRIAVA, BEMITA Θρίπες THRISP Βρωμούσες 1PENTF Τζιτζικάκια EMPODC Λυριόμυζα LIRISP	150-200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^ο πραγματικό φύλλο. BBCH 15-91	2/25-28
Αμπέλι (φυτώρια) VITVI	Αφίδες APHISP Φυλλοξήρα αμπέλου PHYXSP Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <i>Scaphoideus titanus</i>	150-200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^ο πραγματικό φύλλο. BBCH 15-91	2/25-28

	SCAPLI <i>Hyalesthes obsoletus</i> HYAEOB <i>Zygina rhamni</i> ERYTRH Κοκκοειδή <i>Planococcus</i> sp. PLANSP <i>Helicococcus</i> sp. HELCSF Φυλλοκνίστες <i>Antispila</i> sp. ANTSSP <i>Phyllocnistis</i> sp. PHYNSP <i>Holocacista</i> sp. HOLKSP					
Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο και μη εδώδιμο φλοιό) Λάχανα BRSOL και Κράμβες, Μαρούλι LACSA και άλλα Λαχανικά, Ψυχανθή Όσπρια Αγκινάρα CYUSC Ελαιοκράμβη BRSNN κ.α.	Αφίδες APHISP Αλευρώδεις TRIAVA, BEMITA Θρίπες THRISP Βρωμούσες 1PENTF Άλτης EPIXSP Τζιτζικάκια EMPODC Φυλλορύκτες LIRISP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	150-200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών.	2/25-28

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
2. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της.
3. Απαγορεύεται η χρήση κατά την ανθοφορία.

*Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο στρέμμα.

****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του βαμβακιού και κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιού, τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, κολοκυνθοειδών, σποροπαραγωγής. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3880/38043/15.09.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ