



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.01.2025
Αριθ. πρωτ: 288639

Ταχ. Δ/νση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165

Προς: Altinco S.L., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, της
εταιρείας MEDPEST IKE
Κος Κώστας Μαρκάκης
25ης Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι
e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

e-mail: lapocha@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14878 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ALTINCO GRINWARD [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20% β/ο] ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

(ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023)
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 6175/159058/23.09.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14878 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ALTINCO GRINWARD [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20% β/ο] όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την από τον Ιανουάριο του 2025 έκθεση αξιολόγησης της Μάλας.

8. Την αριθμ. 10808/300876/04.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και την αριθμ. 281887/15.10.2025 συμπληρωματική αίτηση αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 14878 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ALTINCO GRINWARD [δ.ο. paraffin oil (CAS 8042-47-5) 20% β/ο], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 6175/159058/23.09.2024 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5**, **11** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Λεμονιά (CIDLI) Μανταρινιά (CIDRE) Γκρέιπ φρουτ (CIDPA) Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια/λάιμ) (CIDAΦ)	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Aphis spiraecola</i> (APHISI) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Toxoptera aurantia</i> (TOXOAU)	400	130-200	100-200	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
Μηλιά (MABSD)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά (PRNAR) Ροδακινιά (PRNPS) Κερασιά (PRNAV) Δαμασκηνιά (PRNDO)	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10

Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Αφίδες <i>Chaetosiphon fragaeifolii</i> (CHTSFR), <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (MACSEU) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89	3/10
Φράουλα (Θ) (FRAAN)	Αφίδες <i>Chaetosiphon fragaeifolii</i> (CHTSFR), <i>Aphis gossypii</i> (APHIGO)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89	3/10
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
Αγγούρι (Υ+Θ) Αγγουράκι (Υ+Θ) (CUMSA) Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (CUUPG)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
Πεπόνι (Υ+Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ+Θ) (CITLA) Κολοκύθα (Υ+Θ) (CUUPE)	Αλευρώδεις <i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA), <i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA)	240	250-400	30-60	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 11-89	3/10
ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (Υ) Βατόμουρα (Υ) (RUBFR) Καρποί ασπροβατομουριάς (Υ) (RUBCA) Σμέουρα (Κόκκινα και κίτρινα) (Υ)	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> (APHIPO)	400	250-400	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών BBCH 67-89	3/10

(RUBID) Μύρτιλλα (Υ) (VACAN, VACCO, VACVG) Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Υ) (VACMA) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) (Υ) (RIBNI & RIBRU) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (Υ) (RIBUC)						
Αχλαδιά (PYUCO)	Ψύλλα <i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLP)	400	250-400	80-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 67-89)	3/10
Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN). 3. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά (PRNCE). 4. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά (CIDAU) και το περγαμόντο (CIDAB). 5. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά (CIDME). 6. Η χρήση στο γκρέιφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα (CIDGR). 7. Η χρήση στη μηλιά περιλαμβάνει και την Αχλαδομηλιά (PYUPY). 8. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.						

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά την εφαρμογή στην

καλλιέργεια συστήνεται να φοράτε γάντια».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια ασφάλκη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργήσιμη έκταση:

- 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στη μηλιά, **στην αχλαδιά** και τα πυρηνόκαρπα για πρώιμες εφαρμογές.
- 10 μέτρων στη μηλιά, **στην αχλαδιά** και τα πυρηνόκαρπα για όψιμες εφαρμογές, στα εσπεριδοειδή, στα μούρα και μικρούς καρπούς.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/ συμπληρωματικά στοιχεία:

- Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6175/159058/23.09.2024 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ