



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθμ. πρωτ:

11.11.2025
311294

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: SEIPASA S.A., Ισπανίας
(διά του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
“AGRIBIZ”
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SEITHOR (δ.ο. pelargonic acid 53,136% β/ο)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. (ΕΕ) 2024/2221 της επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2024 για την τροποποίηση του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **Λιπαρά οξέα C7 έως C20 (pelargonic acid Αριθ. CAS: 112-05-0)**
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β' 2339/14.05.25).

4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας. »
5. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Τις αριθμ. 47778/19.02.2025 και 190388/14.07.2025 αξιολογήσεις (Registration Report) της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ).
8. Την αριθμ. 7900/224863/14.07.2023 αίτηση καθώς επίσης και τα αριθμ. 12877/361270/23.11.2023, 3668/94500/01.04.2024, 59425/05.03.2025, 79452/24.03.2025 και 192857/16.07.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SEITHOR της εταιρείας SEIPASA S.A., Ισπανίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

70602

11.11.2025

01.12.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

SEITHOR

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική Ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Pelargonic acid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

88,9 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Λιπαρά οξέα

Παρασκευαστής:

EMERY OLEOCHEMICALS LLC

4900 Este Avenue, 45232 Cincinnati, Ohio, Η.Π.Α.

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

EMERY OLEOCHEMICALS LLC

4900 Este Avenue, 45232 Cincinnati, Ohio, Η.Π.Α.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 7900/224863/14.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SEIPASA S.A.

C/Almudévar nº 2, Tardienta, 22240 Huesca, Ισπανία

E-mail: jrfernandez@seipasa.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. "AGRIBIZ"

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

E-mail: info@agribiz.grβ) Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:**ΑΡΜΑΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ AGRIPRO A.E**

Πιρίτσα, Ιωνία Θεσσαλονίκης 57008, Ελλάδα

Τηλ.: 2310783528

E-mail: tech@agripro.eu

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SEIPASA S.A.

C/Almudévar nº 2, Tardienta, 22240 Huesca, Ισπανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

SEIPASA S.A.

Ciudad Dario St., naves 1-3-5, Poligono Industrial La Creu L' Alcudia, Valencia 46250, Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

SEIPASA S.A.

Ciudad Dario St., naves 1-3-5, Poligono Industrial La Creu L' Alcudia, Valencia 46250, Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Pelargonic acid 53,136 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 40,23 %β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 7900/224863/14.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες:		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	15 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	15 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.	HDPE, Χάρτινο κουτί
3	Φιάλη	1 έως 20 λίτρα	HDPE -HMW
4	Μπιτόνι	5 έως 10 λίτρα	HDPE
5	Βαρέλι	200 λίτρα	HDPE
6	Δεξαμενή	1000 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής :**

Κατευθυνόμενος προς το έδαφος ψεκασμός στο φύλλωμα των ζιζανίων. Ανάλογα με τη χρήση εφαρμόζεται με μηχανοκίνητα ή χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα, υπό συνεχή ανάδευση, σε στεγνό έδαφος, αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα και τα άλλα πράσινα μέρη της καλλιέργειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Να ψεκάζεται αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες, ακαλλιέργητες εκτάσεις, αστικές και κατοικημένες περιοχές, αδιαπέρατες ή ημιπερατές επιφάνειες, πάρκα, κήπους, πεζοδρόμια κλπ. Περιέχει τη δραστική ουσία πελαργονικό οξύ. Δρα με αποξήρανση, διαταράσσοντας την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης των φύλλων και τα αποτελέσματα είναι ορατά πολύ γρήγορα.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		λίτρα / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρέμμα)		
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οиноποιήσιμες ποικιλίες)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	1,2-1,5	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων σε έκταση που καλύπτει το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου	4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14

				πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16) Καλλιέργεια: Από την αρχή έκπτυξης του φυλλώματος έως την ωρίμανση (BBCH 10-85)	
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά (ή Μεσπιλιά) MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά EIOJA	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	1,2-1,5	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων σε έκταση που καλύπτει το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16) Καλλιέργεια: Από την αρχή έκπτυξης του φυλλώματος - στάδιο αντί ποντικίου: Πράσινες άκρες φύλλων 10 mm πάνω από τα λείπια των οφθαλμών. Τα πρώτα φύλλα διαχωρίζονται - έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-87)	4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU Καστανιά CSNSA Φουντουκιά CYLAV Πεκάν CYAIL Φιστικιά PIAVE Καρυδιά IUGRE	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	1,2-1,5	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων σε έκταση που καλύπτει το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου	4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14

				(BBCH 10-16) Καλλιέργεια: Από την αρχή έκπτυξης του φυλλώματος - στάδιο αυτί ποντικιού: Πράσινες άκρες φύλλων 10 mm πάνω από τα λέπια των οφθαλμών. Τα πρώτα φύλλα διαχωρίζονται - έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-87)	
Ακαλλιέργητες εκτάσεις (Γεωργικές και δασικές, μη- γεωργικές και μη- δασικές)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	1,2-1,5	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων [1 Απριλίου- 1 Σεπτεμβρίου]: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16)	4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14
Αστικές και κατοικημένες περιοχές, Ιδιωτικά πάρκα και οικιακοί κήποι - Αδιαπέρατες και ημιπερατές επιφάνειες (συμπεριλαμβ.: βιομηχανίες, αμαξοστάσια, σιδηροδρομικές γραμμές, δρόμους, πεζοδρόμια, μονοπάτια και άλλες μόνιμες κατασκευές)				Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16)	
Παρατηρήσεις: 1. Τα ζιζάνια πρέπει να βρίσκονται σε ζωνή ανάπτυξη, από το 1ο μέχρι το 6ο φύλλο. 2. Ψεκάστε χωρίς να έρθει σε επαφή το προϊόν με χλοοτάπητες ή με το υπέργειο μέρος των καλλιεργούμενων φυτών. 3. Εφαρμόστε κατά προτίμηση το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα. 4. Μην το εφαρμόζετε σε υγρά φυτά ή εάν αναμένεται βροχή δυο (2) ώρες μετά την εφαρμογή. 5. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.					

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:*Αμπέλι**

- Δόση 1,2-1,5 λίτρα σκευ. /στρ.

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)

Ρόκα άγρια (*Diplotaxis erucooides* - DIPER),

Χρυσάνθεμο (*Chrysanthemum fuscatum* - CHYFU)

Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)

Βρόμος (*Bromus arvensis* - BROAV)

Πορφυρή κύπερη (*Cyperus rotundus* - CYPRO)

- Δόση 1,5 λίτρα σκευ. /στρ.

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)

Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua* - MERAN),

Οξαλίδα (*Oxalis pes-caprae f. plenifolia* - OXAPF),

Πικραλίδα (*Taraxacum officinale* - TAROF)

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)

Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR),

Ήρα πολυετής (*Lolium perenne* - LOLPE)

- Δόση 1,2 λίτρα σκευ. /στρ.

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)

Οξαλίδα (*Oxalis pes-caprae f. plenifolia* - OXAPF),

Πικραλίδα (*Taraxacum officinale* - TAROF)

Μηλοειδή, Ακρόδρυα:

- Δόση 1,2-1,5 λίτρα σκευ. /στρ.:

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)

Βλήτο πλαγιαστό (*Amaranthus blitoides* - AMABL)

Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),

Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)

Ποτεντίλλη (*Potentilla reptans* - PTLRE),

Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI),

Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus* - SONOL),

Σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)

- Δόση 1,5 λίτρα σκευ. /στρ.:

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)

Ρόκα άγρια (*Diplotaxis erucooides* - DIPER)

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-85%)

Πικραλίδα (*Taraxacum officinale* - TAROF),

Τριφύλλι λευκό έρπον (*Trifolium repens* var. *nevadense* - TRFRN)

Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)

- Δόση 1,2 λίτρα σκευ. /στρ.:

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-85%)

Ρόκα άγρια (*Diplotaxis erucooides* - DIPER)

Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Αστικές και κατοικημένες περιοχές, Ιδιωτικά πάρκα και οικιακοί κήποι -**Αδιαπέρατες και ημιπερατές επιφάνειες**

- Δόση 1,2-1,5 λίτρα σκευ. /στρ.

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)

Βλήτο πλαγιαστό (*Amaranthus blitoides* - AMABL),

Ευφόρβια (*Euphorbia maculata* - EPHMA),

Κόνυζα (*Erigeron sumatrensis* - ERISU),

Ήρα πολυετής (*Lolium perenne* - LOLPE),

Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI),

Τριφύλλι λευκό έρπον (*Trifolium repens* - TRFRE)

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL),Ρόκα άγρια (*Diplotaxis erucoides* - DIPER)

- Δόση 1,5 λίτρα σκευ. /στρ.

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus* - SONOL),Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)**Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)**Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR),Σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)

- Δόση 1,2 λίτρα σκευ. /στρ.

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus* - SONOL),Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική pelargonis acid, η οποία ανήκει στην **ομάδα 0** κατά HRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας είναι χαμηλός.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- οι εφαρμογές να γίνονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.
- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και
- Να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

7

Χρονικό διάστημα

ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της

προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών

που ακολουθούν:

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

9

Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:



GHS07

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P264: Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος, σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση».
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο **Part A** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ