



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.02.2026
Αριθ. πρωτ.: 44031

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: CERTIS BELCHIM B.V., Ολλανδίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
e-mail: j.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 70283 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ACAMOS 500 (δ.ο. metobromuron 50% β/ο) ως προς τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Το αριθ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθ. 789/12825/07.05.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 70283 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ACAMOS 500 (δ.ο. metobromuron 50% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθ. 3954/09.01.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθ. **70283** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **ACAMOS 500 (δ.ο. metobromuron 50% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 789/12825/07.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις οδηγίες χρήσης,

το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **3, 5, 6, 7, 8, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

3	<p>Οδηγίες χρήσης:</p> <p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκάσμος σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος, με μηχανοκίνητα ή χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα τύπου σκούπας, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκάσμου. Μην προετοιμάζετε περισσότερη ποσότητα ψεκαστικού υγρού από την απαραίτητη.</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Καθαρίστε με τριπλό ξέπλυμα αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί.</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.</p> <p>Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητά του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.</p>
----------	--

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα εφαρμογής
		κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψ.υ. λίτρα /στρ.		
Πατάτα SOLTU	Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη	400	1334 – 2000	20 – 30	Προφυτρωτικά, με καθολικό ψεκάσμο της επιφάνειας του εδάφους. (BBCH 00-08)	1

Ηλίανθος HELAN	Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη	200-300 ⁽³⁾	--	20 – 30	Προφυτρωτικά, με καθολικό ψεκασμό της επιφάνειας του εδάφους. (BBCH 00-08)	1
Σόγια GLXMA	Πλατύφυλλα ζιζάνια και ορισμένα ετήσια αγρωστώδη	200-300 ⁽³⁾	--	20 – 30	Προφυτρωτικά, με καθολικό ψεκασμό της επιφάνειας του εδάφους. (BBCH 00-08)	1
Σπαράγγι (Υ) (ASPOF)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200	--	20-30	Προφυτρωτικά των ζιζανίων, με καθολικό ψεκασμό της επιφάνειας του εδάφους και μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας .	1
Βαμβάκι ⁽⁵⁾ (GOSSS)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200-250	--	20-30	Καθολικός ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, από Μάρτιο έως Ιούνιο, προφυτρωτικά των ζιζανίων και προφυτρωτικά της καλλιέργειας, μετά τη σπορά της καλλιέργειας έως και πριν την εμφάνιση του υποκοτυλίου από την επιφάνεια του εδάφους. (BBCH 00-08)	1
Καπνός (NIOTA)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	200-250	--	20-30	Καθολικός ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, από Μάρτιο – Ιούλιο, προφυτρωτικά των ζιζανίων και πριν τη φύτευση της καλλιέργειας.	1

Παρατηρήσεις:

1. Το **σκεύασμα** πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση των ζιζανίων. Η δραστηριότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη δραστηριότητα του προϊόντος. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του.

3. Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Σε αμμώδες έδαφος (ποσοστό της άμμου μεγαλύτερο από 65%) ή σε έδαφος με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη από 3%, να μειώσετε τη δόση σε 200 κ.εκ./στρ. Προβλήματα εκλεκτικότητας μπορούν να εμφανιστούν σε αυτά τα εδάφη σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή.
4. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.
5. **Στο Βαμβάκι συνιστάται η εφαρμογή με το σκεύασμα να γίνεται το αργότερο εντός 3 ημερών μετά τη σπορά της καλλιέργειας, για την αποφυγή πιθανής φυτοτοξικότητας.**

ΠΑΤΑΤΑ

Καταπολεμούμενα - ευαίσθητα ζιζάνια:

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima- BEAVA (Τεύτλο)
Bidens tripartita – BIDTR (Αγριοκατιφές, Διόδοντο το τριμερές)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο)
Diploaxis erucoides - DIPER
Echinochloa crus-galli - ECHCG (Μουχρίτσα)
Fallopia sp. - FOPSS (Πολύγωνο)
Fallopia convolvulus - POLCO (Άγριο Φαγόπυρο-Αναρριχώμενο πολύγωνο)
Lolium rigidum - LOLRI (Λεπτή ήρα)
Matricaria chamomilla - MATCH (Χαμομήλι)
Roa annua - POAAN (Κοινή πόα)
Polygonum aviculare - POLAV (Πολυκόμπι)
Polygonum lapathifolium - POLLA (Λαπάτσα – πολύγωνο λαπαθόφυλλο)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα-γλυστρίδα)
Reseda phyteuma - RESPH
Senecio vulgaris - SENVU (Μαρτιάκος)
Sinapis arvensis - SINAR (Βρούβα-λαψάνα-άγριο σινάπι)
Solanum nigrum - SOLNI (Στύφνος-αγριοντοματιά)
Sonchus arvensis- SONAR (Πολυετής ζωχός)

Καταπολεμούμενα - Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Aethusa cynapium - AETCY (Αιθούσα)
Amaranthus albus- AMAAL (Άσπρο βλήτο)
Amaranthus retroflexus - AMARE (Τραχύ βλήτο)
Convolvulus arvensis - CONAR (Περιπλοκάδα)
Diploaxis erucoides - DIPER
Euphorbia chamaesyce - EPHCH (Χαμαισική)
Fumaria officinalis - FUMOF (Καπνόχορτο)
Mercurialis annua - MERAN (Σκαρολάχανο)
Setaria adhaerens - SETAD (Σετάρια)

ΣΟΦΙΑ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Καταπολεμούμενα - ευαίσθητα ζιζάνια:

Amaranthus retroflexus - AMARE (Τραχύ βλήτο)
Centaurea sp.- CENSS (Κενταύρια)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο)
Echinochloa crus-galli - ECHCG (Μουχρίτσα)

Polygonum aviculare - POLAV (Πολυκόμπι)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα-γλυστρίδα)
Solanum nigrum - SOLNI (Στύφνος-αγριοντοματιά)

ΣΠΑΡΑΓΓΙ**Καταπολεμούμενα - ευαίσθητα ζιζάνια:**

Amaranthus sp. (AMASS) Βλήτα
Amaranthus retroflexus (AMARE) Τραχύ βλήτο
Rapaver rhoeas (PAPRH) Παπαρούνα
Portulaca oleracea (POROL) Γλυστρίδα
 Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Chenopodium album (CHEAL), *Chenopodium sp.*(CHESS) Λουβουδιά
Chrysanthemum segetum (CHYSE) Αγριομαργαρίτα
Digitaria sanguinalis (DIGSA) Αιματόχορτο
Echinochloa crus-galli (ECHCG) Μουχρίτσα

ΒΑΜΒΑΚΙ**Στη δόση 200 κ.εκ /στρ - μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Amaranthus retroflexus - AMARE (Τραχύ βλήτο)
Στη δόση 250 κ.εκ /στρ - ευαίσθητα ζιζάνια:
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα-γλυστρίδα)

ΚΑΠΝΟΣ**-Στη δόση 200 κ.εκ /στρ**

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
 Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Abutilon theophrasti – ABUTH (Αγριοβαμβακιά)

-Στη δόση 250 κ.εκ /στρ

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
 Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Abutilon theophrasti – ABUTH (Αγριοβαμβακιά)
Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Metobromuron, η οποία ανήκει στην ομάδα 5 κατά HRAC.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων όπως αμειψισπορά, μηχανική μέθοδος, κ.λ.π., όπου αυτό είναι δυνατό.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα σε δόση 200 – 300 κ.εκ./στρ. μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν: πατάτα μετά από επιφανειακή κατεργασία του εδάφους ή καλαμπόκι, φασόλια, **κουκιά**, μπιζέλια και καρότα μετά από βαθύ όργωμα (**20 εκ.**).

- σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν:

- Σε χωράφι όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα σε δόση 200 – 300 κ.εκ./στρ. θα πρέπει να γίνει βαθύ όργωμα πριν την σπορά/φύτευση με τις ακόλουθες καλλιέργειες: σταυρανθή, τεύτλα.
- Μη φυτεύετε φυλλώδη λαχανικά και σιτηρά σε λιγότερο από 120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.
- Σε περίπτωση που φυτεύονται ριζωματώδεις καλλιέργειες σε λιγότερο από 120 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος, μην χρησιμοποιήσετε τα εναέρια μέρη των εν λόγω καλλιεργειών για ζωτροφή.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν αναμένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.

Μετά την εφαρμογή του προϊόντος, ενδεχομένως να παρατηρηθούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας (χλωρώσεις). Το φαινόμενο είναι παροδικό και δεν επηρεάζει την ποιότητα ή την απόδοση των καλλιεργειών.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ενδυμασία ατομικής προστασίας.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Για την προστασία των κατοίκων και των περιοίκων αφήστε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για τις υπαίθριες καλλιέργειες.

SP1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από αυλές αγροκτημάτων ή περιφερειακές οδούς.

Spe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε βαριά, αργιλώδη και μη αποστραγγιζόμενα εδάφη.

Σρε3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **από τα επιφανειακά ύδατα** :

- 20 μέτρων για την καλλιέργεια της πατάτας,
- 10 μέτρων για τις καλλιέργειες σόγιας, ηλίανθου, **σπαραγγιού και καπνού**.

Σρε3: Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες της πατάτας, της σόγιας και του ηλίανθου.

ΕΥΗ401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα (0211000), Ηλίανθος (0213050), Σόγια (0401070) Βαμβάκι (0401090), Σπαράγγι (0270010) Καπνός	Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 789/12825/07.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ.α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ