



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05-06-2018
Αριθ. πρωτ: 4893/67043

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: NTY PONT ELLAS AE
 (δια της εταιρείας ELANKO ELLAS AE,
 Λ. Μεσογείων 335, 5231-Χαλάνδρι)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 60.510 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FONTELIS 20 SC (δραστική ουσία: penhiopyrad), ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 33, 37.4 και 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *penhiopyrad*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 κοινή Υπουργική Απόφαση "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009" (Β' 3621).
9. Την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματος FONTELIS στην Ιταλία (αριθμός καταχώρησης 15005) καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Ιταλίας στον προβλεπόμενο ιστότοπο CIRCABC.
10. Το αριθ. ΕΜΠ 714/30.4.18 έγγραφο του ΜΦΙ (αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4832/66075/8.5.18).
11. Τις αριθ. πρωτ. 2876/34332/24.3.15, 1370/20770/7.2.18, 1812/26192/16.2.18 και 4893/67043/9.5.18 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

12. Την αριθ. 1606/16641/14.2.17 Απόφαση (Β' 629) με θέμα τη "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε την αριθ. 60.510 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FONTELIS 20 SC (δραστική ουσία: penthioryrad), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 1182/13612/24.2.16 (ΑΔΑ: Ω5ΤΙ4653ΠΓ-910) Απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.
Οι παράγραφοι 1.4α, 1.4β, 2, 5, 11 και 13.2 της αριθ. 1182/13612/24.2.16 (ΑΔΑ: Ω5ΤΙ4653ΠΓ-910) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

| | |
|---|--|
| 1.4α) Κάτοχος της άδειας: | NTY PONT ELLAS A.E. Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232-Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 210 688 9700, Fax: 210 688 9799 E-mail: yannis.stamatas@dupont.com |
| Υπεύθυνος επικοινωνίας: | ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Μεσογείων 335, 15231-Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 2106726381, Fax: 2106749514 E-mail: kdimizas@elanco.gr |
| 1.4β Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: | ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Μεσογείων 335, 15231-Χαλάνδρι Τηλέφωνο: 2106726381, Fax: 2106749514 E-mail: kdimizas@elanco.gr |

2. Συσκευασίες:

| Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-------|--|-------|
| Φιάλη | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 480, 500, 750, 800, 840 και 960 κ.εκ. 1, 1.5, 1.68, 2, 2.4, 2.5, 3.6, 4, 4.8, 5 και 10 λίτρα. | HDPE |

5. Φάσμα δράσης:

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | κ.εκ/ στρέμμα (max) | κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ | Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>) Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp</i>) Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium</i>) | 112,5 * | 75 | 100-150* | Όταν αναμένεται εμφάνιση της ασθένειας από BBCH 10- έως το PHI * Σε περίπτωση εφαρμογών έως το τέλος της ανθοφορίας, χρησιμοποιήστε όγκο νερού 100-120 λίτρα /στρ (75-90 ml προϊόν / στρ). | 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες |
| ΤΟΜΑΤΑ, βιομηχανική ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ Αγρού | Βοτρυτής <i>Botrytis cinerea</i> | 240 | 200 | 50-120 | Από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 51 – 89 Ελάχιστη δόση 200 κ.εκ ανεξαρτήτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|-----------------|---|---|
| <p>ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ Θερμοκηπίου/προστα- τευόμενα</p> | <p>Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i></p> | <p>240 max (για μία εφαρμογή)</p> <p>400 max (για 2 εφαρμογές, βλ. στήλη 7)</p> | <p>200</p> | <p>50-120</p> | <p>Από την έναρξη της ανθοφορίας όταν ο πρώτος ανθοφόρος οφθαλμός είναι ορατός μέχρι την πλήρη ωρίμανση BBCH 51 – 89</p> | <p>2 εφαρμογές με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 ml/στρ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν στη 2η εφαρμογή ψεκάσει με 120 λτ/στρ στην 1η θα πρέπει να έχει ψεκάσει με 80 λτ/στρ. Η δόση 200 ml/100 λτ ψεκ. υγρού παραμένει σταθερή.</p> |
| <p>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Κολοκύθι (Y) (CUUPG), Αγγούρι (Y) (CUMSA)</p> | <p>Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)</p> | <p>240</p> | | <p>50-120</p> | <p>Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)</p> | <p>1</p> |
| <p>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (με βρώσιμο φλοιό): Κολοκύθι (Θ) (CUUPG), Αγγούρι (Θ) (CUMSA)</p> | <p>Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (SPHRFU)</p> | <p>100 (1^η εφαρμογή)</p> <p>+ 300 (2^η εφαρμογή)</p> | | <p>20-150</p> | <p>Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89).</p> <p>Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ.σκευ./στρ.</p> | <p>2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.</p> |
| <p>ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υπαίθρου): Μαρούλι (LACSA), Σπανάκι (SPQOL), Λικοτρίβολο (VLLLO), Ρόκα (ERUVE), Κάρδαμο (BARVE), Σέσκουλα (BEAVV).</p> | <p>Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)</p> <p>Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sp</i> (SCLESP)</p> | <p>150</p> | | <p>20 - 100</p> | <p>Από το στάδιο της έκπτυξης του 10% των φύλλων έως την συγκομιδή. (BBCH 40-49)</p> | <p>1</p> |
| <p>ΠΙΠΕΡΙΑ (CPSAN) (Θερμοκηπίου)</p> | <p>Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)</p> | <p>100- 200 (1^η εφαρμογή)</p> <p>+ 200-300 (2^η εφαρμογή)</p> | | <p>50-150</p> | <p>Από την εμφάνιση των ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)</p> <p>Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 400 κ.εκ.σκευ./στρ.</p> | <p>2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|--------|---|---|
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ: Ροδάκινα (<i>PRNPS</i>), Βερίκοκα (<i>PRNAR</i>), Νεκταρίνια (<i>PRNPN</i>). | Μονίλια <i>Monilinia fructigena</i> (MONIFG), <i>Monilinia laxa</i> (MONILA), <i>Monilinia fructicola</i> (MONIFC), <i>Monilinia sp</i> (MONISP). | 120 | | 50-100 | Για την καταπολέμηση της Μονίλιας συνιστάται 1 εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. (BBCH 60-69) | 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. |
| | Ωίδιο <i>Podosphaera tridactyla</i> (PODOTR), <i>Sphaerotheca pannosa</i> (SPHRPA). | 150 | | | Για την καταπολέμηση του Ωιδίου , συνιστάται 1 εφαρμογή από την καρπόδεση έως το 90% της ωρίμανσης των καρπών. (BBCH 71-89) | |
| ΦΡΑΟΥΛΑ (<i>FRAAN</i>) (Υπαίθρου/ Θερμοκηπίου) | Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI) | 90 | | 20-100 | Με την εμφάνιση των πρώτων ανθικών καταβολών στη βάση της ροζέτας μέχρι την συγκομιδή. (BBCH 55 – 89) Η συνιστώμενη δόση είναι 90 κ.εκ.σκευ./στρ. ανά εφαρμογή. Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές, η συνολική ποσότητα προϊόντος δε θα πρέπει να ξεπεράσει αθροιστικά τα 180 κ.εκ.σκευ./στρ. | 2 με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 5 ημέρες |

Παρατηρήσεις:

1. Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού και τους εξοπλισμούς διανομής που χρησιμοποιούνται, συνιστάται να τηρείτε τις ελάχιστες και μέγιστες δόσεις προϊόντος / στρέμμα που αναφέρονται.
2. Τομάτα-μελιτζάνα, Αγγούρι-Κολοκύθι(θερμοκηπίου), Πιπεριά: Η συνολική δόση ανά καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 400κ.εκ/στρ.
3. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P264 Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe2 Για την προστασία των υπόγειων υδάτων μην εφαρμόζετε σε εδάφη με περιεκτικότητα άμμου μεγαλύτερη του 80%.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:

- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 25 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων 10 μέτρα με βλάστηση, για τα μηλοειδή και τα πυρηνόκαρπα.
- Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε για τα υπαίθρια Κολοκυνθοειδή μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ. από τα επιφανειακά ύδατα.
- Χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής διασποράς με έκχυση αέρα και πίεση λειτουργίας που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 8 bar, το εύρος της ζώνης μπορεί να μειωθεί στα 20 μέτρα, εκ των οποίων 10 μέτρα με βλάστηση.
- Για την τομάτα, μελιτζάνα, το αγγούρι, την πιπεριά, την φράουλα και τα φυλλώδη λαχανικά να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ. από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα 10 με βλάστηση. Χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής διασποράς που επιτρέπουν τη μείωση της διασποράς κατά 50%, το εύρος της ζώνης μπορεί να μειωθεί στα 10 μ. με βλάστηση.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|--|-----------|
| ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ | 21 |
| ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Υ), ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ) | 1 |
| ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Κολοκύθι) (Υ/Θ) | 1 |
| ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ που περιλαμβάνονται στο φάσμα δράσης (Υ) | 14 |
| ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ) | 1 |
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια) | 3 |
| ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ/Θ) | 1 |

17. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα στοιχεία, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης:

- Τρία (3) πειράματα υπολειμμάτων σε ποικιλίες μαρουλιού ανοιχτού φυλλώματος.

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 1182/13612/24.2.16 (ΑΔΑ: Ω5ΤΙ4653ΠΓ-910) Απόφασή μας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ