



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30-5-2025
Αριθ. Πρωτ.: 144020

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο : 210 – 928 7250
e-mail : mgaspari@minagric.gr

ΠΡΟΣ: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH
Γερμανίας (δια του υπεύθυνου
επικοινωνίας K&N Ευθυμιάδης ABEE)
ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΤΚ 57022
l.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14620 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) PROFIL EXTRA 5 SL (δ.ο. acetamiprid) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 91/14.06.2024).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/158 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2025, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **acetamiprid** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Την αριθμ. 108414/28-4-2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.5.2025).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 3880/38043/15.9.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14620 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROFIL EXTRA 5 SL (δ.ο. acetamiprid) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις από 14-4-2025 και 20-5-2025 εισηγήσεις της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 49241/20-2-2025 αίτηση και τα από 26-2-2025, 9-5-2025, 12-5-2025, 26-5-2025 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14620** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) **PROFIL EXTRA 5 SL (δ.ο. acetamiprid)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.

3880/38043/15.9.2017 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το **φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.**

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.ε.κ./ στρ. (max)	κ.ε.κ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (CIDSS): Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE), Κλημεντίνες (CIDRE), Λεμονιά (CIDLI), Γκρέϊπ φρουτ (CIDPA), Κιτριά (CIDME), Περγαμόντο (CIDAB), Νεράντζια (CIDAU), Μοσχολέμονο (Λάιμ) (CIDAΦ), Φράπα (CIDGR)	Αφίδες (APHISP), Αλευρώδεις (<i>Aleurothrixus</i> sp. (ALTHSP), <i>Aleurocantus</i> sp.) (ALECSN), Βρωμούσες (<i>Closterotomus trivialis</i> (CLCRTR), κ.α.), Κοκκοειδή (<i>Planococcus</i> sp. (PSECCI), <i>Aonidiella aurantii</i> (AONDAU), Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA), Φυλλοκνίστες (PHYNCI)	200	100-150	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)	2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες
	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca decedens</i> (EMPODC), κ.α.)	150	100	100-150		
Μηλοειδή: Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO), Κυδωνιά (CYDOB), Μούσμουλα (MSPGE)	Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> (APHIPO), <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Eriosoma lanigerum</i> (ERISLA)), Μηλολόνηθη (<i>Melolontha melolontha</i> (MELOME), Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> (CERTCA))	150	100-150*	100-150*	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)	1 εφαρμογή
	Ψύλλες (ενήλικα) (PSYLPI), Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera</i> sp. (LEUCSP), <i>Lithocolletis</i> sp. (LITHSP), <i>Phyllonorycter</i> sp. (PRYCML)), Κηκιδόμυγες (Tenthredinoidea) (DASYMA), Τζιτζικάκια (EMPODC), Βρωμούσες (1PENTF), Ανθονόμος <i>Anthonomus rubi</i> (ANTHSP)	150	100			

Κερασιά (PRNAV), Βυσσινιά (PRNCE)	Αφίδες (APHISP, MYZUPE), Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata) (CERTCA), Ραγολέτης κερασιάς (Rhagoletis cerasi) (RHAGCE), Δροσόφιλα (Drosophila suzukii) (DROSSU), Φυλλοδέτες (Cacoecia rosana) (CACORO)	200	130-200	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)	2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες
	Φυλλορύκτες (LEUCSP, LITHSP, PRYCML), Τζιτζικάκια (Empoasca sp. (EMPOSP), Z. flammigera (ERYTFL), C. viridis (TETTVI)), Βρωμούσες (1PENTF)	150	100			
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά (PRNPS), Νεκταρινιά (PRNPN)	Αφίδες (APHISP, MYZUPE), Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata) (CERTCA), Ραγολέτης κερασιάς (Rhagoletis cerasi) (RHAGCE), Δροσόφιλα (Drosophila suzukii) (DROSSU), Φυλλοδέτες (Cacoecia rosana) (CACORO)	150	130-200*	75-115*	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85)	1 εφαρμογή
	Φυλλορύκτες (LEUCSP, LITHSP, PRYCML), Τζιτζικάκια (Empoasca sp. (EMPOSP), Z. flammigera (ERYTFL), C. viridis (TETTVI)), Βρωμούσες (1PENTF)	150	100	100-150		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) (VITVI)	Κοκκοειδή (Planococcus sp. (PLANSP), Helioecoccus sp. (HELCSP)) Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata) (CERTCA), Δροσόφιλα (Drosophila suzukii) (DROSSU), Φυλλοξήρα αμπέλου (PHYXSP), Χρυσοκάνθαρος (Anomala vitis (ANMLVT)) Αφίδες (APHISP, MYZUPE), Θρίπες (THRISP εκτός από F. occidentalis)	150	150	100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση της ταξιανθίας μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-85).	1 εφαρμογή

	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp. (EMPOSP), <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI), <i>Hyalesthes obsoletus</i> (HYAEOB), <i>Zygina rhamni</i> (ERYTRH)), Φυλλορύκτες (<i>Antispila</i> sp. (ANTSSP), <i>Phyllocnistis</i> sp. (PHYNSP), <i>Holocacista</i> sp. (HOLKSP))	150	150			
Τομάτα (LYPES) (Υ + Θ)	Αφίδες (APHISP, MYZUPE), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA), Θρίπες (THRISP), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)), Καλόκορη (<i>Calocoris</i> sp. (CLCRSP)), Βρωμούσες (<i>Nezara</i> sp. (NEZASP), <i>Palomena prasina</i> (PALOPR)), Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp. (EMPOSP), <i>Hyalesthes obsoletus</i> (HYAEOB), Λυριόμυζα (<i>Liriomyza</i> sp. (HYAEOB)))	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89).	Υπαίθρου: 2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες Θερμοκηπίου: 1 εφαρμογή
	Πυραλίδα πιπεριάς (<i>Ostrinia nubilalis</i> (PYRUNU))	160	160-250			
Μελιτζάνα (SOLME) (Υ+Θ)	Αφίδες (APHISP, MYZUPE), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA), Θρίπες (THRISP), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)), Καλόκορη (<i>Calocoris</i> sp. (CLCRSP)), Βρωμούσες (<i>Nezara</i> sp. (NEZASP), <i>Palomena prasina</i> (PALOPR)), Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp. (EMPOSP), <i>Hyalesthes obsoletus</i> (HYAEOB), Λυριόμυζα (<i>Liriomyza</i> sp. (HYAEOB)))	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89).	2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες
	Πυραλίδα πιπεριάς (<i>Ostrinia nubilalis</i> (PYRUNU))	160	160-250			

Πιπεριά (CPSAN) (Υ)	Αφίδες (APHISP, MYZUPE), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA), Θρίπες (THRISP), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)), Καλόκορη (<i>Calocoris</i> sp. (CLCRSP)), Βρωμούσες (<i>Nezara</i> sp. (NEZASP), <i>Palomena prasina</i> (PALOPR)), Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp. (EMPOSP), <i>Hyalesthes obsoletus</i> (HYAEOB), Λυριόμυζα (<i>Liriomyza</i> sp. (HYAEOB))	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89).	2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες
	Πυραλίδα πιπεριάς (<i>Ostrinia nubilalis</i> (PYRUNU))	160	160-250			
Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός): Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUPE) (Υ)	Αφίδες (APHISP, APHIGO), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA)	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. (BBCH 25-87).	2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες
Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός): Αγγούρι (CUMSA), Κολοκυθάκι (CUUPG) (Υ)	Αφίδες (APHISP, APHIGO), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA)	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. (BBCH 25-87).	1 εφαρμογή
Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός): Αγγούρι για τουρσί (αγγουράκι) (CUMSA), (Υ, Θ)	Αφίδες (APHISP, APHIGO), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA)	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του 5 ^{ου} πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. (BBCH 25-87).	2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες

Αγκινάρα (CYUSC)	Αφίδες (APHISP)	150	150-250	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^{ου} πραγματικό φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους. (BBCH 15-49).	2 εφαρμογές ανά 25 ημέρες
Ανθοκράμβες: -Μπρόκολο (BRSOK), -Κουνουπίδι (BRSOB) Κεφαλωτές κράμβες (εκτός από λαχανάκια Βρυξελλών): -Λάχανο (BRSOL), -Κόκκινο λάχανο (BRSOR) -Λάχανο σαβόι (BRSOS) -Λευκό λάχανο (BRSOH)	Αφίδες (APHISP), Βρωμούσες (1PENTF), Κολεόπτερα (Αλτης, (EPIXIN))	140	160-250*	55-90*	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 2 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους. (BBCH 12-49).	1 εφαρμογή
Ψυχανθή: Φασολάκια πράσινα (BEANA), Φασόλια (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό) (BEANA), Αρακάς (PEASS), Μπιζέλια (PEASS)	Αφίδες (APHISP), Θρίπες (THRISP), Φυλλορύκτες (LIRISP)	160	160-250	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που οι λοβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 19-79).	2 εφαρμογές ανά 30-45 ημέρες
Όσπρια: Φασόλια (ξηρά) (BEANA), Ρεβίθια (CIEAR), Φακές (LENCU), Κουκιά (VICFX), Φάβα (LTHSA)	Αφίδες (APHISP), Θρίπες (THRISP), Φυλλορύκτες (LIRISP)	160	160-250	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που οι λοβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 19-79).	2 εφαρμογές ανά 30-45 ημέρες

Πατάτα (SOLTU)	Αφίδες (APHISP), Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) (LPTNDE), Βρωμούσες (1PENTF)	130	150-200	60	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^ο φύλλο του κύριου βλαστού μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των κονδύλων. (BBCH 15-49).	2 εφαρμογές ανά 25 ημέρες
Βαμβάκι (GOSHI)	Αφίδες (APHISP) <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ Βρωμούσα <i>Halyomorpha halys</i> ** (HALYHA)	130	150-200	60	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο φύλλο μέχρι το στάδιο που το 90% των καρυδιών αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 19-79)	1 εφαρμογή
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	Αφίδες (APHISP), Βρωμούσες (1PENTF), Κολεόπτερα (<i>Meligethes</i> spp. (MELISP), <i>Ceutorhynchus</i> spp. (CEUTSP))	130	150-200	60	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο φύλλο μέχρι το στάδιο που το 50% των λοβών αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 19-75)	1 εφαρμογή
Μηδική (MEDSA)	Αφίδες (APHISP), Άπιο (<i>Apion</i> sp. (APIOSP)), Γωνιόκτενα (<i>Phytodecta fornicate</i> (GONCFO))	50	-	60-80	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι πριν το άνοιγμα των ανθέων. (BBCH 19-60)	2 εφαρμογές ανά 25 ημέρες
Καπνός (NIOTA)	Αφίδες (APHISP), Άλτης (<i>Epitrix hirtipennis</i> (EPIXSP))	200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος. (BBCH 19-49)	1 εφαρμογή

Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ)	Αφίδες (APHISP), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA), Θρίπες (THRISP), Βρωμούσες (1PENTF), Τζιτζικάκια (EMPODC), Λυριόμυζα (LIRISP)	150-200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^ο πραγματικό φύλλο. (BBCH 15-91)	2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες
Αμπέλι (φυτώρια) (VITVI)	Αφίδες (APHISP), Φυλλοξήρα αμπέλου (PHYXSP), Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp. (EMPOSP), <i>Scaphoideus titanus</i> (SCAPLI), <i>Hyalesthes obsoletus</i> (HYAEOB), <i>Zygina rhamni</i> (ERYTRH)), Κοκκοειδή (<i>Planococcus</i> sp. (PLANSPP), <i>Helioecoccus</i> sp. (HELCSPP)) Φυλλοκνίστες (<i>Antispila</i> sp. (ANTSSP), <i>Phyllocnistis</i> sp. (PHYNSP), <i>Holocacista</i> sp. (HOLKSP)	150-200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5 ^ο πραγματικό φύλλο. (BBCH 15-91)	2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες
Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή: Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πιπεριά (CPSAN), Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο και μη εδώδιμο φλοιό), Λάχανα (BRSOL) και Κράμβες, Μαρούλι (LACSA) και άλλα Λαχανικά, Ψυχανθή, Όσπρια, Αγκινάρα (CYUSC), Ελαιοκράμβη (BRSNN) κ.α.	Αφίδες (APHISP), Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA), Θρίπες (THRISP), Βρωμούσες (1PENTF), Άλτης (EPIXSP), Τζιτζικάκια (EMPODC), Φυλλορύκτες (LIRISP)	150-200	200-300	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών.	2 εφαρμογές ανά 25-28 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
- 2) Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της.
- 3) Απαγορεύεται η χρήση κατά την ανθοφορία.

*** Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο στρέμμα.**

****«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στη καφέ βρωμούσα του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».**

11

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικό ρουχισμό/κατάλληλα υποδήματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SRe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε:

- Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας με βλάστηση 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες: τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, κολοκυνθοειδή, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ψυχανθή, όσπρια, αγκινάρα, πατάτα, ελαιοκράμβη, καπνό, φυτώρια αμπελιού, καλλωπιστικά.
- Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών και του Αμπελιού
- Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών και των Πυρηνοκάρπων.

SRe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

13

Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Εσπεριδοειδή, Κεράσια, Βυσσινιά, Αμπέλι	14 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Μηλιά, Αχλαδιά	30 ημέρες
Κυδωνιά, Μουσμουλιά	14 ημέρες
Τομάτες (Υ), Πιπεριές (Υ), Μελιτζάνες (Υ)	7 ημέρες
Τομάτες (Θ)	10

Μελιτζάνες (Θ)	3 ημέρες
Κολοκυνθοειδή (με μη εδώδιμο φλοιό)	14 ημέρες
Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο φλοιό) Αγγούρι (Υ), Κολοκυθάκι (Υ), Αγγούρι για τουρσί (αγγουράκι) (Υ)	7 ημέρες
Αγγούρι για τουρσί (αγγουράκι) (Θ)	3 ημέρες
Αγκινάρα	7 ημέρες
Ανθοκράμβες: Μπρόκολο, Κουνουπίδι. Κεφαλωτές κράμβες: Λάχανο, Κόκκινο λάχανο, Λάχανο Σαβόι, Λευκό λάχανο	14 ημέρες
Ψυχανθή, Όσπρια, Πατάτα, Βαμβάκι, Μηδική, Καπνός	14 ημέρες
Ελαιοκράμβη	34 ημέρες

Β

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. **3880/38043/15.9.2017** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ