



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.04.2025
Αριθ. πρωτ: 97705

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
e-mail: info@hellafarm.gr

ΘΕΜΑ: « Ανανέωση της αριθμ. 14673 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DIPEL 2X (δ.ο.: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain ABTS-351 64% β/β) ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτού.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 2023/998 της επιτροπής της 23ης Μαΐου 2023 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ABTS-351, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).

4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αριθμ. 4471/61411/21.08.2018 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14673 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DIPEL 2X (δ.ο.: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ABTS-351), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την από τον Ιούλιο του 2024 έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου-ΜΦΙ (ΕΜΠ 1739) για το προϊόν DIPEL 2X.
10. Την αριθμ. 10306/295215/27.09.2023 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 8605/231701/01.08.2024 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **DIPEL 2X** της εταιρείας **Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Γαλλίας** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία 1^{ης} ανανέωσης
1.1.γ Ημερομηνία λήξης

14673
21.08.2018
10.04.2025
30.06.2039

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

DIPEL 2X
Βρέξιμη σκόνη (WP)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Bacillus thuringiensis subsp. *kurstaki* strain ABTS-351

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Dipel TP (slurry dried): Min/Max: 1×10^{10} - 9×10^{10} CFU/g

Χημική ομάδα:

Μη εφαρμόσιμο (μικροβιακό σκεύασμα)

Παρασκευαστής:

Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way,
Suite 100 Libertyville, Illinois 60048, ΗΠΑ

εκπροσωπούμενη στην ΕΕ από τη
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S, Γαλλίας

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Abbott Laboratories**
1401 Sheridan Road
North Chicago, Illinois 60064, ΗΠΑ.
- 2. Valent BioSciences LLC**
2142 350th Street
Osage, Iowa 50461, ΗΠΑ.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 10306/295215/27.09.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
10A, Rue de la Voie Lactée,
69370 Saint Didier au Mont d' Or, Γαλλία
Τηλ.: +34 627 470 405
E-mail: ana.perez@sumitomo-chemical.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1^ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκόπουλου
Παιανία 190 02, Τ.Θ. 100
Τηλ.: 210 6800900
Fax: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1^ο χλμ. Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκόπουλου
Παιανία 190 02, Τ.Θ. 100
Τηλ.: 210 6800900
Fax: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Valent BioSciences LLC

1910 Innovation Way,
Suite 100 Libertyville, Illinois 60048, ΗΠΑ

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

A to Z Drying, Inc.,

1000 Wallace Road, Osage, Iowa 50461, ΗΠΑ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. A-Z Drying, Inc.,

1000 Wallace Road, Osage, Iowa, 50461 Η.Π.Α

2. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,

Άγιος Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας.

3. Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV),

a. Polígono Industrial Castilla Vial 1 Parcela 19B,
46380 - Cheste (Valencia), Ισπανία

b. Avinguda Comarques del País Valencià, 267,
46930 Quart de Poblet, Valencia, Ισπανία

4. S.T.I SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A

Via Evangelista Torricelli 2,
48033 Cotignola, Ravenna, Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351 (MPCA) 64% β/β (ισοδύναμο με 32000 IU/mg)

Βοηθητικές ουσίες: **36% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 10306/295215/27.09.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/Δοχείο	Από 50 γρ. έως και 5 κιλά	HDPE
2	Σακούλα σε χάρτινο κουτί	>>	PP, PET, LDPE σακούλα, κουτί χάρτινο
3	Σακούλα	>>	LDPE σακούλα, κουτί χάρτινο
4	Διπλή σακούλα	10 κιλά	LDPE
5	Σακούλα σε δοχείο	10 κιλά	Σακούλα LDPE σε δοχείο HDPE
6	Σακούλα	10 έως και 25 κιλά	LDPE
7	Σακούλα σε δοχείο	25 κιλά	Σακούλα LDPE σε δοχείο ινοσανίδας (fiber drum)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το βυτίο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου όγκου νερού και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού. Προσθέτετε το πυκνό αυτό διάλυμα στο μισογεμάτο με νερό ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Συνεχίστε την ανάδευση κατά τον ψεκασμό, το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο αμέσως μετά την εφαρμογή. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τις σακούλες και τα χάρτινα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν δρα από στομάχου και πρέπει να καταποθεί από τις προνύμφες για να είναι αποτελεσματικό. Λίγες ώρες μετά την κατάποση, οι προνύμφες παύουν να τρέφονται και πεθαίνουν τις επόμενες μέρες.

5. Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μαχ αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		γρ. / 100 λτ. ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λτ./στρ.)	γρ. /στρ.		
ΑΚΡΟΔΡΥΑ - Αμυγδαλιά PRNDU - Φιστικιά PIAVE - Φουντουκιά CYLAV	Φυλλοδέτεες <i>(Archips rosanus-CACORO, A. podanus-CACOPO),</i> Υπονομευτές <i>(Hyponomeuta padellus- HYPNPA, H. malinella-HYPNMA)</i>	25	150-250	37.5-62.5	Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Αν δεν υπάρχουν συστήνεται, με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς, όπως προκύπτουν από τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Ανάλογα με την προσβολή εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως την πτώση των καρπών (BBCH 11-89).	3-10 εφαρμογές (2 – 5 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 3-16 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ - Λεμονιές CIDLI - Πορτοκαλιές CIDSΙ - Μανταρινιές CIDRE - Γκρειπ-φρουτ CIDPA - Κιτριά CIDME	Ανθοτρήτης <i>(Prays citri-PRAYCI,</i> Φυλλοδέτεες <i>Cacoecia sp.-CACOSP)</i>	25	200-400	50-100	Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Αν δεν υπάρχουν συστήνεται οι εφαρμογές να ξεκινούν κατά την ανθοφορία με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1). Ανάλογα με την προσβολή εφαρμογές από το άνοιγμα των πρώτων ανθέων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89). Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού.	3-10 εφαρμογές (2 – 5 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 3-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ - Μηλιά- MABSD - Αχλαδιά- PYUCO - Κυδωνιά CYDOB	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Καρπόκαψα <i>(Cydia pomonella-</i> CARPPO, Φυλλοδέτες <i>(Archips rosana-</i> CACORO, <i>A. podana-</i> CACOPO, <i>Tortrix sp.-</i> TORTSP), Ζευζέρα <i>(Zeuzera pyrina-</i> ZEUZPY)	100	50-150	50-150	Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) της κάθε γενιάς. Εφαρμογές ανάλογα με την προσβολή από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 11-89). Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού.	3-8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ - Βερικοκιά PRNAR - Ροδακινιά PRNPS - Νεκταρινιά PRNPN - Κερασιά PRNAV - Δαμασκηνιά PRNDO	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Ανάρσια <i>(Anarsia lineatella-</i> ANARLI), Καρπόκαψα <i>(Laspeyresia molesta-</i> LASPMO), Φυλλοδέτες <i>(Archips rosana-</i> CACORO, <i>A. podana-</i> CACOPO) Υπονομευτές <i>(Hyponomeuta padellus-</i> HYPNPA, <i>H. malinella-</i> HYPNMA)	60-100	100-150	75-150	Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) της κάθε γενιάς. Επανάληψη, αν χρειαστεί 3-16 ημέρες αργότερα. Ανάλογα με την προσβολή εφαρμογές από την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 11-89). Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού.	3-10 εφαρμογές (2 – 5 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 3-16 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΕΛΙΑ OLVEU	Πυρηνοτρύτης <i>(Prays oleae-</i> PRAYOL)	25	150-300	37.5-75	Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Αν δεν υπάρχουν προτείνεται μια εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη (όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει) και την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) έως, ανάλογα με την προσβολή, την ωρίμανση των καρπών (BBCH 60-89).	1-2 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων.

					Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται όταν υπάρχει αυξημένη πίεση προσβολής ή όταν απαιτείται μεγαλύτερος όγκος ψεκαστικού υγρού. Να γίνεται καλή κάλυψη των ανθέων.	
ΑΜΠΕΛΙ VITVI	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Ευδεμίδα κατά της 2 ^{ης} και 3 ^{ης} γενιάς (<i>Lobesia botrana</i> - POLYBO) Κογχυλίδα (<i>Eupoecilia</i> <i>ambiguella</i> - CLYSAM) Μαμέστρα (<i>Mamestra</i> sp.- MAMESP)	50-100	100	100	Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Αν δεν υπάρχουν, συστήνονται ψεκασμοί μία εβδομάδα από την έναρξη πτήσεως της κάθε γενιάς του εντόμου. Ανάλογα με την προσβολή εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. (BBCH 11-89) Να γίνεται καλή κάλυψη των τσαμπιών.	1-8 εφαρμογές (1 – 4 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) Κραμβοειδή: - Μπρόκολο BRSOK - Λάχανο BRSOL - Κουνουπίδι BRSOB - Κινέζικο λάχανο BRSPK - Μη κεφαλωτή κράμβη (Kale) BRSOC Σολανώδη: - Τομάτες LYPES - Μελιτζάνες SOLME - Πυτεριές CPSAN	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis</i> <i>armigera</i> - HELIAR) Μαμέστρα (<i>Mamestra</i> <i>oleracea</i> - POLIOL, <i>M. brassicae</i> - BARABR, Πλουτέλλα (<i>Plutella</i> sp- PLUTSP), <i>Plutella xylostella</i> - PLUTMA, <i>Plutella</i> <i>maculipennis</i> - PLUTMA) Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i> - PIERBR, <i>Pieris rapae</i> - PIERRA) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> <i>exigua</i> - LAPHEG, <i>Spodoptera</i> sp.- SPODSP	100	50-100	50-100	Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) και ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση (BBCH 11-89).	1-8 εφαρμογές (1 – 3 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

	<i>S. littoralis</i> - SPODLI) Noctuidae- 1NOCTF, <i>Acrolepia</i> <i>assectella</i> - ACROAS, Αγρότιδα (Κοφτοσκούληκα) (<i>Agrotis segetum</i> - AGROSE), <i>Depressaria</i> <i>erinaceella</i> - DEPRER, <i>Evergestis</i> <i>forficalis</i> - EVERFO), Τούτα (<i>Tuta absoluta</i> - GNORAB), Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> - PYRUNU), Πλούζια (<i>Plusia sp.</i> - PLUSSP, <i>Phytometra</i> <i>gamma</i> - PYTOGA, <i>Trichoplusia ni</i> - TRIPNI), <i>Vanessa cardui</i> - VANSCA					
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) <u>Κολοκυνθοειδή</u> - Αγγούρι CUMSA - Κολοκύθι CUUPE - Πεπόνι CUMME <u>Φυλλώδη</u> <u>λαχανικά:</u> - Σκαρόλα CICEN - Μαρούλι LACSA - Σέσκουλο BEAVF - Σπανάκι SPQOL <u>Λαχανικά με</u> <u>στέλεχος:</u>	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis</i> <i>armigera</i> - HELIAR) Μαμέστρα (<i>Mamestra</i> <i>oleracea</i> - POLIOL, <i>M. brassicae</i> - BARABR, Πλουτέλλα (<i>Plutella sp</i> - PLUTSP), <i>Plutella xylostella</i> - PLUTMA, <i>Plutella</i> <i>maculipennis</i> - PLUTMA) Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i> - PIERBR, <i>Pieris rapae</i> - PIERRA) Σποντόπτερα	100	75-100	75-100	Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) και ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση (BBCH 11-89).	1-8 εφαρμογές (1 – 3 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες

- Αγκινάρα CYUCA - Πράσο ALLAM	(<i>Spodoptera exigua</i>- LAPHEG, <i>Spodoptera sp.</i>- SPODSP <i>S. littoralis</i>- SPODLI) Noctuidae- 1NOCTF, <i>Acrolepia assectella</i>- ACROAS, Αγρότιδα (Κοφτοσκούληκα) (<i>Agrotis segetum</i>- AGROSE), <i>Depressaria erinaceella</i>- DEPRER, <i>Evergestis forficalis</i>- EVERFO), Τούτα (<i>Tuta absoluta</i>- GNORAB), Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i>- PYRUNU), Πλούζια (<i>Plusia sp.</i>- PLUSSP, <i>Phytometra gamma</i>- PYTOGA, <i>Trichoplusia ni</i>- TRIPNI), <i>Vanessa cardui</i>- VANSKA					
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ) Σολανώδη: - Τομάτες LYPES - Μελιτζάνες SOLME - Πιπεριές CPSAN Κολοκυνθοειδή - Αγγούρι CUMSA - Κολοκύθι CUUPE Φασόλια PHSVX	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>- HELIAR) <i>Heliothis sp.</i> Μαμέστρα (<i>Mamestra oleracea</i>- POLIOL, <i>M. brassicae</i>- BARABR), Πλουτέλλα (<i>Plutella sp.</i>- PLUTSP, <i>Plutella xylostella</i>- PLUTMA, <i>Plutella maculipennis</i>- PLUTMA) Πιερίδα	100	50-100	50-100	Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) και ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση (BBCH 11-89).	1-8 εφαρμογές (1 – 3 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

(<i>Pieris brassicae</i>- PIERBR, <i>Pieris rapae</i>- PIERRA) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> <i>exigua</i>- LAPHEG, <i>Spodoptera sp.</i>- SPODSP <i>S. littoralis</i>- SPODLI), Noctuidae- 1NOCTF, <i>Acrolepia</i> <i>assectella</i>- ACROAS, Αγρότιδα (Κοφτοσκούληκα) (<i>Agrotis segetum</i>- AGROSE), <i>Depressaria</i> <i>erinaceella</i>- DEPRER, <i>Evergestis</i> <i>forficalis</i>- EVERFO, Τούτα (<i>Tuta absoluta</i>- GNORAB), Πλούζια (<i>Plusia sp.</i>- PLUSSP <i>Plusia</i> <i>calchites</i>, <i>Phytometra</i> <i>gamma</i>- PYTOGA, <i>Trichoplusia ni</i>- TRIPNI), <i>Vanessa cardui</i>- VANSCA <i>Ostrinia</i> <i>furnacalis</i>- PYRUNU					
---	--	--	--	--	--

Βαμβάκι GOSSS	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Πράσινο Σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) HELIAR Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i>) PECTGO	30-50	50-80	15-40	Εφαρμογές σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Αν δεν υπάρχουν συστήνεται οι εφαρμογές να ξεκινούν με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1). Εφαρμογές ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου έως το άνοιγμα του 90% των καψών (BBCH 11-89).	1-10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Καλαμπόκι ZEAMX	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>) PYRUNU Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) HELIAR Σεζάμια (<i>Sesamia cretica</i> , SESACR <i>Sesamia nonagroides</i>) SESANO	40-50	50-100	20-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) κάθε γενιάς και ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 11-89).	1-6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Καπνός NIOTA	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) HELIAR	30-50	50-150	15-75	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) κάθε γενιάς και ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου μέχρι πριν την ωρίμανση των πρώτων φύλλων (BBCH 11-89).	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 - 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Ρύζι ORYSA	Προνύμφες λεπιδοπτέρων: Σκώρος ρυζιού <i>Mythimna unipuncta</i> - PSEDUN, Σποντόπτερα (<i>Spodoptera sp.</i> - SPODSP)	200	40-50	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) και ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη του πρώτου φύλλου έως την ωρίμανση των σπόρων (BBCH 11-89).	1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Θ) - Γαρυφαλιά, DINCA - Γεράνια, PELSS - Ζέρμπες, GEBSS - Ιβίσκοι HIBSS - Τριανταφυλλιά ROSSS	Προνύμφες Λεπιδοπτέρων: Πράσινο σκουλήκι <i>(Heliothis armigera</i> HELIAR, <i>Heliothis sp.)</i> Σποντόπτερα <i>(Spodoptera exigua</i> LAPHEG), <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Μαμέστρα <i>(Mamestra sp.</i> MAMESP)	100-200	50-100 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος όγκος του νερού για πλήρη κάλυψη των φυτών	75-100	Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών (L1) και ανάλογα με την προσβολή από την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών/σπόρων (BBCH 11-89). Η μεγαλύτερη δοσολογία εφαρμόζεται σε υψηλή πίεση προσβολής και εφόσον υπάρχουν μικτοί πληθυσμοί προνυμφών.	1-8 εφαρμογές (1 – 3 ανά γενιά), με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ - Πεύκα PIUSS - Βελανιδιά QUESS	Προνύμφες Λεπιδοπτέρων: Πιτυοκάμπη <i>(Thaumetopoea pityocampa)</i> THAUPI Λυμάντρια <i>(Lymantria dispar)</i> LYMADI Υφάντρια <i>(Hyphantria cunea)</i> HYPHCU Μαλακόσωμα <i>(Malacosoma sp.)</i> MALASP		Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος όγκος του νερού για πλήρη κάλυψη των φυτών	75-150	Ψεκάσμος τον Σεπτέμβριο Ψεκάσμος φυλλώματος τον Απρίλιο /Μάιο Ψεκάσμος φυλλώματος Μάιο /Ιούνιο	3 εφαρμογές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (2STOP)	Εφέστια <i>(Ephestia elutella)</i> EPHEEL	50			Ψεκάσμος της επιφάνειας των αποθηκών.	1 εφαρμογή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλή διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες.
2. Όταν εμφανιστούν τα μεγαλύτερα στάδια της προνύμφης, εφαρμογές με χρήση χημικών εντομοκτόνων μπορεί να είναι απαραίτητες.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Για τις βρώσιμες καλλιέργειες που προορίζονται για νωπή κατανάλωση να τηρείτε ελάχιστη περίοδο **2 ημερών** από την εφαρμογή του σκευάσματος μέχρι τη συγκομιδή. Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν απαιτείται στις βρώσιμες καλλιέργειες: αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), λάχανο, κινέζικο λάχανο, τομάτα (Υ+Θ), μελιτζάνα (Υ+Θ), πιπεριά (Υ+Θ), σκαρόλα, μαρούλι, σπανάκι, ιβίσκο (Θ) και τριανταφυλλιά (Θ).
2. Για την αποφυγή μεταφοράς σπορίων στα εδώδιμα προϊόντα, η τοποθέτησή τους στις αποθήκες να γίνεται **2 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος** στις επιφάνειες των αποθηκών.
3. Μη ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά τον ψεκασμό τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία (μικροοργανισμό) *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ABTS-351, η οποία ανήκει στην ομάδα 11Α κατά IRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Να μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό..

Περιέχει τον μικροβιακό παράγοντα *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ABTS-351. Οι μικροοργανισμοί μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, σταγονίδια, εκνεφώματα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μάσκα με φίλτρο και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν ανοσοανεπάρκεια ή διατελούν υπό θεραπεία με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο:

P305+P351+P338+P305+P337+P313: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν το άτομο δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μέχρι 25°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για **δύο (2) χρόνια**.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

Β Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την αριθμ. 4471/61411/21.08.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε για πρώτη φορά με τις ενιαίες αρχές η αριθμ. 14673 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DIPEL 2X (δ.ο.: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ABTS-351), ισχύουν τα παρακάτω:

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **10.10.2025**.
2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις **10.09.2026**.
3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και **10.10.2026**.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την **10.10.2026**, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ