



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 29.05.2025
Αριθ. πρωτ.: 143175

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου
ΤΘ 100, ΤΚ 19002, Παιανία
e-mail: info@hellafarm.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14908 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT NEO (paraffin oil 96,9% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 55469/27.02.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14908 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT NEO (paraffin oil 96,9% β/β).
7. Την αριθμ. 77100/20.03.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 14908 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) SUPPORT NEO (paraffin oil 96,9% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 55469/27.02.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Αχλαδομηλιά* PYUPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis pentagona</i> PSEAPE Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Σταχτιά ψώρα <i>Epidiaspis leperii</i> EPIDBE Φυλλοδέτεες <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>A. podanus</i> CACOPO Τετράνυχτοι <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Panonychus ulmi</i> METTUL <i>Bryobia rubrioculus</i> BRYORU Ψύλλα <i>Psylla</i> spp. PSYLSP Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY <i>D. plantaginea</i> DYSAPL Ματόψειρα <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Ψευδόκοκκος* <i>Planococcus citri</i>	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

	PSECCI Ψώρες* Eriococcus lagerstroemiae ERIOLOA					
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE Σφαιρολεκάνιο <i>Sphaerolecanium</i> <i>prunastri</i> LECAPN Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> spp. APHISP Φυλλοδέτες <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>A. podanus</i> CACOPO Ακάρια <i>Tetranychus</i> spp. TETRSP <i>Panonychus ulmi</i> METTUL <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR <i>Aculus</i> spp. CULSP Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u> Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDS	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i> PSECCI Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Άσπρη ψώρα	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή) Για <i>Alerothrixus</i> <i>floccosus</i> μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή

	<i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE Παρλατόρια / Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria zizyphi</i> PARLZI Άλλα κοκκοειδή <i>Chrysomphalus</i> <i>dictyospermi</i> CHRYDI <i>Pericerya purchase</i> ICERPU <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU <i>C. sinensis</i> CERPSI <i>Mytilococcus beckii</i> LEPSBE <i>Coccus hesperidum</i> COCCHE Τετράνυχτοι <i>Panonychus citri</i> METTCI <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Eriophyes sheldoni</i> ACEISH <i>Aculus pelekassi</i> ACULPE Αλευρώδεις <i>Dialeurodes citri</i> DIALCI <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL Αφίδες					εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα
Αμπέλι VITVI	Χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου <i>Panonychus ulmi</i> METTUL Κοκκοειδή <i>Parthelonecanium corni</i> LECACO <i>Melanaspis vitis</i> MELAVI <u>Χρήσεις Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> <i>Pulvinaria vitis*</i> PULVVI Ερίνωση* <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI Κίτρινος Τετράνυχος* <i>Tetranychus urticae</i>	1080	1800	60	Χειμερινά στάδια της καλλιέργειας BBCH 00-11	1

	TETRUR Μετκάλφα* <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Θρίπες* <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU					
Αμυγδαλιά* PRNDU Χρήση ήσσονος σημασίας	Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπης <i>Pseudalacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE <i>Planococcus</i> <i>/Pseudococcus citri</i> PSECCI <i>Diaspis</i> DIASSP Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU Ψώρες <i>Sphaerolecanium</i> <i>prunastri</i> LECAPN <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Παραμορφωτικό άκαρι	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Aceria sheldoni</i> ACEISH Ακάρεα <i>Aculus pelekassi</i> ACULPE <i>Bryobia rubrioculus</i> BRYORU Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Φυλλοδέτες <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO					
Φουντουκιά* CYLAV Χρήση ήσσονος σημασίας	Βαμβακάδα <i>Diaspis</i> DIASSP Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Ακάρεα <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Φιστικιά* PIAVE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Ψώρες <i>Parthenolecanium pruinosum</i> LECAPI <i>Parthenolecanium corni</i> LECACO <i>Coccus hesperidum</i> COCHE Ψύλλα <i>Agonoscena pistaciae</i> AGONPI Ψώρες <i>Lepidosaphes pistaciae</i> LEPSPI Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Anapulvinaria pistaciae</i> PULVPI <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN					
Καρυδιά* IUGRE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> METTUL Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Ψώρα <i>Quadraspidiotus juglansregiae</i> QUADJU Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Ακάρεα <i>Eriophyes tristatus</i> ACEITR	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Καστανιά* CSNSA Χρήση ήσσονος σημασίας	Καρπόκαψα <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL <i>Curculio elephas</i> CURCEL	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Παρλατόρια* <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Λεκάνιο* <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Πολλίνια* <i>Pollinia pollini</i> POLNPO Άσπρη ψώρα* <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE Μυτιλόμορφη ψώρα* <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Ψώρες* <i>Leucaspis riccae</i> LEUARI <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> CHRYDI Ακάρεα* <i>Eriophyes oleae</i> ACEIOL <i>Tegolophus hassani</i> TEGLSP	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Oxycenus maxwelli</i> OXYNMA <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Βαμβακάδα* <i>Euphyllura olivina</i> EUPHOL					
Ροδιά* PUNGR Χρήση ήσσονος σημασίας	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος τετράνυχος <i>Tenuipalpus punicae</i> TENUPU Ακάρεα <i>Eriophyes grannati</i> ACEIGA Κοκκοειδή <i>Planococcus citri</i> PSECCI Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Κηροπλάστης <i>Ceroplastes sinensis</i> CERPSI <i>Lorryia formosa</i> LORRFO Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>A. fabae</i> APHIFA <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπες <i>Thrips sp.</i> THRISP	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

Συκιά* FIUCA Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU Ψευδόκοκκος <i>Planococcus ficus</i> PLANFI Λογχαία ή Μαύρη μύγα των σύκων <i>Carpolonchaea aristella</i> CAROAR Ψύλλα της συκιάς <i>Homotoma ficus</i> HOMTFI	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ακτινιδιά* ATIDE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπιν <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU <i>Hemiberlesia lataniae</i> HEBELA Μετκάλφα <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Βαμβακάδα <i>Euphyllura</i> sp. EUPHSP	500	1000	50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
Μαστίχα Χίου* PIALE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κοκκοειδή Coccidae 1COCCF Λεπιδόπτερα Αφίδες <i>Aploneura</i> sp. APLNSP Ημίπτερα <i>Agonosceana</i> sp. AGONSP	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Sinoxylon sexdentatum</i> SINOSX					
Αβοκάντο* PEBAM Χρήση ήσσονος σημασίας	Τετράνυχτοι Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Ψευδόκοκκοι Αφίδες Θρίπες Θρίπας των θερμοκηπίων <i>Heliothrips</i> <i>haemorrhoidalis</i> HELTHA	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ιπποφαές* HIORH Χρήση ήσσονος σημασίας	Αφίδες Ακάρεα Λεπιδόπτερα <i>Eupithecia innotata</i> EUPIIN <i>Euproctis chrysorrhoea</i> EUPRCH <i>Cosmia trapezina</i> CALYTR <i>Saturnia pavonia</i> EUDIPA <i>Erannis defoliaria</i> HIBEDE <i>Coleophora</i> sp. COLESP	1000-3.000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.
2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ελιάς, ροδιάς, συκιάς, ακτινιδιάς, μαστίχας Χίου, αβοκάντο και ιπποφαούς καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

Να αποφεύγεται η παρουσία προσώπων που δεν είναι απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του πιθανούς τρόπους ανάφλεξης (κάπνισμα, δημιουργία σπινθήρων - φλόγας) στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος). Μην έρχεστε σε άμεση επαφή με το χυμένο προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα:

- 15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές στις δενδρώδεις καλλιέργειες πλην των εσπεριδοειδών.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε πρώιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
- 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 20% σε όψιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
- 15 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε πρώιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, **αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ελιάς, ροδιάς, συκιάς, ακτινιδιάς, μαστίχας Χίου, αβοκάντο και ιπποφαούς.**
- 5 μέτρων ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % σε όψιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, **αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ελιάς, ροδιάς, συκιάς, ακτινιδιάς, μαστίχας Χίου, αβοκάντο και ιπποφαούς.**

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση / όταν οι μέλισσες είναι ενεργές / όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Αχλαδομηλιά (0130020) , Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002), Κερασιά (0140020), Δαμασκηνιά (0140040), Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Φράπα (0110010-002), Αμπέλι (επιτραπέζιες-0151010 και οινοποιήσιμες-0151020 ποικιλίες), Αμυγδαλιά (0120010), Φουντουκιά (0120060), Φιστικιά (0120100),	Δεν ορίζεται

Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040), Ελιές επιτραπέζιες (0161030), Ελιές ελαιοποιήσιμες (0402010), Ροδιά (0163050), Συκιά (0161020), Ακτινιδιά(0162010), Μαστίχα Χίου (0830000), Αβοκάντο (0163010), Ιπποφαές (0154010-018)	
--	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 55469/27.02.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ