



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.06.2025
Αριθ. πρωτ.: 174521

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΠΡΟΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕΒΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 1500
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@profarm.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14918 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) CITROLIUM B (paraffin oil 96,9% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 107944/24.04.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14918 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) CITROLIUM B (paraffin oil 96,9% β/β).
- Την αριθμ. 112222/30.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθμ. 14918 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) CITROLIUM B (paraffin oil 96,9% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 107944/24.04.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά MABSD Αχλαδιά ΡΥΥCO Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Αχλαδομηλιά* ΡΥΥPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis pentagona</i> PSEAPE Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Σταχτιά ψώρα <i>Epidiaspis leperii</i> EPIDBE Φυλλοδέτες <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>A. podanus</i> CACOPO Τετράνυχοι <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Panonychus ulmi</i> METTUL <i>Bryobia rubrioculus</i> BRYORU Ψύλλα <i>Psylla</i> spp. PSYLSP Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis pyri</i> DYSAPY <i>D. plantaginea</i> DYSAPL Ματόψειρα <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Ψευδόκοκκος* <i>Planococcus citri</i>	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)

	PSECCI Ψώρες* <i>Eriococcus</i> <i>lagerstroemiae</i> ERIOILA					
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</u> Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ <i>Quadraspidiotus</i> <i>perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα <i>Pseudalacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE Σφαιρολεκάνιο <i>Sphaerolecanium</i> <i>prunastri</i> LECAPN Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> spp. APHISP Φυλλοδέτες <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>A. podanus</i> CACOPO Ακάρεα <i>Tetranychus</i> spp. TETRSP <i>Ranonychus ulmi</i> METTUL <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR <i>Aculus</i> spp. CULSP Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή)
<u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u> Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSI	Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i> PSECCI Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Άσπρη ψώρα	1000-3000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή) Για <u><i>Aleurothrixus floccosus</i></u> μπορεί να γίνει και μία ακόμα

	<i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE Παρλατόρια / Μαύρη ψώρα <i>Parlatoria zizyphi</i> PARLZI Άλλα κοκκοειδή <i>Chrysomphalus</i> <i>dictyospermi</i> CHRYDI <i>Pericerya purchase</i> ICERPU <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU <i>C. sinensis</i> CERPSI <i>Mytilococcus beckii</i> LEPSBE <i>Coccus hesperidum</i> COCCHE Τετράνυχοι <i>Panonychus citri</i> METTCI <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Eriophyes sheldoni</i> ACEISH <i>Aculus pelekassi</i> ACULPE Αλευρώδεις <i>Dialeurodes citri</i> DIALCI <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL Αφίδες					φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα
Αμπέλι VITVI	Χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου <i>Panonychus ulmi</i> METTUL Κοκκοειδή <i>Parthelonecanium corni</i> LECACO <i>Melanaspis vitis</i> MELAVI Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: <i>Pulvinaria vitis</i> * PULVVI Ερίωση* <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI Κίτρινος Τετράνυχος* <i>Tetranychus urticae</i>	1080	1800	60	Χειμερινά στάδια της καλλιέργειας BBCH 00-11	1

	<p>TETRUR Μετκάλφα* <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Θρίπες* <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU</p>					
<p>Αμυγδαλιά* PRNDU Χρήση ήσσονος σημασίας</p>	<p>Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Βαμβακάδα ή Διάσπικ <i>Pseudalacaspis pentagona</i> PSEAPE <i>Planococcus /Pseudococcus citri</i> PSECCI <i>Diaspis</i> DIASSP Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Παρλατόρια <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Μυτιλόμορφη ψώρα <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Κόκκινη ψώρα <i>Aonidiella aurantii</i> AONDAU Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU Ψώρες <i>Sphaerolecanium prunastri</i> LECAPN <i>Eulecanium persicae</i> LECAPE <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Παραμορφωτικό άκαρι</p>	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Aceria sheldoni</i> ACEISH Ακάρεα <i>Aculus pelekassi</i> ACULPE <i>Bryobia rubrioculus</i> BRYORU Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Φυλλοδέτες <i>Archips rosanus</i> CACORO <i>Archips podanus</i> CACOPO					
Φουντουκιά* CYLAV Χρήση ήσσονος σημασίας	Βαμβακάδα <i>Diaspis</i> DIASSP Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL Ακάρεα <i>Bryobia praetiosa</i> BRYOPR	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Φιστικιά* PIAVE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Ψώρες <i>Parthenolecanium pruinatum</i> LECAPI <i>Parthenolecanium corni</i> LECACO <i>Coccus hesperidum</i> COCCHE Ψύλλα <i>Agonoscena pistaciae</i> AGONPI Ψώρες <i>Lepidosaphes pistaciae</i> LEPSPI Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Anapulvinaria pistaciae</i> PULVPI <i>Melanaspis inopinata</i> MELAIN					
Καρυδιά* IUGRE Χρήση ήσσονος σημασίας	Κόκκινος τετράνυχος <i>Ranonychus ulmi</i> METTUL Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Ψώρα <i>Quadraspidiotus juglansregiae</i> QUADJU Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE Ακάρεα <i>Eriophyes tristatus</i> ACEITR	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Καστανιά* CSNSA Χρήση ήσσονος σημασίας	Καρπόκαψα <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL <i>Curculio elephas</i> CURCEL	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ελιά OLVEU	Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Παρλατόρια* <i>Parlatoria oleae</i> PARLOL Λεκάνιο* <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Πολλίνια* <i>Pollinia pollini</i> POLNPO Άσπρη ψώρα* <i>Aspidiotus nerii</i> ASPDNE Μυτιλόμορφη ψώρα* <i>Lepidosaphes ulmi</i> LEPSUL Ψώρες* <i>Leucaspis riccae</i> LEUARI <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> CHRYDI Ακάρεα* <i>Eriophyes oleae</i> ACEIOL <i>Tegolophus hassani</i> TEGLSP	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Oxycenus maxwelli</i> OXYNMA <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR Βαμβακάδα* <i>Euphyllura olivina</i> EUPHOL					
Ροδιά* PUNGR Χρήση ήσσονος σημασίας	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR Κόκκινος τετράνυχος <i>Tenuipalpus punicae</i> TENUPU Ακάρεα <i>Eriophyes grannati</i> ACEIGA Κοκκοειδή <i>Planococcus citri</i> PSECCI Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Κηροπλάστης <i>Ceroplastes sinensis</i> CERPSI <i>Lorryia formosa</i> LORRFO Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>A. fabae</i> APHIFA <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA Θρίπες <i>Thrips sp.</i> THRISP	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

<p>Συκιά* FIUCA</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας</p>	<p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL</p> <p>Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU</p> <p>Ψευδόκοκκος <i>Planococcus ficus</i> PLANFI</p> <p>Λογχαία ή Μαύρη μύγα των σύκων <i>Carpolonchaea aristella</i> CAROAR</p> <p>Ψύλλα της συκιάς <i>Homotoma ficus</i> HOMTFI</p>	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
<p>Ακτινιδιά* ATIDE</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας</p>	<p>Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR</p> <p>Κόκκινος Τετράνυχος <i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL</p> <p>Ψώρα Σαν Ζοζέ <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> QUADPE</p> <p>Βαμβακάδα ή Διάσπικ <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE</p> <p>Κηροπλάστης <i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU</p> <p><i>Hemiberlesia lataniae</i> HEBELA</p> <p>Μετκάλφα <i>Metcalfa pruinosa</i> METFPR</p> <p>Βαμβακάδα <i>Euphyllura</i> sp. EUPHSP</p>	500	1000	50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	1
<p>Μαστίχα Χίου* PIALE</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας</p>	<p>Κοκκοειδή Coccidae 1COCCF</p> <p>Λεπιδόπτερα Αφίδες <i>Aploneura</i> sp. APLNSP</p> <p>Ημίπτερα <i>Agonosцена</i> sp. AGONSP</p>	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες

	<i>Sinoxylon sexdentatum</i> SINOSX					
Αβοκάντο* PEBAM Χρήση ήσσονος σημασίας	Τετράνυχτοι Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA Ψευδόκοκκοι Αφίδες Θρίπες Θρίπας των θερμοκηπίων <i>Heliothrips</i> <i>haemorrhoidalis</i> HELTHA	1000-3000	1000-2000	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής, πριν την άνθηση	2/60 ημέρες
Ιπποφαές* HIORH Χρήση ήσσονος σημασίας	Αφίδες Ακάρεα Λεπιδόπτερα <i>Eurpithecia innotata</i> EUPIIN <i>Euproctis chrysorrhoea</i> EUPRCH <i>Cosmia trapezina</i> CALYTR <i>Saturnia pavonia</i> EUDIPA <i>Erannis defoliaria</i> HIBEDE <i>Coleophora</i> sp. COLESP	1000-3.000	1000-2000	100-150	Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.	2/60 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.
2. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ελιάς, ροδιάς, συκιάς, ακτινιδιάς, μαστίχας Χίου, αβοκάντο και ιπποφαούς καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

Να αποφεύγεται η παρουσία προσώπων που δεν είναι απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του πιθανούς τρόπους ανάφλεξης (κάπνισμα, δημιουργία σπινθήρων - φλόγας) στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος). Μην έρχεστε σε άμεση επαφή με το χυμένο προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα:

- 15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές στις δενδρώδεις καλλιέργειες πλην των εσπεριδοειδών.

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε πρώιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
- 10 μέτρων ή 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 20% σε όψιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών.
- 15 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε πρώιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, **αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ελιάς, ροδιάς, συκιάς, ακτινιδιάς, μαστίχας Χίου, αβοκάντο και ιπποφαούς.**
- 5 μέτρων ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % σε όψιμες εφαρμογές στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, **αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ελιάς, ροδιάς, συκιάς, ακτινιδιάς, μαστίχας Χίου, αβοκάντο και ιπποφαούς.**

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση / όταν οι μέλισσες είναι ενεργές / όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Αχλαδομηλιά (0130020) , Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002), Κερασιά (0140020), Δαμασκηνιά (0140040), Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Φράπα (0110010-002), Αμπέλι (επιτραπέζιες-0151010 και οινοποιήσιμες-0151020 ποικιλίες), Αμυγδαλιά (0120010) ,	Μη εφαρμόσιμο

Φουντουκιά (0120060), Φιστικιά (0120100), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040), Ελιές επιτραπέζιες (0161030), Ελιές ελαιοποιήσιμες (0402010), Ροδιά (0163050), Συκιά (0161020), Ακτινιδιά(0162010), Μαστίχα Χίου (0830000), Αβοκάντο (0163010), Ιπποφάεξ (0154010-018)	
--	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 107944/24.04.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ