



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.07.2025
Αριθ. πρωτ.: 185841

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας
(Δια της BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.)
e-mail: info@biogard.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14921 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEPINOX WG (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain EG 2348 37,5% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 154777/11.06.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14921 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEPINOX WG (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain EG 2348 37,5% β/β).

7. Την αριθμ. 160192/16.06.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Διευρύνουμε την αριθμ. 14921 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEPINOX WG (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain EG 2348 37,5% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 154777/11.06.2025, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γρ./ στρ	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Δαμασκηλιά PRNDO Κερασιά* PRNAV Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) VITVI	Κογχυλίδα <i>Eupoecilia ambiguella</i> CLYSAM Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO Πυραλίδα <i>Cryptoblabes gnidiella</i> CRYBGN	75-100	--	10-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Λυκίσκος HUMLU	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Καπνός NIOTA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος. BBCH 11-89	10/5

Λάχανο (Υ+Θ) BRSOL, BRSSS	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου τμήματος. BBCH 11-89	10/5
<u>Κεφαλωτές κράμβες:</u> Λαχανάκια Βρυξελλών (Υ+Θ) BRSOF <u>Φυλλώδεις κράμβες:</u> Κινέζικα λάχανα (Υ+Θ) BRSPK Λάχανο Σγουρό/ Λαχανίδα BRSOA <u>Ανθοκράμβες:</u> Μπρόκολο (Υ+Θ) BRSOK Κουνουπίδι (Υ+Θ) BRSOB <u>Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά (εκτός ζαχαρότευτλων):</u> Γογγυλοκράμβες BRSOG Γογγύλια BRSRR	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου τμήματος. BBCH 11-89	10/5
<u>Φυλλώδεις κράμβες και βότανα</u> 3LFBC, 3HERC Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος. BBCH 11-89	10/5
Ραδίκι (Υ+Θ) CICIN Αντίδι (Υ+Θ) CICEN Ραντίσιο (Υ+Θ) CICIF Εσκαρόλ (Υ+Θ) CICEL Ρόκα (Υ+Θ) ERUVE	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος. BBCH 11-89	10/5

Λυκοτρίβολο (Υ+Θ) VLLLO Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες LEPSA Γαιοκάρδαμο BARVE Σινάπι Κόκκινο BRSJU						
Σπανάκι (Υ+Θ) SPQOL Σέσκουλο (Υ+Θ) BEAVV Φύλλα τεύτλων (Υ+Θ) BEAVF	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος. BBCH 11-89	10/5
Αγκινάρα CYUSC Άγρια αγκινάρα CYUCA	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος. BBCH 11-89	10/5
Σέλινο APUGV Μάραθο FOEVU	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος. BBCH 11-89	10/5
Μαϊντανός PARCR Σχοινόπρασο ALLSC Βασιλικός OCIBA	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση του συγκομιζόμενου φυλλώματος. BBCH 11-89	10/5
Ψυχανθή (με και χωρίς λοβό) (Υ+Θ): Φασόλια PHSVX	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών/	10/5

					σπόρων. BBCH 11-89	
Ψυχανθή (με και χωρίς λοβό) (Υ+Θ): Μπιζέλια PIBSX Ρεβίθια CIEAR Αμπελοφάσουλα VIGSI Φακές LENCU	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-100	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών/σπόρων. BBCH 11-89	10/5
Κολοκυνθοειδή (μη βρώσιμος φλοιός) (Υ+Θ): Καρπούζι CITLA Πεπόνι CUMME Κολοκύθα CUUMA Κολοκύθι CUUPE	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Κολοκυνθοειδή (βρώσιμος φλοιός) (Υ+Θ): Κολοκυθάκια CUUPG Αγγούρι CUMSA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Σολανώδη (Υ+Θ): Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Τομάτα (Θ) LYPES	Φυλλοδέτης (Τούτα) <i>Tuta absoluta</i> GNORAB	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Αμυγδαλιά PRNDU	Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση	10/5

					των καρπών. BBCH 11-89	
Ελιά (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) OLVEU	Πυρηνοτρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL Μαργαρόνια <i>Palpita vitrealis</i> PALPUN	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Εσπεριδοειδή: 3CITC Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Κιτριά CIDME	Ανθοτρήτης <i>Prays citri</i> PRAYCI	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Καλαμπόκι ZEAMX Γλυκό καλαμπόκι ZEAMS	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών/ σπόρων. BBCH 11-89	10/5
Ακτινιδιά* ATIDE Χρήση ήσσοнос σημασίας	Προνύμφες λεπιδοπτέρων <i>Argyrotaenia</i> <i>Ijungiana</i> ARGTPU <i>Amphipyra pyramidea</i> AMPYPY	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Φράουλα (Υ+Θ)* FRAAN Χρήση ήσσοнос σημασίας	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> <i>frugiperda</i> LAPHFR	75-100	--	30-150	Από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων έως και την ωρίμανση των καρπών. BBCH 11-89	10/5
Παρατηρήσεις: 1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες στα πρώτα στάδια της εκκόλαψης και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες. 2. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.						

3. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
4. Να μη χρησιμοποιείτε νερό για ψεκασμό με pH άνω του 8, αλλιώς να χρησιμοποιείτε παράγοντα οξίνισης. Για διασφάλιση της διάρκειας δράσης συνιστάται η χρήση κατάλληλου προσκολλητικού.
5. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.
6. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να συνδυάζεται με τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού.
7. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή Σταφίδα και Σουλτανίνα, καθώς και στις ποικιλίες ελιάς, Κορωνέικη και Καλαμών. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κερασιάς, ακτινιδιάς και φράουλας (Υ+Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Δαμασκηλιά (0140040), Αμπέλι (0151010,0151020), Λυκίσκος (0700000), Καπνός, Λάχανο (0242020), Λαχανάκια Βρυξελλών (0242010), Κινέζικο λάχανο (0243010), Λάχανο Σγουρό/ Λαχανίδα (0243020-001), Κουνουπίδι (0241020), Μπρόκολο (0241010), Γογγύλια (0213110), Γογγυλοκράμβες (0244000), Μαρούλι (0251020), Ραδίκι (0255000), Αντίδι (0251030), Ραντίσιο (0255000), Εσκαρόλ (0251030-001), Ρόκα (0251060), Λυκοτρίβολο (0251010), Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες (0251040), Γαιοκάρδαμο (0251050), Κόκκινο σινάπι (0251070), Σπανάκι (0252010), Φύλλα τεύτλων (0252030), Σέσκουλα (0252030-002), Αγκινάρα (0270050), Άγρια αγκινάρα (0270020), Σέλινο-Μάραθος (0256030), Μαϊντανός (0256040), Σχοινοπράσο (0256020), Βασιλικός (0256080), Ρεβίθι (0260030-003), Φακές (0300020), Φασόλια (0300010), Μπιζέλια (0260030, 0260040), Αμπελοφάσουλα (0260010-002), Κολοκύθι (0232030), Πεπόνι (0233010), Καρπούζι (0233030), Κολοκύθα (0233020), Κολοκυθάκια (0232030), Αγγούρι (0232010), Τομάτα (0231010), Μελιτζάνα (0231030), Πιπεριά (0231020), Αμυγδαλιά (0120010), Ελιά (0161030, 0402010), Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Κιτρολέμονο (0110030-002), Καλαμπόκι (0500030), Γλυκό καλαμπόκι (0234000) Κερασιά (0140020), Ακτινιδιά (0162010), Φράουλα (0152000)	-

- II. Διάθεση αποθεμάτων
1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
 2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
 3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 154777/11.06.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ