



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30-05-25
Αριθ. Πρωτ.: 144049

Ταχ. Δ/ση :Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ.Γάσπαρη
Τηλέφωνο :210 – 928 7250
e-mail : mgaspari@minagric.gr

ΠΡΟΣ: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH
Γερμανίας (δια του υπεύθυνου
επικοινωνίας Κ&Ν Ευθυμιάδης)
ΑΒΕΕ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΤΚ 57022
l.vellis@efthymiadis.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1902 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) MOSPILAN 20 SP (δ.ο. acetamiprid) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 91/14.06.2024).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2025/158 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2025, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας **acetamiprid** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 119500/22-6-2006 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 1902 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MOSPILAN 20 SP (δ.ο. acetamiprid) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις από 14-4-2025 και 19-5-2025 εισηγήσεις της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 49240/20-2-2025 αίτηση και τα από 24-3-2025, 4-4-2025, 9-5-2025, 12-5-2025 και 26-5-2025 συμπληρωματικά στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **1902** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνου) **MOSPILAN 20 SP (δ.ο. acetamiprid)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.

119500/22-6-2006 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το **φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.**

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		γρ./ στρ.	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (CIDSS) (Φυτώρια) Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE), Λεμονιά (CIDLI)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Aphis spiraecola</i> APHISΙ, <i>Toxoptera aurantii</i> TOXOAU)	15-25	25	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
	Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i> PHYNCL)	15-25	25	60-100	Ψεκασμοί κυρίως στην νέα βλάστηση το καλοκαίρι με την έναρξη της προσβολής	
Εσπεριδοειδή (CIDSS): Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE), Λεμονιά (CIDLI), Γκρεϊπ φρουτ (CIDPA), Κιτριά (CIDME)	Αφίδες (APHISP)	50	25	200	Με την έναρξη της προσβολής νωρίς την άνοιξη κατά την περίοδο από τη διόγκωση των οφθαλμών έως την πτώση των πετάλων.	1 εφαρμογή
Μηλοειδή Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO)	Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL, <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Aphis spiraecola</i> APHISΙ) Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera malifoliella</i> LEUCSC, <i>Phyllonorycter blancardella</i> LITHBL)	25	25	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες

Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά (PRNPS), Νεκταρινιά (PRNPN)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> <i>MYZUPE</i> , <i>Aphis</i> <i>romi</i> <i>APHIPO</i> , <i>Aphis spiraeicola</i> <i>APHISI</i> , <i>Myzus</i> <i>cerasi</i> <i>MYZUCE</i>), Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera</i> <i>malifoliella</i> <i>LEUCSC</i> , <i>Phyllonorycter</i> <i>blancardella</i> <i>LITHBL</i>)	25	25	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	1 εφαρμογή
Κερασιά (PRNAV)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> <i>MYZUPE</i> , <i>Aphis</i> <i>romi</i> <i>APHIPO</i> , <i>Aphis spiraeicola</i> <i>APHISI</i> , <i>Myzus</i> <i>cerasi</i> <i>MYZUCE</i>), Φυλλορύκτες (<i>Leucoptera</i> <i>malifoliella</i> <i>LEUCSC</i> , <i>Phyllonorycter</i> <i>blancardella</i> <i>LITHBL</i>)	25-37,5	25	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Δαμασκηινιά (PRNDO)	Αφίδες (APHISP, MYZUPE), Φυλλορύκτες (LEUCSP, LITHSP, PRYCML)	25	25	100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Τομάτες (LYPES), Πιπεριές (CPSAN), Μελιτζάνες (SOLME) (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> <i>MYZUPE</i> , <i>Aphis</i> <i>gossypii</i> <i>APHIGO</i>)	25	-	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Τομάτες (LYPES) (Θ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> <i>MYZUPE</i>, <i>Aphis</i> <i>gossypii</i> <i>APHIGO</i>)	25	-	100-170	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες

Μελιτζάνες (SOLME) (Θ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Aphis</i> <i>gossypii</i> APHIGO),	25	-	100-170	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> BEMITA, <i>Trialeurodes</i> <i>vapourariorum</i> TRIAVA)	35-40				
Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός): Πεπόνι (CUMME) (Υ)	Αφίδες (APHISP, APHIGO, MYZUPE)	12,5-15	-	50-60	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. (BBCH 51-87)	2 εφαρμογές ανά 25 ημέρες
	Αλευρώδεις (TRIAVA, BEMITA)	20-25				
Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός): Αγγούρι (CUMSA) (Θ)	Αφίδες (APHISP, APHIGO, MYZUPE)	25	-	100-170	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Βαμβάκι (GOSHI)	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> APHIGO)	20-25	-	50-80	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> BEMITA)	25-30				
Καπνός (NIOTA)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>M. nicotianae</i> MYZUNI), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> BEMITA)	25-30	-	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE)	12,5	-	40	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZUPE)	20				

Μηδική (MEDSA)	Αφίδες (<i>Aphis</i> sp. APHISP, <i>Myzus</i> sp. MYZUSP)	7,5-10	-	50	Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής.	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
Καλλωπιστικά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Macrosiphum rosae</i> MACSRO)	25	-	100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. (BBCH 40 – 89)	2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> BEMITA, <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA), Δευτερεύουσα δράση κατά του Θρίπα (<i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC)	35-40				

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
2. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της.

13**Προστασία των καταναλωτών**

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά, Μήλα, Αχλάδια, Κεράσια, Δαμάσκηνα, Βαμβάκι, Καπνός, Μηδική	14 ημέρες
Ροδάκινα, Νεκταρίνια	30 ημέρες
Τομάτες (Υ), Πυτεριές (Υ), Μελιτζάνες (Υ)	7 ημέρες

Τομάτες (Θ)	14 ημέρες
Μελιτζάνες (Θ)	3 ημέρες
Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο φλοιό): Αγγούρι (Θ)	7 ημέρες
Κολοκυνθοειδή (με μη-εδώδιμο φλοιό): Πεπόνι (Υ)	14 ημέρες
Πατάτες	7 ημέρες

Β

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. **119500/22-6-2006** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ