



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.03.2025
Αριθ. πρωτ.: 68076

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS
S.A. (AFEPASA), Ισπανίας
(Δια της MEDPEST IKE)
e-mail: kmarkakis@medpest.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθ. 61022 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SAMBA (sulphur 80% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 1613/49472/02.03.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61022 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SAMBA (sulphur 80% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 409303/30.12.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθ. 61022 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SAMBA (sulphur 80% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 1613/49472/02.03.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρ.		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά ΜΑΒSD Αχλαδιά ΡΥUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά ΕΙΟJA Αχλαδόμηλα ΡΥUPC	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE	70-100	750	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από την έναρξη της βλάστησης έως την έναρξη της άνθησης και μετά το τέλος της άνθισης (BBCH 01-60 & BBCH >69)	6/10
Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Τετράνυχος** <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP <i>Panonychus ulmi</i> METTUL	70-100	730	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από την πτώση των πετάλων (BBCH 69)	6/10
Αμπέλι ¹ VITVI (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	Ωίδιο <i>Erysiphe necator</i> UNCINE <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Τετράνυχος** <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	50-100	400-1210	Με την εμφάνιση της προσβολής, από την ανάπτυξη του 5ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των ραγών (BBCH 15-89)	8/7
Αβोकάντο PEBAM	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE	70-100	750	Εφαρμογές προληπτικά μετά το τέλος της άνθισης (BBCH 69)	6/10
Τομάτα ³ (Υ) LYPES	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	40-150	200	Εφαρμογές προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων όταν υπάρχει μικρή έως	6/10

				μέτρια πίεση προσβολής.	
Μελιτζάνα ³ (Υ) SOLME	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Τετράνυχος** <i>Tetranychus sp.</i> TETRSP	40-150	200	Εφαρμογές προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων όταν υπάρχει μικρή έως μέτρια πίεση προσβολής.	6/10
Πιπεριά ³ (Υ) CPSAN	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50-100	200	Εφαρμογές προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων όταν υπάρχει μικρή έως μέτρια πίεση προσβολής.	6/10
Ζαχαρότευτλο BEAVX Κτηνοτροφικά τεύτλα BEAVC	Ωίδιο <i>Erysiphe betae</i> ERYSBE	30	750	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από την έκπτυξη του 5ου φύλλου έως το στάδιο της πλήρους κάλυψης του εδάφους από την καλλιέργεια (BBCH 15-39)	3/10
Σιτάρι TRZSS	Ωίδιο <i>Blumeria graminis</i> ERYSGT	15-30	1000	Εφαρμογές προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	2/14
Καλλωπιστικά φυτά (Υ) ³ NNNZZ	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	45-150	300	Εφαρμογές προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων όταν υπάρχει μικρή έως μέτρια πίεση προσβολής.	5/10
Τριανταφυλλιά ³ ROSSS	Ωίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	45-150	300	Εφαρμογές προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων όταν υπάρχει μικρή έως μέτρια πίεση προσβολής.	5/10
Σμέουρα* (ερυθρά και κίτρινα) RUBID <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Ωίδιο <i>Sphaerotheca mors- uuae</i> SPHRMU Τετράνυχος <i>Tetranychus sp.</i> TETRSP	50-100	750	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	6/10
Κρεμμύδι (Υ) ALLCE	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Ωίδιο* <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50-100	600	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	6/10

Αγκινάρα* CYUCA Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. ERYSSP Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	50-100	600	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	6/10
Δαμασκηλιά* PRNDO Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> METTUL <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	70-100	730	Εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, από την πτώση των πετάλων BBCH >69	6/10
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις ήσσοнос σημασίας:</u> Ανθράκνωση* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <i>Colletotrichum acutatum</i> COLLAC <i>Colletotrichum clavatum</i> COLLC Άκαρι της ελιάς* <i>Eriophyes oleae</i> ACEIOL	70-100	730	Από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Αφού οι καρποί έχουν αποκτήσει περίπου 10% του τελικού μεγέθους. BBCH >71	6/10
Αμυγδαλιά* PRNDU Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	70-100	730	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής. Μετά το τέλος της άνθησης. BBCH >69	6/10
Φουντουκιά* CYLAV Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωίδιο <i>Phyllactinia guttata</i> PHYLGU Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP Ακάρεα της φουντουκιάς <i>Eriophyes</i> sp. ERPHSP <i>Phytoptus avellanae</i> ERPHAV	70-100	730	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής. Μετά το τέλος της άνθησης. BBCH >69	6/10
Καρυδιά* IUGRE Χρήση Ήσσοнос	Ωίδιο <i>Phyllactinia guttata</i> PHYLGU	70-100	730	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής. Μετά το τέλος της άνθησης.	6/10

Σημασίας	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP Ακάρεα της φουντουκιάς <i>Eriophyes</i> sp. ERPHSP <i>Phytoptus avellanae</i> ERPHAV			BBCH >69	
Πράσο* ALLPO Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Τετράνυχος <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP	50-100	600	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο εμφάνισης του 1^{ου} φύλλου μέχρι την έναρξη ωρίμασης των καρπών BBCH 11-81	6/10

Παρατηρήσεις:

1. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
2. Όταν η προσβολή του ωιδίου στο αμπέλι είναι μικρή να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα (400 κ.εκ. σκ./στρέμμα) ενώ όταν είναι μεγάλη να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα (1210 κ.εκ. σκ./στρέμμα).
3. Στις καλλιέργειες της τομάτας, μελιτζάνας και καλλωπιστικών, η συνιστώμενη δόση είναι αποτελεσματική μόνο όταν υπάρχει μικρή έως μέτρια πίεση προσβολής.
4. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
5. Το θειάφι δε δρα σε θερμοκρασίες μικρότερες των 15οC. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C έως 30 °C. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 30°C.
6. Στις καλλιέργειες και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθείται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
7. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.
8. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σμέουρου, στο κρεμμυδιού (Υ), αγκινάρας, **δαμασκηνιάς, ελιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, καρυδιάς και πράσου** από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του τετράνυχου στις καλλιέργειες **ροδακινιάς, βερικοκιάς, αμπελιού και μελιτζάνας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Αμπέλι	5
Σιτάρι	35
Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα	14

Μηλοειδή, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αβοκάντο, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σμέουρο, Κρεμμύδι (Υ), Αγκινάρα, Δαμασκηνιά (0140040) Ελιά (0161030, 0402010), Αμυγδαλιά (0120010), Φουντουκιά (0120060), Καρυδιά (0120110), Πράσο (0270060)	3
Καλλωπιστικά φυτά, Τριανταφυλλιά	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1613/49472/02.03.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ