



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.05.2025
Αριθ. πρωτ.: 126095

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: SIPCAM INAGRA SA, Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –
“AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61053/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΜΙΚΟΝΟΣ ΕVO 510 SL (potassium phosphonates 51% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τους κανονισμούς:
 - Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/2619 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών fosetyl (φοσετύλιο), **φωσφορικά άλατα του καλίου** και φωσφορικό δινάτριο μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 10398/288062π.ε./11.01.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61053/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΜΙΚΟΝΟΣ ΕVO 510 SL (potassium phosphonates 51% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την αριθμ. 353698/14.11.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 61053/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΜΙΚΟΝΟΣ ΕVO 510 SL (potassium phosphonates 51% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 10398/288062π.ε./11.01.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5	Φάσμα δράσης	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./10 τ.μ.	κ.εκ./ λίτρο ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού κ.εκ. /10 τ.μ.		
Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια) CIDAF Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. PHYTSP	1,5-8,75	1,5-2,5	1000-3500	Ψεκασμοί φυλλώματος μετά την έκπτυξη των βλαστών BBCH >40	2/20
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> PLASVI	0,75-2,5	1,5-2,5	500-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος από το τέλος ανάπτυξης του φυλλώματος και επανάληψη εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH >20	3/10
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική Μουσμουλιά ΕΙΟJA	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>Venturia pyrina</i> VENTPI	1,25-2,5	2,5	500-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος από το τέλος της άνθησης έως την έναρξη ωρίμανσης του καρπού BBCH 69-81	3/5

Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα) RIBNI & RIBRU Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) RIBUC Μύρτιλλα (Υ) VACAN, VACCO, VACVG Βατόμουρα (Υ) RUBFR Σμέουρα (Υ) (ερυθρά και κίτρινα) RUBID	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. PHYTSP	0,45-2,5	1,5-2,5	300-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι βλαστοί αποκτήσουν το 30% του τελικού τους μήκους έως το τέλος της άνθισης BBCH 33-69	3/10
Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ελιές) OLVEU	Κυκλοκόνιο <i>Spilocaea oleaginea</i> CYCLOL	1,2-2,5	1,5-2,5	800-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της βλάστησης έως την έναρξη χρωματισμού του καρπού BBCH 11-81	3/10 1 ψεκασμός το χειμώνα 2 ψεκασμοί την άνοιξη
Αβοκάντο PEBAM	Φυτόφθορα <i>Phytophthora cinnamomi</i> PHYTCN	0,75-3,75	1,5-2,5	500-1500	Ψεκασμοί φυλλώματος, αργά την άνοιξη – καλοκαίρι 1 ^{ος} από την έναρξη της άνθισης έως την πτώση των πετάλων BBCH 59-67 2 ^{ος} όταν ο καρπός έχει μέγεθος 10mm έως ότου αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους BBCH 71-75 3 ^{ος} όταν ο καρπός αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους έως την ωρίμανση BBCH 75-85	3/10

Πατάτα SOLTU	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	0,45-2,5	1,5-2,5	300-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των κονδύλων (η επιδερμίδα των κονδύλων δεν αποσπάται με την πίεση του αντίχειρα) BBCH 12-49	3/10
Λωτός DOSKA	Αλτερνάρια <i>Alternaria alternata</i> ALTEAL	0,45-2,5	1,5-2,5	300-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι καρποί αποκτήσουν το 60% του τελικού τους μεγέθους έως και την πλήρη ωρίμανση BBCH 76-89	3/15
Ανανάς ANHCO	Φυτόφθορα <i>Phytophthora nicotianae</i> PHYTNN <i>Phytophthora cinnamomi</i> PHYTCN	4,5-6	1,5	3000-4000	Ψεκασμοί φυλλώματος από το στάδιο των 10 φύλλων μέχρι τον πλήρη σχηματισμό του καρπού BBCH 10-79	2*/20
		-	1,5	-	1 ^η εφαρμογή με εμβάπτιση κατά τη φύτευση BBCH 00	2*
		4,5-6	1,5	3000-4000	2 ^η εφαρμογή με ψεκασμό ένα μήνα μετά τη φύτευση BBCH 05-10	
Μαρούλι (Υ) LACSA	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	0,45-2,5	1,5-2,5	300-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 12-49	3/10
Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ) /	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	0,45-2,5	1,5-2,5	300-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού	3/10

πλατύφυλλα αντίδια (Υ) CICEL Κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & φύτερες (Υ) LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Ρόκα (Υ) ERUVE Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμ- βανομένων ειδών κράμβης) (Υ) Φραγκομαϊντανός (Υ) ANRCE Σχοινόπρασο (Υ) ALLSC Φύλλα σέλινου (Υ) APUGS Μαϊντανός (Υ) PARCR Φασκόμηλο (Υ) SALOF Δενδρολίβανο (Υ) RMSOF Θυμαρί (Υ) THYVU Βασιλικός (Υ) OCIBA Δάφνη/ Δαφνόφυλλα (Υ) LURNO Δρακόντιο/ Εστραγκόν (Υ) ARTDR Χρήσεις ήσσονος σημασίας**					φύλλου έως ότου τα προς συγκομιδή φύλλα φτάσουν στο τυπικό τους μέγεθος και μορφή BBCH 12-49	
---	--	--	--	--	---	--

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προβολής.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. *Στην καλλιέργεια του ανανά δεν θα πρέπει οι εφαρμογές να ξεπερνούν τις δύο (2) συνολικά, ανά καλλιεργητική περίοδο.
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
5. **Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά.**
6. **Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.**

7. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει το περγαμόντο και τη νεραντζιά.

****** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες λυκοτρίβολο (Υ), σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ), κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & φύτες (Υ), γαιοκάρδαμο (Υ), ρόκα (Υ), κόκκινο σινάπι (Υ), καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ), φραγκομαϊντανός (Υ), σχοινόπρασο (Υ), φύλλα σέλινου (Υ), μαϊντανός (Υ), φασκόμηλο (Υ), δενδρολίβανο (Υ), θυμάρι (Υ), βασιλικός (Υ), δάφνη/ δαφνόφυλλα (Υ), δρακόντιο/ εστραγκόν (Υ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Οι κάτωθι χρήσεις δεν εγκρίνονται αλλά θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Αζάρολος (Υ) (μεσογειακά μούσμουλα) CSCAZ Καρποί κουφοξυλιάς (Υ) SAMNI	Φυτόφθορα <i>Phytophthora</i> sp. (PHYTSP)	0,45-2,5	1,5-2,5	300-1000	Ψεκασμοί φυλλώματος όταν οι βλαστοί αποκτήσουν το 30% του τελικού τους μήκους έως το τέλος της άνθισης (BBCH 33-69)	3/10
---	--	----------	---------	----------	---	------

Στο σημείο 13: Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

- Αζάρολος (Υ) (μεσογειακά μούσμουλα) (0154070), Καρποί κουφοξυλιάς (Υ) (0154080): 7 ημέρες

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Ιαπωνική Μουσμουλιά (0130050)	35
Ανανάς (0163080)	30
Λωτός (0161060)	20
Λεμονιά-Κιτριά (0110030), Λιμμετία (0110040) Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ-Φράπα (0110010), Πορτοκαλιά-Περγαμόντο-Νεραντζιά (0110020), Αμπέλι (οινοποιήσιμο - 0151020, επιτραπέζιο - 0151010), Ελιά (επιτραπέζια - 0161030, ελαιοποιήσιμη - 0402010), Μαρούλι (Υ) (0251020), Λυκοτρίβολο (Υ) (0251010), Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) (0251030), Κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & φύτες (Υ) (0251040), Γαιοκάρδαμο (Υ) (0251050), Ρόκα (Υ) (0251060), Κόκκινο σινάπι (Υ) (0251070), Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) (Υ) (0251080) Φραγκομαϊντανός (Υ) (0256010), Σχοινόπρασο (Υ) (0256020), Φύλλα σέλινου (Υ) (0256030) Μαϊντανός (Υ) (0256040), Φασκόμηλο (Υ) (0256050), Δενδρολίβανο (Υ) (0256060), Θυμάρι (Υ) (0256070), Βασιλικός (Υ) (0256080), Δάφνη/ δαφνόφυλλα (Υ) (0256090) Δρακόντιο/ εστραγκόν (Υ) (0256100), Αβοκάντο (0163010), Πατάτα (0211000)	15

Βατόμουρα (Υ) (0153010), Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ) (0153030), Μύρτιλλα (Υ) (0154010), Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, μαύρα, άσπρα) (0154030), Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) (0154040)	7
---	---

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10398/288062π.ε./11.01.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ