



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22.01.2026
Αριθ. πρωτ.: 15511

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: UPL Holdings Coöperatief U.A.
Ολλανδίας
(Δια της UPL Ελλάς Α.Ε.)
e-mail: vasilis.kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 61075 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΘΙΟΡΡΟΝ (sulphur 82,5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2461/73896/13.05.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61075 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΘΙΟΡΡΟΝ (sulphur 82,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 214125/06.08.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 61075 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΘΙΟΡΡΟΝ (sulphur 82,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2461/73896/13.05.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	Οίδιο <i>Erysiphe/ Uncinula necator</i> UNCINE	1210	1,2-6	20-100	Από το 3 ^ο φύλλο έως την έναρξη της ωρίμανσης των ραγών. BBCH 13-81	8/10
	Ερίνωση <i>Eriophyes vitis</i> ERPHVI	1930	3-5	40-60	Από τη διόγκωση των οφθαλμών έως την πράσινη κορυφή. BBCH 01-07	1
	Ακαρίωση <i>Calepitrimerus vitis</i> PHYCVI	1930	3-5	40-60	Από τη διόγκωση των οφθαλμών έως πριν την πράσινη κορυφή. BBCH 01-05	1
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>Venturia pyrina</i> VENTPI Άκαρι <i>Eriophyes sp.</i> ERPHSP	730	0,7-1,5	50-100	Από τη ρόδινη/λευκή κορυφή έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 57-85	8/7
Τριανταφυλλιά ROSSS	Οίδιο <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	730	0,7-1,5	50-100	Από τα πρώτα φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής. BBCH 16-59	8/7
Αγκινάρα* CYUSC Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Οίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Oidium cyclaminis</i> OIDICY	490	0,5-1	50-100	Από την εμφάνιση των 6 πρώτων φύλλων έως την εμφάνιση του 70% της μέγιστης φυλλικής μάζας. BBCH 16-47	8/7
Ελιά OLVEU	<u>Χρήση Ήσσοнос</u> <u>Σημασίας:</u> Άκαρι* Eriophyidae 1ERIOF	870	0,7-1,7	50-120	Όταν ο καρπός έχει περίπου το 10% του τελικού μεγέθους έως την υπερωρίμανση των καρπών. BBCH 71-92	3/7

Ελιά OLVEU	<u>Χρήση Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <i>Colletotrichum acutatum</i> COLLAC <i>Colletotrichum clavatum</i> COLLC	870	0,7-1,7	50-120	Όταν ο καρπός έχει περίπου το 10% του τελικού μεγέθους έως την υπερωρίμανση των καρπών. BBCH 71-92	3/7
Κρεμμύδι ALLCE	<u>Χρήση Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Ωίδιο* <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	730	0,7-1,5	50-100	Από την εμφάνιση των 6 πρώτων φύλλων έως να γέρνουν τα φύλλα στο 10% των φυτών. BBCH 16-47	8/7
Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS	<u>Χρήσεις Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Κλαδοσπόριο* <i>Venturia carpophila</i> (<i>Cladosporium carpophilum</i>) VENTCA Άκαρι* Tetranychidae 1TETRF	730	0,6-1,5	50-120	Από το άνοιγμα των σεπάλων (είναι ορατές οι άκρες των πετάλων) έως την πτώση όλων των φύλλων. BBCH 57-97	8/7
Κερασιά* PRNAV <i>Χρήση Ήσσονος</i> <i>Σημασίας</i>	Κλαδοσπόριο <i>Venturia carpophila</i> (<i>Cladosporium carpophilum</i>) VENTCA	730	0,6-1,5	50-120	Από το άνοιγμα των σεπάλων (είναι ορατές οι άκρες των πετάλων) έως την πτώση όλων των φύλλων. BBCH 57-97	8/7
Φασόλι PHSVX	<u>Χρήση Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Ωίδιο* <i>Erysiphe polygoni</i> ERYSBE	730	0,7-1,5	50-100	Από την εμφάνη ανάπτυξη 9 ή περισσότερων μεσογονατίων έως την ωρίμανση του 50% των λοβών. BBCH 39-85	8/7
Αμυγδαλιά* PRNDU <i>Χρήση Ήσσονος</i> <i>Σημασίας</i>	Άκαρι Tetranychidae 1TETRF	490	0,5-1	50-100	Από το άνοιγμα των σεπάλων (είναι ορατές οι άκρες των πετάλων) έως την πτώση όλων των φύλλων. BBCH 57-97	8/7

Φράουλα FRAAN	<u>Χρήση Ήσσοнос</u> <u>Σημασίας:</u> Άκαρι του κυκλάμινου* <i>Phytonemus pallidus</i> TARSPA	730	0,7-1,5	50-100	Από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. BBCH 57-87	8/10
Ρύζι ORYSA	<u>Πυρικούλάρια</u> <i>Pyricularia oryzae</i> PYRIOR	375-750	1,5-3,7	10-50	Μεταφυτρωτικά. Από το στάδιο όπου ο 2 ^{ος} κόμβος έχει απόσταση 2 εκ. από τον 1 ^ο κόμβο έως την πλήρη ανθοφορία. BBCH 32-65	3/7
Ακτινιδιά* ATIDE <i>Χρήση Ήσσοнос</i> <i>Σημασίας</i>	Τετράνουχος Tetranychidae 1TETRF	490	0,5-1	50-100	Από όταν τα πέταλα είναι ορατά έως την ωρίμανση των καρπών για συγκομιδή. BBCH 57-85	8/7
Αβοκάντο* PEBAM <i>Χρήση Ήσσοнос</i> <i>Σημασίας</i>	Φελλοποίηση καρπών <i>Sphaceloma perseae</i> SPHAPE	490	0,5-1	50-100	Από όταν οι ταξιανθίες έχουν αποκτήσει το 70% του τελικού τους μήκους έως τη συγκομιδή των καρπών. BBCH 57-79	8/7
Μελιτζάνα* SOLME <i>Χρήση Ήσσοнос</i> <i>Σημασίας</i>	Τετράνουχος Tetranychidae 1TETRF	375-750	1,5-3,7	10-50	Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 16-59	3/7
Ρεβύθι* CIEAR <i>Χρήση Ήσσοнос</i> <i>Σημασίας</i>	Τετράνουχος Tetranychidae 1TETRF	375-750	1,5-3,7	10-50	Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 16-59	3/7
Φακή* LENCU <i>Χρήση Ήσσοнос</i> <i>Σημασίας</i>	Τετράνουχος Tetranychidae 1TETRF	375-750	1,5-3,7	10-50	Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 16-59	3/7
Στέβια* SVARE <i>Χρήση Ήσσοнос</i> <i>Σημασίας</i>	Αλτερνάρια <i>Alternaria alternata</i> ALTEAL	375-750	1,5-3,7	10-50	Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 16-59	3/7

Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE	<u>Χρήση Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Ίσκα* <i>Phaeomoniella</i> <i>chlamydospora</i> PHMOCH <i>Phaeoacremonium</i> <i>aleophilum</i> TOGNMI <i>Diplodia seriata</i> anamorph of <i>Botryosphaeria</i> <i>obtusa</i> BOTSΟB	490	0,5-1	50-100	Από το άνοιγμα των σεπάλων (είναι ορατές οι άκρες των πετάλων) έως την πλήρη ανάπτυξη των καρπών. BBCH 57-79	8/7
--	--	-----	-------	--------	---	-----

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση ανά εκατόλιτρο να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής δόσης ανά στρέμμα.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
4. Οι δόσεις να εφαρμόζονται ανάλογα με την πίεση προσβολής. Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται όταν υπάρχει χαμηλή πίεση προσβολής.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο, αδιάβροχες μπότες και γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόχων να τηρείτε:

- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη, με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 40% για τις καλλιέργειες της μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς, αμυγδαλιάς και **ακτινιδιάς**.
- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για την καλλιέργεια του αμπελιού.
- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες της ελιάς, **αβοκάντο, πορτοκαλιάς και μανταρινιάς**.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2461/73896/13.05.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ