



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.06.2025
Αριθ. πρωτ.: 156194

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
e-mail: leda.zacharopoulou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 61195 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BASTRADIN (penconazole 10% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
7. Την αριθμ. 47714/19.02.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61195 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BASTRADIN (penconazole 10% β/ο).
8. Την αριθμ. 104201/17.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Διευρύνουμε την αριθμ. 61195 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) BASTRADIN (penconazole 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 47714/19.02.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 6 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB	Ωίδιο <i>Podosphaera leucotricha</i> PODOLE	50	25-50	50-140	Ψεκασμός φυλλώματος. Από το στάδιο μεγέθους καρπού έως 10 mm έως ότου ο καρπός να έχει 80% του τελικού του μεγέθους. BBCH 71-78 ** δόση σκευάσματος 0,25 λτ/HA LWA	3/12-14
Ροδακινιά ¹ PRNPS Βερικοκιά PRNAR	Ωίδιο <i>Podosphaera tridactyla</i> PODOTR <i>Podosphaera pannosa</i> SPHRPA <i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA	75	35-50	80-150	Ψεκασμός φυλλώματος. Από το στάδιο ανάπτυξης των ωοθηκών έως το στάδιο ωρίμανσης των καρπών. BBCH 71-89	2/12-14
Αμπέλι VITVI	Ωίδιο <i>Erysiphe necator</i> UNCINE	30	30	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την εμφάνιση ταξιανθίας έως το κλείσιμο του τσαμπιού BBCH 53-79	3/10-14
Αγκινάρα CYUSC	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	50	--	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του ανθικού στελέχους έως τη συγκομιδή. BBCH 51-81	2/10-12
Φράουλα FRAAN (υπαίθρου, θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Podosphaera aphanis</i> PODOAP	50	50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Έναρξη ανάπτυξης στολώνων	2/10-14

					(ορατοί, περίπου 2cm) έως τη συγκομιδή. BBCH 41-89	
Αγγούρι CUMSA Καρπούζι CITLA Πεπόνι CUMME Κολοκύθα CUUPM (υπαίθρου - θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	50	35-50	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή. BBCH 51-89	2/10-14
Κολοκυθάκι CUUPG (υπαίθρου - θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	50	35-50	50-120	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή. BBCH 51-79	2/10-14
Πιπεριά CPSAN (υπαίθρου - θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50	35-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} άνθους έως την συγκομιδή. BBCH 55-89	2/10-12
Μελιτζάνα SOLME (υπαίθρου - θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium neolycopersici</i> OIDINL	50	35-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έναρξη της άνθησης έως την συγκομιδή. BBCH 51-89	2/10-12
Τομάτα LYPES (υπαίθρου - θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium neolycopersici</i> OIDINL	50	35-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή BBCH 21-89	2/10-12
Καπνός NIOTA	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	50	--	20-100	Από την ανάπτυξη των πλάγιων βλαστών έως την συγκομιδή. BBCH 20-99	2/10-14
Σμέουρα RUBFR Βατόμουρα RUBID	Ωίδιο <i>Podosphaera aphanis</i> PODOAP	40	40	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή έως την συγκομιδή. Έως BBCH 89	1

Ανθοκομικά (υπαίθρου - θερμοκηπίου)		50	30-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου/ σπείρας/ ζεύγους φύλλων έως την ωρίμανση των σπόρων/ καρπών. BBCH 13-89	2/7-12
Τριανταφυλλιά ROSSS	<i>Sphaerotheca pannosa</i> SPHRPA <i>Phragmidium</i> sp. PHRASP					
Μπιγκόνια CMIGR	<i>Erysiphe</i> sp. ERYSSP					
Ντάλια DAHSS	<i>Sphaerotheca</i> sp. SPHRSP					
Καλεντούλα CLDOF	<i>Oidium</i> sp. OIDISP <i>Puccinia</i> sp. PUCCSP					
Χρυσάνθεμο CHYHO	<i>Puccinia horiana</i> PUCCHN					
Πελαργόνιο	<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i>					
Γαρυφαλλιά DINCA	<i>Puccinia</i> sp. PUCCSP					
Ποτεντίλα PTLER	<i>Puccinia</i> sp. PUCCSP					
Αγγελική ANKAR	<i>Oidium evonimy japon</i>					
Japanese spindle tree EUOJA	<i>Oidium</i> sp. OIDISP					
Αλθέα ALGOF	<i>Puccinia</i> sp. PUCCSP					
Καλλωπιστικά δέντρα* NNNZZ <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Ωίδιο <i>Oidium</i> sp. OIDISP	75	35-50	80-150	Ψεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο.	3
Καλλωπιστικοί θάμνοι* NNNZZ <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Ωίδιο <i>Oidium</i> sp. OIDISP	50	30-50	50-100	Ψεκασμός, την άνοιξη έως το φθινόπωρο.	2
Μπάμια (Υ)* ABMES <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50	35-50	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Από την έκπτυξη του πρώτου άνθους έως τη συγκομιδή.	2/10

BBCH 51-79

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.

* * ΗΑ LWA: 10.000 m² έκταση επιφάνειας κόμης

- Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φράουλα).

- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μπάμιας και των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία penconazole η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC.

- Στο αμπέλι, τα μηλοειδή **και τα καλλωπιστικά δέντρα** η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο, στις υπόλοιπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φράουλα, αγκινάρα, πιπεριά, **μπάμια**, τομάτα, μελιτζάνα **ανθοκομικά και καλλωπιστικούς θάμνους**) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα DMIs το 50% των συνολικών επεμβάσεων.
- Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγές μυκητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μείγματα μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Βερικοκιά (0140010), Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002), Αγκινάρα (0270050), Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010), Καπνός	14
Αμπέλι οиноποιήσιμο (0151020)	21
Φράουλες (0152000), Αγγούρι (0232010), Κολοκυθάκι (0232030), Κολοκύθα (0233020), Πεπόνι (0233010), Καρπούζι (0233030), Τομάτα (0231010), Μελιτζάνα (0231030), Πιπεριά (0231020), Σμέουρα (0153030), Βατόμουρα (0153010)	3

Μπάμια (Υ) (0231040)	7
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά δέντρα Καλλωπιστικοί θάμνοι	Δ/Ο

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 47714/19.02.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ