



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.05.2025
Αρ. Πρωτ. 131133

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 92 87 228
e-mail: abratidou@minagric.gr

Προς: Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη)
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr,
info@efthymiadis.gr

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
JOUST PRO (δ.ο. Prothioconazole 15% β/ο + Azoxystrobin 15% β/ο)»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΕ) αριθ. 2025/787 της Επιτροπής της 24^{ης} Απριλίου 2025 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **..prothioconazole..**
 - ε) (ΕΕ) αριθ. 2024/2781 της Επιτροπής της 31^{ης} Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **...azoxystrobin...**
 - στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και

τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ)».
4. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 91/14.06.2024).
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 2339/14.05.25).
6. Την από 12/2024 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ με αριθμ. πρωτ. 405295/23.12.2024 (ΕΜΠ 3470/20.12.2024).
7. Τις αρ. πρωτ. 2245/61561/01.03.2023, 20824/24.01.2025, 95298/09.04.2025 και 124898/14.05.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **JOUST PRO (δ.ο. Prothioconazole 15% β/ο + Azoxystrobin 15% β/ο)** της εταιρείας **Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

61202

20.05.2025

31.03.2028

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

JOUST PRO

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Prothioconazole

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Τριαζολινθιόνες

Παρασκευαστές της δ.ο. :

- 1. Nufarm Ltd**
103-105 Pipe Road, Laverton North, VIC 3026, Αυστραλία
- 2. Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., Ltd.,**
East Industry Zone, Chengyang District, Qingdao, Shandong, Κίνα
- 3. Ciech Sarzyna S.A.,**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
- 4. Anhui JiuYi Agriculture Co., Ltd.,**
Hefei Circulate Economy Zone, Hefei City, Anhui Province, CN-231602 HEFEI, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Jiangsu Cheng Yang Crop Science Co., Ltd.**
83, Guan Qu Nan Lu, Nanjing Chemical Industry Park,
Nanjing, Jiangsu, Κίνα
- 2. Shandong Hailir Chemical Co., Ltd.**
Lingang Industrial Zone, Coastal Economic Development
Zone, Weifang, Shandong, Κίνα
- 3. Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd.**
North Area of DongshaChem-Zone, Zhangjiagang, Jiangsu,
215600, Κίνα
- 4. Anhui JiuYi Agriculture Co., Ltd.**
Hefei Circulate Economy Zone, Hefei City, Anhui Province,
CN-231602 HEFEI, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 2245/61561/01.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική Ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Azoxystrobin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,5% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Στρομπιλουρινών

Παρασκευαστές της δ.ο. :

- 1. Nufarm SAS.**
11 rue du Débarcadère, Immeuble, West
Plaza 92700, Colombes, Γαλλία
- 2. CAC Chemical GmbH**
Böttgerstrasse 12, 20148 Hamburg,
Γερμανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Shangyu Nutrichem Co, Ltd.**
No.9 Weijiu Road, Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone,
Zhejiang, 312369, Κίνα
- 2. CAC Nantong Chemical Co., Ltd**
Huanghai 4th Road, Yangkou Chemical Industry Park,
Rudong County 226407, Nantong City, Jiangsu Province,
Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 2245/61561/01.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Nufarm GmbH & Co KG
St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Αυστρία
Τηλ: +43 70 6914 2466
Fax: +43 70 6918 2004

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr,
info@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
E-mail: info@efthymiadis.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm Crop Products UK
Wyke Lane, Wyke, Bradford, BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Nufarm SAS,**
Notre Dame de la Garenne 27600 Gaillon, Γαλλία
- 2. Chemark Zrt.**
H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75 hrsz., P.O.Box 31, Ουγγαρία
- 3. Phyteurop**
Zone Industrielle de Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
- 4. Autopak-Vetlab Group**
39 Harris Street, St Marys, New South Wale 2760, Αυστραλία
- 5. Nufarm Malaysia Sdn Bhd**

Lot 6, Jalan Sultan Mohamed 5
Kawasan Perindustrian Bandar Sultan, Μαλαισία

- 6. Nufarm Americas Inc.**
11901 S. Austin Ave., Alsip, IL 60803, ΗΠΑ
- 7. Nufarm Americas Inc.**
21399 Torrence Ave., Sauk Village, IL 60411, ΗΠΑ
- 8. CJB Industries Inc.**
701 Gil Harbin Industrial Blvd., Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
- 9. Interprovincial Cooperative Limited (IPCO)**
945 Marion Street, Winnipeg, MB, R2J 0K7

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Nufarm SAS,**
Notre Dame de la Garenne 27600 Gaillon, Γαλλία
- 2. Chemark Zrt.**
H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep 06/75 hrsz., P.O.Box
31, Ουγγαρία
- 3. Phyteurop**
Zone Industrielle de Grande Champagne, 49260,
Montreuil-Bellay, Γαλλία
- 4. Autopak-Vetlab Group**
39 Harris Street, St Marys, New South Wale 2760,
Αυστραλία
- 5. Nufarm Malaysia Sdn Bhd**
Lot 6, Jalan Sultan Mohamed 5, Kawasan Perindustrian
Bandar Sultan, Μαλαισία
- 6. Nufarm Americas Inc.**
11901 S. Austin Ave., Alsip, IL 60803, ΗΠΑ
- 7. Nufarm Americas Inc.**
21399 Torrence Ave., Sauk Village, IL 60411, ΗΠΑ
- 8. CJB Industries Inc.**
701 Gil Harbin Industrial Blvd., Valdosta, GA 31601, ΗΠΑ
- 9. Interprovincial Cooperative Limited (IPCO)**
945 Marion Street, Winnipeg, MB, R2J 0K7
- 10. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: Prothioconazole 15% β/ο +
Azoxystrobin 15% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 71,97% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στην αριθμ. πρωτ. 2245/61561/01.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες:			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 κ.εκ. - 5 λίτρα	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2	Δοχεία	10 -20 λίτρων	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

3	Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε τα 2/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Επαναλάβετε τρεις (3) φορές. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
		4 Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο που περιέχει τις δραστικές ουσίες prothioconazole, της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολινθιονών) και azoxystrobin, της ομάδας των στρομπιλουρινών, που επιδρά προληπτικά, προστατευτικά και θεραπευτικά κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών σε σιτηρά και ελαιοκράμβη. Το prothioconazole δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs). Έχει κυρίως προληπτική δράση και παρουσιάζει πολύ καλή διασυστηματική κίνηση στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπεταλική διασυστηματική κίνηση), ενώ εμποδίζει την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα του μύκητα και την ανάπτυξη των μυκηλιακών υφών. Το azoxystrobin με τη μερική διελασματική του δράση, παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Σε βιοχημικό επίπεδο, η δράση του είναι στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Σιτάρι Χειμερινό & Ανοιξιάτικο (μαλακό και σκληρό) (TRZAW, TRZAS, TRZDW, TRZDS)	Σεπτορίωση <i>Zymoseptoria tritici</i> <i>(Mycosphaerella graminicola)</i> (SEPTTR) Καστανή Σκωρίαση <i>(Puccinia recondita-PUCCRE), Puccinia triticina</i> (PUCCRT) Κίτρινη Σκωρίαση <i>Puccinia striiformis</i> (PUCCST) Ωίδιο <i>Blumeria graminis</i> (ERYSGR)	120-140	10-40	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69).	2/14-21 ημέρες
Τριτκάλε (χειμερινό & ανοιξιάτικο) (TTLWI, TLSO)	Σεπτορίωση <i>Zymoseptoria tritici</i> <i>(Mycosphaerella graminicola)</i> (SEPTTR) Καστανή Σκωρίαση <i>(Puccinia recondita-PUCCRE), Puccinia triticina</i> (PUCCRT) Κίτρινη Σκωρίαση <i>Puccinia striiformis</i> (PUCCST) Ωίδιο <i>Blumeria graminis</i> (ERYSGR)	120-140	10-40	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69).	2/14-21 ημέρες
Σίκαλη (χειμερινή & ανοιξιάτικη) (SECCW, SECCS)	Σεπτορίωση <i>Zymoseptoria tritici</i> <i>(Mycosphaerella graminicola)</i> (SEPTTR) Καστανή Σκωρίαση <i>(Puccinia recondita f. sp. recondita -PUCCRR)</i> Ωίδιο <i>Blumeria graminis</i>	120-140	10-40	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69).	2/14-21 ημέρες

	(ERYSGR)				
Χειμερινό Κριθάρι (HORVW)	Ραμουλάρια (<i>Ramularia collo-cygni</i> -RAMUCC)	100	10-40	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-61).	2/14-21 ημέρες
Ανοιξιιάτικο Κριθάρι (HORVS)	Σκωρίαση (<i>Puccinia hordei</i> -PUCCHD) Ωίδιο <i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>hordei</i> (ERYSGH) Ρυγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i> -RHYNSE) Ελμινθοσπορίωση /Δικτυωτή κηλίδωση (<i>Pyrenophora teres</i> PYRNTE)				
Βρώμη (Χειμερινή & Ανοιξιιάτικη) (AVESW, AVESP)	Σκωρίαση Φύλλων <i>Puccinia coronata</i> (PUCCCO) Κηλίδα Φύλλων <i>Pyrenophora chaetomioides</i> (PYRNAV)	100	10-40	Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-61).	2/14-21 ημέρες
Ελαιοκράμβη (χειμερινή) (BRSNW)	Σκληρωτίνια <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (SCLESC) Ωίδιο <i>Erysiphe cruciferarum</i> (ERYSCR) Αλτενάρια <i>Alternaria brassicae</i> (ALTEBA)	100-120	10-40	Μία εφαρμογή (Φθινοπωρινή ή ανοιξιιάτικη) Η φθινοπωρινή εφαρμογή από το στάδιο του 4 ^{ου} φύλλου έως το 8 ^ο φύλλο (BBCH 14-18). Ή Η ανοιξιιάτικη εφαρμογή από το στάδιο της έναρξης επιμήκυνσης του πλάγιου βλαστού μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 20 – 69).	1

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στο Σιτάρι περιλαμβάνει και τις χρήσεις σε Μονόκοκκο σιτάρι (TRZMO), Δίκοκκο σιτάρι (TRZDI), Σπέλτα (TRZSP) και Tritordeum (1TTOG).
2. Να πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή μικρής κλίμακας στις καλλιέργειες Τριτικάλε (TTLISO) (ανοιξιιάτικο), Tritordeum (1TTOG), Σίκαλη (SECCS) (ανοιξιιάτικη), Βρώμη (AVESP) (ανοιξιιάτικη). Στις

καλλιέργειες αυτές δεν έχει ελεγχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας από τη χρήση του σκευάσματος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες prothioconazole, που ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC και azoxystrobin, που ανήκει στην ομάδα 11 κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΥΗ401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις

σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Για την προστασία των κατοίκων και των περιοίκων:

- να τηρείται μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από κατοικημένες περιοχές ή
- να γίνεται χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 50%**.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να τηρήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- **μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων** για τις καλλιέργειες χειμερινών κα ανοιξιότικων σιτηρών για 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο και για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης (ανοιξιότικη εφαρμογή).
- **μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων** για τις καλλιέργειες χειμερινών και ανοιξιότικων σιτηρών για 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο και για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης (χειμερινή εφαρμογή).

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
[Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Σπέλτα, Μονόκοκκο Σιτάρι, Δίκοκκο Σιτάρι, Tritordeum, Τριτικάλε(05000090)] Σίκαλη (0500070), Κριθάρι (0500010), Βρώμη (0500050)	35
Ελαιοκράμβη (0401060)	56

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις παραπάνω συνθήκες το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **τμήμα Α** της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα :

- Generic data gaps for TDM's deriving from prothioconazole uses, as they are mentioned in Part A.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ