



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.06.2025
Αριθ. πρωτ: 156925

Ταχ. Δ/νση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON SPA
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
e-mail: info@sipcam.gr
g.vlachou@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ACADEMIC (δ.ο.: cymoxanil 15 % β/ο + ametoctradin 30 % β/ο)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2023/918 της επιτροπής της 4ης Μαΐου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ametoctradin
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Την από τον Ιανουάριο του 2025 και έκθεση αξιολόγησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου-ΜΦΙ (ΕΜΠ 3325 π.ε.) και των από Απρίλιο του 2025 (ΕΜΠ 1127) αναθεωρημένων τμημάτων αυτής για το προϊόν ACADEMIC.
8. Την αριθμ. 8052/228767/18.07.2023 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 45457/18.02.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ACADEMIC (δ.ο.: cyromoxanil 15 % β/ο + ametoctradin 30 % β/ο) της εταιρείας SIPCAM OXON SPA με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)****1.1.α Ημερομηνία χορήγησης****1.1.β Ημερομηνία λήξης****61208****12.06.2025****31.12.2026****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν****1.2.α Εμπορικό όνομα:****1.2.β Μορφή:****ACADEMIC****Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)****1.3 Δραστική ουσία****Δραστική ουσία 1****Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:****cyromoxanil****Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:****97 % (β/β) min****Χημική ομάδα:****Ακεταμίδια****Παρασκευαστής:****SIPCAM OXON SpA****Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία****Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:****Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:****1. Taizhou Bailly Chemical Co. Ltd.,****Zhonggang Road. Taixing City. Jiangsu Province, Κίνα****2. Shanghai Shenglian Chemical Co. Ltd.****Kaitai Road, Chemical Industry Park****Binhai County, Jiangsu Province, Κίνα**

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 8052/228767/18.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

ametoctradin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Τριαζόλοπυριμιδίνες

Παρασκευαστής:

BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Γερμανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Hikal Limited

T-21, MIDC Industrial Area Talaja PIN -410 208

District Raigad, Maharashtra State, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 8052/228767/18.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SIPCAM OXON SPA

Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400, Κορωπί

Τηλ: +30 210 5223834

E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400, Κορωπί

Τηλ: +30 210 5223834

E-mail: info@sipcam.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM OXON S.p.A.

Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SIPCAM OXON S.p.A.

Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

2. SIPCAM INAGRA, S.A.

Ctra. Mareny Blau, s/n 46410 Sueca, Valencia - Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SIPCAM OXON S.p.A.

Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO), Ιταλία

2. SIPCAM INAGRA, S.A.

Ctra. Mareny Blau, s/n 46410 Sueca, Valencia - Ισπανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: **cymoxanil 15 % β/ο + ametoctradin 30 %**
Βοηθητικές ουσίες: **57,66 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 8052/228767/18.07.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	25 κ.εκ. έως και 2 λίτρα	HDPE
2	Δοχείο	2 λίτρα έως και 20 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος υψηλού όγκου**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (δοχεία/φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε περονόσπορους (παθογόνα της κλάσης των ωομυκήτων).

Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του ametoctradin και του cytochanil. Το ametoctradin είναι μυκητοκτόνο επαφής που παρεμποδίζοντας το σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας των μυκήτων, αναστέλλει την διαφοροποίηση και απελευθέρωση των ζωοσπορίων. Το cytochanil έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση, κινείται διελασματικά και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο./ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιο & οиноποιήσιμο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	80-100	15-100	Από την εμφάνιση της ταξιανθίας έως την αρχή του γυαλίσματος (BBCH 53-81)	1

Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ+Θ) ⁴ SOLME	Περονόσπορος (<i>Phytophthora</i> <i>Infestans</i> – PHYTIN)	80	50-100	Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών BBCH 21-89	2/7-10
Πατάτα SOLTU	Περονόσπορος (<i>Phytophthora</i> <i>Infestans</i> – PHYTIN)	80	50-100	Από το στάδιο της έκπτυξης του 1 ^{ου} πλευρικού βλαστού (5 εκ) έως πριν την έναρξη κιτρινίσματος των φύλλων. BBCH 21-89	2 εφαρμογές ανά 5-10 ημέρες κάθε 2 ^ο χρόνο
Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA Κολοκύθι (Υ+Θ) CUUPE	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - PSPECU)	80	50-100 (Υ)	Από τον πλάγιο σχηματισμό βλαστών / ανάδυση πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 41-89	2/7-10
			50-100 (Θ)		
Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA Κολοκύθα (Υ) CUUMA	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - PSPECU)	80	50-100	Από τον πλάγιο σχηματισμό βλαστών / ανάδυση πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 41-89	2/7-10
Μαρούλι LACSA Σκαρόλα/Πλατύφυλλο Αντίδι CICEN (Εκτός των καλλιεργειών νεαρών φύλλων)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLA)	80	30-100	Από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως το στάδιο που έχει αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος BBCH 41-49	2/7-10
Λυκοτρίβολο ⁴ VLLLO, VLLER Ρόκα ⁴ ERUVE Σπανάκι SPQOL (Εκτός των καλλιεργειών νεαρών φύλλων)	Περονόσπορος (<i>Peronospora sp.</i> - PEROSP)	80	30-100	Από το στάδιο των 9 φύλλων έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 20-49	1 εφαρμογή κάθε 2 ^ο χρόνο
Κρεμμύδι ALLCE Σκόρδο ALLSA Ασκαλώνια ALLAS	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i> – PERODE)	80-100	30-100	Από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι το στάδιο που έχει	1 εφαρμογή κάθε 2 ^ο χρόνο

				αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος BBCH 41-49	
Βασιλικός OCIBA	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLA) (<i>Peronospora sp.</i> - PEROSP)	80	30-100	Από το στάδιο των 9 φύλλων έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 20-49	1 εφαρμογή κάθε 2 ^ο χρόνο

Παρατηρήσεις:

1. Αφαιρέστε τυχόν μολυσμένους καρπούς καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
2. Εξασφαλίστε καλό αερισμό της καλλιέργειας.
3. Η χρήση στις υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθίου περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.
4. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Λυκοτρίβολο, Ρόκα και Μελιτζάνα από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες :

- cytochanil που ανήκει στην **ομάδα 27** κατά FRAC (αγνώστου μηχανισμού δράσης) και
- ametoctradin που ανήκει στην **ομάδα 45** κατά FRAC (παρεμόδιστής του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας- QioSI-fungicide).

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό .

1 ημέρα για την καλλιέργεια του αμπελιού

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν αναμένεται να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07



GHS08



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Περιέχει cytochanil και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
H361fd: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα και στο έμβρυο.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, θύμος αδένας και μάτια) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Για εφαρμογές με υποβοηθούμενο αέρα χρήση ακροφύσιων μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50%».

«Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με πυκνό φύλλωμα φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προσωπίδα κατά την ανάμιξη, φόρτωση και επιπλέον των παραπάνω αδιάβροχο σακάκι και παντελόνι κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμανικό πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια».

«Οι χειρωνακτικές εργασίες στο αμπέλι να πραγματοποιούνται τουλάχιστον **μία ημέρα** μετά την εφαρμογή».

«Για την **προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων** να αφήνετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων στην καλλιέργεια αμπέλου με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%**».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, **για την καλλιέργεια αμπέλου** να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **10 μέτρων ή**
- **5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%**

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P302+P352+P333+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P308+313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση για μεταφορά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε τα μάτια αμέσως για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό, μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα και μετά με κατάλληλο οφθαλμικό διάλυμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, μεταφερθείτε αμέσως σε νοσοκομείο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα χωρίς να καταπιείτε. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα (Κωδικός με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμο -0151020 και επιτραπέζιο-0151010)	35
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010) Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030) Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010) Κολοκύθι (Υ+Θ) (0232030)	3
Πατάτα (0211000), Πεπόνι (0233010) Καρπούζι (0233030), Κολοκύθα (0233020) Κρεμμύδι (0220020), Σκόρδο (0220010) Ασκαλώνια (0220030), Μαρούλι (0251020) Σκαρόλα/Πλατύφυλλο Αντίδι (0251030), Ρόκα (0251060), Λυκοτρίβολο (0251010), Σπανάκι (0252010) Βασιλικός (0256080)	7

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για **δύο (2) χρόνια** από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- The two years shelf-life storage stability.

Β Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Κ.Α.Α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ