



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27.05.2025
Αριθ. πρωτ.: 140751

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: EXCLUSIVAS SARABIA S.A., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70493 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΕΚUS (δ.ο. fluoxycypr 20% β/ο) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις προειδοποιητικές λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
4. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».

- 6. Την αριθμ. 3984/104253/14.07.2023 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70493 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΕΚUS (δ.ο. fluoxypyr 20% β/ο).
- 7. Την από Απρίλιο 2024 αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής της Μάλτας για το πανομοιότυπο προϊόν.
- 8. Την αριθμ. 41634/13.02.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. **70493** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ζιζανιοκτόνο) ΕΚUS (δ.ο. fluoxypyr 20% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 3984/104253/14.07.2023 απόφασή μας, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις προειδοποιητικές λέξεις/εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **4, 5, 7, 9, 10, 11, 13 και 17** διαμορφώνονται ως εξής:

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων στα εσπεριδοειδή, τα μηλοειδή, την ελιά, τα σιτηρά, τον αραβόσιτο, **το κρεμμύδι και το σκόρδο**. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μεταφέρεται γρήγορα σε άλλα μέρη του φυτού. Προωθεί την επιμήκυνση των κυττάρων και αναστέλλει τη σύνθεση του RNA. Προκαλεί συμπτώματα όπως εκείνα των αυξινών, π.χ. κατσάρωμα και παραμόρφωση των φύλλων.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Εσπεριδοειδή Γκρέιπφρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Λιμμετία CIDAf	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	20-40	Μεταφυτρωτικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο	1
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	20-40	Μεταφυτρωτικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο	1

Ελιά* OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	20-40	Μεταφυτρωτικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή	1
Χειμερινά σιτηρά Σιτάρι TRZAW, TRZDW Κριθάρι HORVW Βρώμη AVESW Σίκαλη SECCW	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 φύλλα έως το πλήρες ξεδίπλωμα του φύλλου σημαίας BBCH 12-39	1
Αραβόσιτος ZEAMX	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 6 φύλλα BBCH 12-16	1
Κρεμμύδι ALLCE	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 6 φύλλα BBCH 12-14	1
Σκόρδο ALLSA	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 6 φύλλα BBCH 12-14	1

*Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες ελιάς Καλαμών και Κονσερβολιάς. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

Παρατηρήσεις:

1. Σε εσπεριδοειδή, μηλοειδή και ελιές εφαρμόστε το σκεύασμα με κατευθυνόμενο ψεκασμό κάτω από την κόμη των δέντρων και όχι ανάμεσα στις γραμμές (μέγιστη κάλυψη του 1/3 της επιφάνειας του αγρού).
2. Ο χαμηλότερος όγκος νερού πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλλιέργειες με πολύ αραιές φυλλικές επιφάνειες και σε μικρά ζιζάνια. Στις μεταγενέστερες εφαρμογές, όπου η φυλλική επιφάνεια της καλλιέργειας είναι πυκνή, ο όγκος ψεκασμού πρέπει να αυξηθεί στα 40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.
3. Θα πρέπει να αποφύγετε το προϊόν να έλθει σε επαφή με φύλλα ή πράσινα μέρη άλλων καλλιεργειών, ακόμη και σε μορφή ατμών μεταφερόμενων από τον άνεμο.
4. Να μην συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Εσπεριδοειδή
Μηλοειδή
Ελιά

Ευαίσθητα

Αγριομάρουλο (*Lactuca serriola* - LACSE)
Αγριοτρίφυλλο (*Trifolium repens* - TRFRE)
Λάπαθο (*Rumex crispus* - RUMCR)
Μολόχα (*Malva sylvestris* - MALSI)

Μετρίως ευαίσθητα

Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale* - TAROF)
Πεντάνευρο (*Plantago lanceolata* - PLALA)
Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)

Χειμερινά σιτηρά	<u>Μετρίως ευαίσθητα</u> Βερόνικα (<i>Veronica hederifolia</i> - VERHE, <i>Veronica persica</i> - VERPE) Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (<i>Galium aparine</i> - GALAP) Πολυκόμμι (<i>Polygonum aviculare</i> - POLAV)
Αραβόσιτος	<u>Ευαίσθητα</u> Αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i> - SOLNI) Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i> - DATST)
Κρεμμύδι Σκόρδο	<u>Ευαίσθητα</u> Τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i> – AMARE) Χηνοπόδιο (<i>Chenopodium album</i> – CHEAL) Πικρίδα (<i>Helminthotheca echiioides</i> – PICEC) Αντράκλα (Γλυστρίδα) (<i>Portulaca oleracea</i> – POROL) <u>Μετρίως ευαίσθητα</u> Σέσκουλο (<i>Beta vulgaris</i> – BEAVM) Καψέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i> – CAPBP) Περικοκλάδα (<i>Convolvulus arvensis</i> – CONAR) Αγριολάπαθο (<i>Rumex crispus</i> -. RUMCR) Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i> – SONOL) Βερόνικα (<i>Veronica hederifolia</i> – VERHE)

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας για οποιοδήποτε λόγο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρθούν/φυτευτούν οι εξής καλλιέργειες: σιτηρά, ελαιοκράμβη, αραβόσιτος, **κρεμμύδι και σκόρδο** μετά την παρέλευση τουλάχιστον 5 εβδομάδων χωρίς περαιτέρω καλλιεργητικούς περιορισμούς.
- Να αποφεύγεται η καλλιέργεια κονδυλωδών και ριζωματωδών φυτών στο πλαίσιο αμειψισποράς μετά τη χρήση flyoxργr πριν την παρέλευση 10 μηνών.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

9 Προειδοποιητικές λέξεις/
Εικονογράμματα
Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

SPE3: Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της ελιάς, των εσπεριδοειδών και των μηλοειδών.

SPE3: Για να προστατεύσετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις για τις καλλιέργειες του κρεμμυδιού και σκόρδου.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Γκρέιπφρουτ (0110010)	15
Λεμόνια (0110030)	
Μανταρίνια (0110050)	
Πορτοκάλια (0110020)	
Λιμμετία (0110040)	
Μήλα (0130010)	
Αχλάδια (0130020)	
Κυδώνια (0130030)	
Μούσμουλα (0130040)	

Ελιές [επιτραπέζιες (0161030) και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες (0402010)]	120
Σιτάρι (0500090) Κριθάρι (0500010) Σίκαλη (0500070) Βρώμη (0500050) Αραβόσιτος (0500030)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος.
Κρεμμύδια (0220020) Σκόρδα (0220010)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Δυο πειράματα φυτοτοξικότητας από την χώρα μας, σε μία τουλάχιστον από τις ποικιλίες ελιάς Καλαμών και Κονσερβολιά.
- **A method able to determine the impurity N-methyl-2-pyrrolidone at LOQ in accordance with its maximum allowed content in the TGA as set in Reg (EU) 2017/856 (< 0.59 g/kg in the PPP).**

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3984/104253/14.07.2023 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ