



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.01.2025
Αριθ. Πρωτ.: 28705

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Galenika-Fitofarmacija d.o.o., Σλοβενίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KULISA (δ.ο. quizalofop-p-ethyl 5% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2023/1757 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνQuizalofop-p-ethyl.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 70440 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FITOFOP (δ.ο. quizalofop-p-ethyl 5% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 13059/364605/20.12.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 22758/27.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) KULISA (δ.ο. quizalofop-p-ethyl 5% β/ο)** της εταιρείας **Galenika-Fitofarmacija d.o.o., Σλοβενίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70584**31.01.2025****28.02.2028**

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

KULISA**Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)**

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

quizalofop-p-ethyl

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95% β/β min

Χημική ομάδα:

Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα (FOPs)

Παρασκευαστής:

YC Agro Limited
Regency House, Westminster Place
York Business Park,
York, Y26 6RW, Μεγάλη Βρετανία
Mr. Xingyuan Wang
Τηλ.: 0519-82330773
E-mail: register@repoint.com

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., Ltd.

Yangkou Chemical Cluster Area
Rudong County
Jiangsu, 226407, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως προσδιορίζονται στο με αριθ. πρωτ. 12252/337851/26.11.2021 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Galenika-Fitofarmacija d.o.o.

Trzaska cesta 515
T.K. 1351 - Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία
Contact: Kristina Cic
Τηλ.: +386 1 360 20 22
Fax: +386 1 360 20 53
E-mail: galenikafitofarmacija@gmail.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz"

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Fax: 210 7471009
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ - Β' ΦΑΣΗ, ΔΑ12, Ο.Τ. 40
TK 57400
Τηλ.: 2310553355
FAX: 2310-545235
Email: info@nitrofarm.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.

Batajnicki drum bb
11080 Belgrade Zemun
Σερβία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.

Batajnicki drum bb
11080 Belgrade Zemun
Σερβία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **GALENKA FITOFARMACIJA A.D.**
Batajnicksi drum bb, 11080 Belgrade Zemun, Σερβία
2. **ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ - Β' ΦΑΣΗ, ΔΑ12, Ο.Τ. 40

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Quizalofop -p- ethyl 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94,3% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 12252/337851/26.11.2021 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100 ml, 1L	HDPE/PA, HDPE/EVOH
2	Δοχείο	5 L	HDPE/PA, HDPE/EVOH

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας των ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας και με πίεση 1,5 – 2,5 atm.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό να ανακινείται καθ' όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τρεις (3) φορές, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, με καθαρό νερό

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση ενάντια σε ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στα υπέργεια και υπόγεια μεριστώματα, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη τους. Τα τυπικά συμπτώματα είναι ορατά 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται, τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
Καρότο (DAUCA)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την έναρξη της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους (BBCH 11-40)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			
Πατάτα (SOLTU)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης/ κάλυψη των σειρών (BBCH 10-39)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			
Τομάτα (LYPES)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την ανάπτυξη της πλάγιας βλάστησης (BBCH 11-29)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			
Φασόλι με λοβό (PHSVX) Μπιζέλι χωρίς λοβό – (PIBSX)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 11-49)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			
Φακές (LENCU) Ρεβίθια (CIEAR)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 12-29)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			

Κουκιά (VICFX)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 11-49)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης/ κάλυψη των σειρών (BBCH 10-39)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			
Σόγια (GLXMA)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 10-39)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			
Ηλίανθος (HELAN)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 10-39)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150			
Βαμβάκι (GOSHI)	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	100 – 150	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας ως την έναρξη της κάλυψης των σειρών (BBCH 12-31)	1
	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια	150 – 300			

Παρατηρήσεις:**1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια:****Ετήσια ζιζάνια:**

Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides* – ALOMY),
 Βρώμος (*Bromus* sp. – BROSS),
 Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* – DIGSA),
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* – ECHCG),
 Αγριοκρίθαρο (*Hordeum vulgare* – HORVX),
 Ήρες (*Lolium* spp. – LOLSS),
 Φαλαρίδες (*Phalaris* spp. – PHASS),
 Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halapense* – SORHA),
 Σιτάρια (*Triticum aestivum* – TRZAX)

Πολυετή ζιζάνια:

Αγρόπυρο (*Agrropyron repens* – AGRRE),

Βέλιουρας από ριζώματα (*Sorghum halepense* – SORHA)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Ετήσια ζιζάνια: Σετάρια (*Setaria* spp. – SETSS),

Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα (*Cynodon dactylon* – CYNDA)

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα

2. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια.
3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο.
4. Για ετήσια ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση.
5. Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας.
6. Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20 – 30 εκατοστά και 125 κ.εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις.
7. Μην ψεκάζετε τον Ηλιάνθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων.
8. Μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
9. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα.
10. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες φασολιών, μπιζελιών και ηλιάνθου, να μην αναμινύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία quizalofop-p-ethyl, η οποία ανήκει στην **ομάδα 1** κατά HRAC.

Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμογή κατάλληλων αγρονομικών πρακτικών (π.χ. αμειψισπορά) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

- Η μέγιστη δόση στον **ηλίανθο** θα πρέπει να είναι 150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
- Στις καλλιέργειες **φασόλια με λοβό και μπιζέλια χωρίς λοβό** ενδέχεται να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Γι'αυτό συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317: Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (CAS: 64742-94-5), Calcium dodecylbenzene sulfonate (CAS: 1335202-81-7) / 2-Ethylhexanol (CAS: 104-76-7) and Fatty alcohol polyglycol ether (CAS: 68551-12-2).

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή.

Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής, λίγο μετά τον ψεκασμό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)



SRe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

SRe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, καλέστε ιατρό.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Κανένα σύμπτωμα δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε αρχικά συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία (απομόλυνση – παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών). Εφόσον καταποθεί ποσότητα μεγαλύτερη από μια γουλιά, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Καρότο (0213020), Τομάτα (0231010), Φασόλια με λοβό (0260010), Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040)	21
Φακές (0300020) Ρεβίθια (όσπρια) (0300030-001), Κουκιά (όσπρια) (0300010-001), Ηλίανθος (0631030-032), Πατάτα (0211000), Βαμβάκι (0401090)	45
Ζαχαρότευτλα (0900010)	60
Σόγια (0401070)	90

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύστε το σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες, προστατευμένο από το ηλιακό φως. Μην αφήσετε το προϊόν να παγώσει. Στις συνθήκες αυτές το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ