



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθμ. πρωτ:

29.01.2026
21927

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: SEIPASA S.A., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας,
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
"AGRIBIZ"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70601/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SEITHOR PRO (δ.ο. pelargonic acid 53,136% β/ο) για ερασιτεχνική χρήση, ως προς τα στοιχεία του φάσματος δράσης του σκευάσματος»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Την αριθμ. 16815/23.01.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 70601/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SEITHOR PRO (δ.ο. pelargonic acid 53,136% β/ο) για ερασιτεχνική χρήση, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 311293/11.11.2025 απόφαση μας, ως προς τα στοιχεία του φάσματος δράσης καθώς επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ. εκ. / 10 τ. μ.	Όγκος ψεκ. υγρού (κ.εκ./ 10 τ.μ.)		
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οиноποιήσιμες ποικιλίες)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	12-15	200-400	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων σε έκταση που καλύπτει το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16) Καλλιέργεια: Από την αρχή έκπτυξης του φυλλώματος έως την ωρίμανση (BBCH 10-85)	4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά (ή Μεσπλιά) MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά ΕΙΟJA	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	12-15	200-400	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων σε έκταση που καλύπτει το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16)	4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14

				<p>Καλλιέργεια: Από την αρχή έκπτυξης του φυλλώματος - στάδιο αυτί ποντικίου: Πράσινες άκρες φύλλων 10 mm πάνω από τα λείπια των οφθαλμών. Τα πρώτα φύλλα διαχωρίζονται - έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-87)</p>	
<p>Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU Καστανιά CSNSA Φουντουκιά CYLAV Πεκάν CYAIL Φιστικιά PIAVE Καρυδιά IUGRE</p>	<p>Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*</p>	12-15	200-400	<p>Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων σε έκταση που καλύπτει το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16)</p> <p>Καλλιέργεια: Από την αρχή έκπτυξης του φυλλώματος - στάδιο αυτί ποντικίου: Πράσινες άκρες φύλλων 10 mm πάνω από τα λείπια των οφθαλμών. Τα πρώτα φύλλα διαχωρίζονται - έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 10-87)</p>	<p>4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14</p>
<p>Ακαλλιέργητες εκτάσεις (Γεωργικές και δασικές, μη- γεωργικές και μη- δασικές)</p>	<p>Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*</p>	12-15	200-400	<p>Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων [1 Απριλίου- 1 Σεπτεμβρίου]: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου</p>	<p>4: Άνοιξη: 2/14 Καλοκαίρι - Φθινόπωρο: 2/14</p>

				πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16)	
<p>Αστικές και κατοικημένες περιοχές, Ιδιωτικά πάρκα και οικιακοί κήποι - Αδιαπέρατες και ημιπερατές επιφάνειες (συμπεριλαμβ.: βιομηχανίες, αμαξοστάσια, σιδηροδρομικές γραμμές, δρόμους, πεζοδρόμια, μονοπάτια και άλλες μόνιμες κατασκευές)</p>				<p>Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων: Από την εμφάνιση του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την εμφάνιση του έκτου πραγματικού φύλλου (BBCH 10-16)</p>	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τα ζιζάνια πρέπει να βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, από το 1^ο μέχρι το 6^ο φύλλο. 2. Ψεκάστε χωρίς να έρθει σε επαφή το προϊόν με χλοοτάπητες ή με το υπέργειο μέρος των καλλιεργούμενων φυτών. 3. Εφαρμόστε κατά προτίμηση το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα. 4. Μην το εφαρμόζετε σε υγρά φυτά ή εάν αναμένεται βροχή δυο (2) ώρες μετά την εφαρμογή. 5. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 					
<p>*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:</p> <p><u>Αμπέλι</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Δόση 12-15 κ. εκ. σκευ. /10 τ.μ. Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%) Ρόκα άγρια (<i>Diploaxis erucoides</i> - DIPER), Χρυσάνθεμο (<i>Chrysanthemum fuscatum</i> - CHYFU) Ζωχός κοινός (<i>Sonchus oleraceus</i> - SONOL) Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%) Βρόμος (<i>Bromus arvensis</i> - BROAV) Πορφυρή κύπερη (<i>Cyperus rotundus</i> - CYPRO) - Δόση 15 κ. εκ. σκευ. /10 τ.μ. Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%) Σκαρολάχανο (<i>Mercurialis annua</i> - MERAN), Οξαλίδα (<i>Oxalis pes-caprae f. plenifolia</i> - OXAPF), Πικραλίδα (<i>Taraxacum officinale</i> - TAROF) Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%) Περικοκλάδα (<i>Convolvulus arvensis</i> - CONAR), Ήρα πολυετής (<i>Lolium perenne</i> - LOLPE) - Δόση 12 κ. εκ. σκευ. /10 τ.μ. Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%) Οξαλίδα (<i>Oxalis pes-caprae f. plenifolia</i> - OXAPF), Πικραλίδα (<i>Taraxacum officinale</i> - TAROF) 					

Μηλοειδή, Ακρόδρυα:

- Δόση 12-15 κ. εκ. σκευ. /**10 τ.μ.**

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)
 Βλήτο πλαγιαστό (*Amaranthus blitoides* - AMABL)
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)
 Ποτεντίλλη (*Potentilla reptans* - PTLRE),
 Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI),
 Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus* - SONOL),
 Σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)

- Δόση 15 κ. εκ. σκευ. /**10 τ.μ.**

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)
 Ρόκα άγρια (*Diplotaxis erucoides* - DIPER)
 Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-85%)
 Πικραλίδα (*Taraxacum officinale* - TAROF),
 Τριφύλλι λευκό έρπον (*Trifolium repens* var. *nivadense* - TRFRN)
 Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)

- Δόση 12 κ. εκ. σκευ. /**10 τ.μ.**

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-85%)
 Ρόκα άγρια (*Diplotaxis erucoides* - DIPER)

Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Αστικές και κατοικημένες περιοχές, Ιδιωτικά πάρκα και οικιακοί κήποι - Αδιαπέρατες και ημιπερατές επιφάνειες

- Δόση 12-15 κ. εκ. σκευ. /**10 τ.μ.**

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)
 Βλήτο πλαγιαστό (*Amaranthus blitoides* - AMABL),
 Ευφόρβια (*Euphorbia maculata* - EPHMA),
 Κόνυζα (*Erigeron sumatrensis* - ERISU),
 Ήρα πολυετής (*Lolium perenne* - LOLPE),
 Αγριοντομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI),
 Τριφύλλι λευκό έρπον (*Trifolium repens* - TRFRE)
 Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL),
 Ρόκα άγρια (*Diplotaxis erucoides* - DIPER)

- Δόση 15 κ. εκ. σκευ. /**10 τ.μ.**

Ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 85-100%)
 Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus* - SONOL),
 Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)
 Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE),
 Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR),
 Σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)

- Δόση 12 κ. εκ. σκευ. /**10 τ.μ.**

Μετρίως ευαίσθητα (αποτελεσματικότητα 70-84%)
 Ζωχός κοινός (*Sonchus oleraceus* - SONOL),
 Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 311293/11.11.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ